CENTRALE ORNITHOLOGIQUE G.E.P.O.P.

SYNTHESE DES OBSERVATIONS 1980 DANS L'AISNE

Cette synthèse, par rapport aux précédentes, est plus étoffée. Plusieurs raisons à cela : une légére augmentation du nombre des observateurs et les sorties collectives effectuées dans le cadre de l'enquête F.I.R. Ces dernières ont permis de clarifier la situation des Rapaces et d'autres oiseaux.

L'année a été marquée par un printemps pluvieux et un mois de juillet très humide : 20 jours consécutifs de pluie. Les nichées ont eu du mal à se développer et elles ont été faibles.

La couverture du département est inégale :

- bonne en Thièrache,
- assez bonne en Vermandois (mise en réserve du marais de l'Isle à Saint-Quentin) et en Laonnois (sauf le marais de Saint-Boétien),
- faible pour la vallée de l'Aisne (les observateurs parisiens fréquentant ce secteur n'envoyent pas leurs données),
- nulle pour le sud du département.

Quelques données retiennent l'attention :

- la découverte d'un noyau de Milans royaux nicheurs,
- l'hivernage d'un Pygargue,
- la nidification du Guêpier et de la Grive litorne,
- les données sur le Hibou petit-duc et le Bec-croisé des sapins.

Les Rapaces seront traités à part.

H. Dupuich

Abréviations

M. = mâle
F. = femelle
ind. = individu
im. = immature
juv. = juvénile
ASL = Aulnois-sous-Laon (bassins de décantation)
FCB = forêt de Coucy-Basse
FNT = forêt du Nouvion-en-Thièrache
FSG = forêt de Saint-Gobain
MISQ = réserve du marais d'Isle à Saint-Quentin
MSB = marais de Saint-Boétien (terme global correspondant à une zone de marais et d'étangs à l'est de Laon regroupant plusieurs communes)
Boué = secteur de nidification

Observateurs

G. Baudoin, P. Biet (P.O.M.), B. Blaise, S. Boutinot, N. Cocu, X. Commecy, C. Delahoche, E. Delval, P. Ducrot (C.O.C.A.), M. Duquef, A. Dupuis, H. Dupuich, O. Hernandez, L. Kérautret (G.O.N.), H. et S. Lefèvre, M. Marleux, E. Mercier, E. Nowack, J. Ostertag, P. Pigeon, E. Ranson, T. Rigaux, P. Royer, B. Taillez (G.O.N.), A., C., G. et J.C. Tombal (G.O.N.), P. Triplet et I. Veriere.

PLONGEON CATMARIN Gavia stellata
1 ind. du 5 au 11 novembre et 1 du 8 au 13 décembre au MISQ (P. Pigeon).

GREBE HUPPE Podiceps cristatus
Beaucoup de données sur la nidification, résultant d'une meilleure prospection.
Boué : site nouveau, 1 couple qui se cantonne le 27 avril, 2 ad./3 pulli (de 8 à 12 jours) le 14 juin, 1 ad./2 juv. le 21 juillet puis 2 juv. seuls jusqu'au 12 août.
Chassemy : plusieurs gravières, 25 à 30 ad., 1 F./3 juv. le 7 mai.
Guignicourt : 2 ad. le 20 février, l'espèce a niché en 1979.
MISQ : 4 couples sur les 3 étangs
- étang 1 : 1 couple, 1 nid le 22 mai (détruit)
  1 nid le 30 mai (détruit)
  3ème nid, 3 juv. le 7 août
- étang 2 : 2 couples, 2 ad./2 juv. le 7 mai, 1 juv. en vie fin juillet
  2 ad./1 juv. le 24 juin
- réserve : 1 couple, 2 ad./1 juv. le 13 juin

MSB : 1 couple cantonné le 2 mai.
Fort peu couverts, ces étangs doivent abriter une population importante, le biotope étant favorable.
Sery-les-Mézières : 1 F./1 nid/5 oeufs le 23 mars.
Saint-Nicolas-aux-Bois : 1 à 2 couples nicheurs.
Soissons : gravières à l'ouest, plusieurs ad. isolés et 1 ad./4 juv., 1 ad./3 juv., 2 ad./3 juv., 1 ad./2 juv. et 1 ad. au nid (date non précisée).
Tergnier et Vendeuil : signalé nicheur sur des ballastières.
Vermand : 4 couples nicheurs, encore 4 ind. le 30 octobre.
La prospection est toutefois toujours insuffisante, beaucoup de secteurs favorables étant peu ou pas prospectés :
- gravières de Venizel à Beaurieux : vallée de l'Aisne sauf à Chassemy,
- les marais dits de "Laon-Sissonne" (MSB) : la population doit être élevée (20 à 25 couples ?),
- vallée de l'Oise : gravières de La Fère, Tergnier, etc...,
- vallée de la Somme : étangs de Saint-Quentin à Ham,
- étangs du secteur d'Hirson.

Le bilan total des couples nicheurs devrait être plus élevé qu'il ne l'est actuellement. Une centaine de couples nicheurs pour l'Aisne est raisonnable.
En migration noté à ASL : 1 im. le 24 août, 15 le 14 septembre.

GREBE A COU NOIR Podiceps nigricollis
1 ind. en plumage d'hiver le 30 octobre à Boué (H. Dupuich).

GREBE CASTAGNEUX Podiceps ruficollis
Fort peu suivi durant la nidification.
ASL : 4 le 28 septembre, 1 le 16 novembre.
Boué : noté toute l'année, maxima de 6 en janvier et 9 en mars. 2 couples nicheurs d'avril à août, 1 ad./2 pulli le 14 juin, 3 juv. le 21 juillet, 1 ad./1 pullus le 6 août. Puis 13 ind. le 21 juillet, 15 le 4 août, 16 le 12, 20 le 19, 12 le 27, 15 le 14 septembre, 15 le 5 octobre, 7 le 30.
On note 2 pics : un vers la mi-août (migration + jeunes

locaux) et un autre de mi-septembre à début octobre (migration).
Vermand : 1 F./4 oeufs le 8 avril.
Vierzy : 1 ind. en avril.
MSB : 2 ind. le 24 décembre.

GRAND CORMORAN Phalacrocorax carbo
8 ind. en migration le 8 avril à Vermand (S. Boutinot).

HERON CENDRE Ardea cinerea
Aucun indice sur une éventuelle nidification.
Boué : 1 ind. le 4 août, 4 le 6 et 2 le 12.
Saint-Quentin : régulier chaque mois, maxima de 3 le 3 juillet, 4 le 14 août et 4 en décembre.
Vermand : régulier.
Vallée de l'Oise entre Malzy et Englancourt : régulier toute l'année, absent cependant du 9 mars au 15 juin.
Maximum par mois : 10 le 6 janvier, 6 le 9 mars, 1 le 15 juin, 2 le 26 août, 3 le 31 octobre, 7 le 9 novembre, 1 à 2 en décembre.
Noté le 12 janvier à Orainville, 1 le 23 mars à Margny et Plomion, noté le 1er septembre à ASL , 1 le 24 décembre au MSB et 2 le 26 décembre à Craonne et 1 im. le 25 décembre à Condé-sur-Aisne.
On note uniquement des individus en hivernage et en dispersion post-nuptiale.

HERON BIHOREAU Nycticorax nycticorax
1 ind. du 25 avril au 5 mai à Vermand (S. Boutinot).

BLONGIOS NAIN Ixobrychus minutus
Vermand : aucune donnée, niche-t-il toujours ?

GRAND BUTOR Botaurus stellaris
Chassemy : 1 chanteur le 7 mai à l'étang Romainville (B. Tailliez), nicheur possible.
MISQ : 1 hivernant le 11 décembre (P. Pigeon)
Liesse : 1 chanteur le 4 septembre (P. Biet)
Vermand : aucune donnée.
Le bilan global est faible : absence de données ?
chute des effectifs ?

CYGNE TUBERCULE Cygnus olor
1 couple le 15 mai à Saint-Boétien, 1 ind. du 9 au 13 octobre et du 9 au 10 décembre au MISQ.

OIE CENDREE Anser anser
Peu d'observations : 1 ind. le 21 février à Soissons, 1 ind. le 2 mars à Guignicourt et 1 ind. le 28 avril à ASL.

BERNACHE DU CANADA Branta canadensis
Pour montrer l'impact de l'introduction d'une espèce étrangère : à Soissons, sur une ballastière, 2 ind. volants avec 2 ad. éjointés ; les 2 volants proviennent du couple.

TADORNE DE BELON Tadorna tadorna
L'observation de mai sur les bassins de décantation d'ASL peut laisser espérer une nidification prochaine.

ASL : 2 ad. le 15 mai, 3 ad. le 29 novembre et 2 le 25 décembre.
Boué : 1 M. 1 F. le 12 janvier, 1 F. le 13.

CANARD COLVERT Anas platyrhynchos
ASL : 3 couples le 16 mars, 5 M. le 28 avril, 1 F. le 14 septembre, 270 le 16 novembre, 35 le 29, 2 le 25 décembre.
Boué : environ 5 couples nicheurs plus ou moins sauvages.
Guignicourt : 70 (40 M.) le 12 janvier, 4 en février-mars.
ASL (Reneuil) : 9 pulli de 3 semaines le 28 avril.
Saint-Quentin : 20 à 25 couples dans la réserve (MISQ), 1ers pulli début mai, derniers pulli le 6 juillet, 2 à 12 par couvée.
100 max. en septembre, 160 le 27 octobre, 200 le 10 décembre (d'après P. Pigeon).
MSB : aucune donnée, sûrement nicheur.
Vermand : nicheur sur les étangs.
Encore noté à Marle (2 le 11 mai), Pommiers (60 le 25 décembre) et Condé-sur-Aisne (10 le 25 décembre).
Pour ASL (y compris Reneuil), P. Pigeon note le faible effectif des couvées (maximum de 7 pulli par couvée) dont la plupart ne volent pas avant le 20 juillet. Beaucoup de couvées tardives sont détruites.

SARCELLE D'HIVER Anas crecca
ASL : 22 le 16 mars, 8 le 24 avril, 2 M. 1 F. le 15 mai, 15 le 25 août, 2 le 28 septembre, 45 le 16 novembre, 70 le 29.
Boué : 6 M. le 12 janvier, quelques-unes fin janvier.
Guignicourt : 2 le 20 février.
MSB : quelques couples y nichent toujours.
MISQ : 1 couple le 26 avril, pulli début juillet en amont de la réserve (S. Boutinot)
1 couple du 1er mai au 3 juin dans la réserve (non nicheur), 1 le 22 août, augmentation des effectifs jusqu'en novembre, max. 80 en décembre (P. Pigeon).
ASL (Reneuil) : 60 le 29 novembre.

CANARD CHIPEAU Anas strepera
Peu observé : 1 M. 1 F. le 27 février à Orainville et 3 M. 3 F. le 26 mars à Guignicourt.

CANARD SIFFLEUR Anas penelope
Peu observé : 2 M. 2 F. à Boué le 15 mars et 2 M. 3 F. à ASL le 16.

CANARD PILET Anas acuta
ASL : 4 M. 2 F. le 16 mars, 1 M. le 28 septembre.
Guignicourt : 5 M. 3 F. le 20 février.

SARCELLE D'ETE Anas querquedula
1 couple le 9 mars au MISQ (en amont de la réserve), 1 M. le 29 avril à ASL, 1 M. le 15 mai à Bucy-le-Long, 3 le 26 août à Marle.

CANARD SOUCHET Anas clypeata
ASL : 2 couples le 28 avril, 4 M. 2 F. le 29.
Boué : 1 M. le 22 mars, 1 M. le 1er mai, 3 ind. le 19 août.

Guignicourt : 1 couple le 26 mars, 2 M. 1 F. le 4 avril.
Vermand : 1 couple nicheur dès le 26 mars (S. Boutinot).
Liesse : passage le 4 septembre.

NETTE ROUSSE Netta rufina
1 F. le 14 septembre à ASL (P. Pigeon) et 1 M. sauvage avec un couple éjointé le 1er mai près de Soissons (B. Tailliez).

FULIGULE MILOUIN Aythya ferina
ASL : 1 M. 1 F. le 14 septembre, 3 M. 8 F. le 28, 60 le 16 novembre, 80 le 29.
Boué : 5 M. 1 F. le 9 mars, 6 M. 3 F. le 15, 21 M. 12 F. le 22, 1 M. le 10 mai, 5 M. 6 F. le 30 octobre, 3 M. le 10 novembre, 4 M. le 16, 9 le 30.
Guignicourt : 10 dont 6 M. le 9 février.
MISQ : 1 couple le 3 juillet, 1 M. le 16 juillet, 1 le 27 septembre, 4 M. 3 F. le 16 novembre, 4 M. 4 F le 4 décembre, 3 M. 3 F. le 10, maximum de 12 M. 6 F. en décembre.
Saint-Nicolas-aux-Bois : 1 à 2 couples nicheurs.
Vallée de l'Aisne (gravières autour de Soissons) : 50 le 21 février à Soissons et 3 M. le 1er mai, 1 M. le 7 mai à Chassemy (nidification possible), 400 le 25 décembre à Pommiers.
Vermand : nicheur certain, il y avait 50 couples en 1978 (S. Boutinot).

FULIGULE MORILLON Aythya fuligula
Noté seulement en migration.
1 couple le 9 février à Guignicourt, 1 F. du 2 au 5 juin à Saint-Quentin, 3 F. le 10 novembre à Boué et 30 le 16 à ASL.

FULIGULE MILOUINAN Aythya marila
1 F. du 16 au 29 novembre à ASL (P. Pigeon).

GARROT A OEIL D'OR Bucephala clangula
1 M. le 27 février à Guignicourt.

HARLE PIETTE Mergus albellus
1 couple du 20 février au 8 mars à Guignicourt (P. Ducrot).

PERDRIX GRISE Perdix perdix
Quelques ind. notés sur les champs en mars et décembre.
Juvincourt : min. 7 couples sur 3,5 km^2 d'un vieil aérodrome le 11 mai.

CAILLE DES BLES Coturnix coturnix
Fort peu de données : 2 chanteurs le 11 mai à Hary.
On note une régression de l'espèce (pesticides).

FAISAN DE COLCHIDE Phasianus colchicus
Forêt du Nouvion : nicheur plus ou moins sauvage.
Signalé un peu partout en bois et forêts.

GRUE CENDREE Grus grus
55 à Orainville le 19 mars, 150 en vol vers le NE le 23 mars à Cuiry-les-Iviers et 1 le 26 mars à Guignicourt indiquent bien la remontée de printemps et que la partie est du département constitue la bordure W du canal migratoire (P. Ducrot, S. Lefèvre, P. Triplet et I. Veriere).

1 précoce du 20 au 26 août à Malzy dans une prairie humide près de l'Oise avec des Hérons cendrés (H. Dupuich).
4 le 3 décembre en vol vers le SW à ASL (P. Pigeon).

RALE D'EAU Rallus aquaticus
Boué : min. 1 chanteur en mai et juin, 1 à 2 couples nicheurs.
MSB : 1 chanteur répond à la repasse le 11 mai, plusieurs couples doivent se reproduire dans tout le marais. Noté aussi en hivernage.
MISQ : 10 à 20 couples, 1 ad./3 pulli de 10 jours le 19 mai. Hivernant.
Orainville (rappel) : 1 ind. le 27 octobre 1979.
Vermand : nicheur, S. Boutinot donne dans sa thèse une densité de 4 couples/10 ha en 1979.

MARQUETTE PONCTUEE Porzana porzana
1 ind. en migration le 27 août à Boué (H. Dupuich).

POULE D'EAU Gallinula chloropus
Quelques données sur la nidification.
Boué : min. 10 couples, 1 ad./6 pulli le 10 mai et 1 ad./6 pulli le 15, 70 le 4 août et 80 le 19 (ad. et juv.).
Bucy-le-Long : 1 ad./6 pulli le 15 mai, 1 nid/7 oeufs, 1 nid /5 oeufs/ 2 juv. le 10 juin.
MISQ : environ 25 couples, 2 à 4 juv. par couvée, 50 ind. en décembre.
Vermand : 1 F./10 oeufs le 18 avril, 1 F./7 oeufs le 3 juin.
Signalée en période de reproduction également à Leschelles, Englancourt et Saint-Boétien.

FOULQUE MACROULE Fulica atra
Des données sur la reproduction et la migration.
ASL : 3 le 16 mars, 35 le 24 août, 44 le 16 septembre, 50 le 28 et 10 le 16 novembre.
Boué : période prénuptiale, maximum par mois
62 le 12 janvier, 45 le 19 février, 54 le 15 mars.
nidification
40 ad. les 27 avril et 1er mai, 30 ad. le 24 mai,
50 ad. et juv. le 14 juin.
quelques données sur les nichées
1 ad./1 nid le 27 avril puis 7 oeufs le 1er mai qui donnent 1 ad./7 pulli le 10 mai.
1 ad./1 nid/7 oeufs le 1er mai qui donnent 2 ad. /7 pulli le 24 mai.
2 autres Ad./7 pulli, 1 ad./4 pulli, 1 pullus seul le 24 mai.
1 ad./4 pulli et 1 ad./3 pulli le 14 juin.
environ 20 couples nicheurs.
période postnuptiale
90 le 2 juillet
110 ad. et juv. le 4, 140 le 12, 120 le 21 août
100 le 14 septembre
100 le 5 octobre, 180 le 30
85 le 10 novembre, 110 le 30
180 le 24 décembre
On note 2 passages migratoires : 1 le 30 octobre et 1 le 24 décembre.

MISQ : 35 couples, 1 à 4 pulli/nid et 150 ind. début septembre, 80 fin novembre et 120 le 12 décembre.
Vermand : 1 F./5 oeufs le 2 avril.
Noté en période de reproduction à Englancourt et Saint-Boétien et en décembre à Soissons et Pommiers.

HUITRIER-PIE Haematopus ostralegus
1 ind. en migration le 29 septembre à ASL (P. Pigeon).

VANNEAU HUPPE Vanellus vanellus
Des bandes sont notées jusque fin mars.
Nidification
ASL : 2 ind. avec comportement nicheur le 10 juin
Le Nouvion-en-Thiérache : 2 ad. (alarme)/1 juv. les 24 et 25 mai.
Premières bandes le 14 juin à Boué : 20 ind. puis de 50 à 100 le 15 juin entre Malzy et Sorbais (vallée de l'Oise).
ASL : 15 le 14 juillet, 200 le 24 août, encore 2 le 16 novembre.

PLUVIER ARGENTE Pluvialis squatarola
ASL : 1 ind. le 25 mai (P. Pigeon).

GRAND GRAVELOT Charadrius hiaticula
ASL : 1 ad. le 15 mai, 9 ind. le 25, 2 le 14 septembre.

PETIT GRAVELOT Charadrius dubius
ASL : 8 le 28 avril, 5 le 15 mai, 8 le 25, 1 nid/4 oeufs le 6 juin, 1 nid le 14 juillet (détruit ensuite) et 13 ind. le 24 août.
D'après P. Pigeon, aucune couvée n'est arrivée à terme.
Bucy-le-Long : 8 le 15 mai, 1 le 10 juin (nicheur possible).
Chassemy : 1 le 7 mai.
Marle : 2 ad./1 nid le 11 mai.

BECASSINE DES MARAIS Gallinago gallinago
ASL : 15 le 14 septembre, 35 le 28, 30 le 16 novembre et 1 le 29.
Marle : 2 le 26 août, 110 le 31 octobre.
MISQ : 1 le 2 octobre et le 25 novembre.
Enfin 1 à Boué le 27 août.

BECASSE DES BOIS Scolopax rusticola
Queue de Boué/Boué : 2 levées le 22 mars (nicheuses possibles).
Bois des Couleuvres/Pontavert : 1 croûle le 18 juin.
1 le 2 août à Saint-Nicolas-aux-Bois, 1 début novembre au MISQ et le 7 décembre en forêt de Saint-Gobain.
L'écoute du chant permettrait de clarifier le statut de cette espèce.

COURLIS CENDRE Numenius arquata
1 ind. en vol vers l'W à Malzy le 3 juillet.

BARGE A QUEUE NOIRE Limosa limosa
Seulement à ASL : 4 le 25 mai, 1 le 8 juillet, 1 le 14.

CHEVALIER ARLEQUIN Tringa erythropus
ASL : 1 le 28 avril, 8 le 29, 6 le 4 mai.
Marle : 5 le 26 août.

CHEVALIER GAMBETTE Tringa totanus
ASL : 11 le 28 avril, 50 le 29, 19 le 19 mai, 4 le 25, 25 le 14 juillet, 3 le 24 août, 9 le 14 septembre, 1 le 16 novembre.
Boué : 1 ind. le 22 mars, 1 le 28 avril, 1 le 1er mai, 1 le 27 août.
Encore 1 le 11 mai à Marle et 1 le 24 juillet à Chigny.

CHEVALIER ABOYEUR Tringa nebularia
ASL : 5 le 28 avril, 22 le 29, 5 le 25 mai, 12 le 14 juillet, 16 le 14 septembre.
Boué : 4 le 27 août, 1 le 29 août.
Encore 3 le 7 mai à Chassemy et 16 le 26 août à Marle.

CHEVALIER CULBLANC Tringa ochropus
ASL : 1 le 16 mars, 2 le 29 avril, 1 le 6 juin, 2 le 8 juillet, 6 le 16 novembre, 2 le 29.
Boué : 1 le 14 juin, 1 le 19 août.
Encore 1 le 22 mars à Corneaux et 2 le 26 août à Marle.

CHEVALIER SYLVAIN Tringa glareola
ASL : 7 le 6 juillet, 10 le 14, 2 le 24 août, 2 le 14 septembre.

CHEVALIER GUIGNETTE Tringa hypoleucos
ASL : 6 le 29 avril, 12 le 4 mai, 4 le 15, 5 le 6 juillet, 15 le 14, 4 le 24 août, 49 le 14 septembre, 8 le 28.
Boué : 1 le 27 avril, 1 le 4 août, 1 le 6, min. 12 le 27.
Marle : 10 le 11 mai, 20 le 26 août.
MISQ : passage prénuptial jusqu'au 27 mai, passage postnuptial du 8 juillet au 25 novembre (max. 3).
Soissons : 1 le 1er mai et min. 13 de Soissons à Voilly le 13 mai le long de l'Aisne.

BECASSEAU MINUTE Calidris minuta
ASL : 3 le 25 mai (P. Pigeon).

BECASSEAU VARIABLE Calidris alpina
ASL : 4 le 4 mai, 2 le 15, 6 le 25.
1 écrasé à Marcy le 23 mars.

BECASSEAU COCORLI Calidris ferruginea
2 dont 1 en plumage nuptial le 26 août à Marle (H. Dupuich).

COMBATTANT Philomachus pugnax
ASL : 12 M. 25 F. le 29 avril, 2 M. 10 F. le 4 mai, 5 le 25, 12 le 14 juillet, 16 le 14 septembre.

AVOCETTE Recurvirostra avosetta
1 le 28 avril à ASL (P. Pigeon).

MOUETTE RIEUSE Larus ridibundus
Elle est notée en erratisme et hivernage dans maintes localités.
ASL : 4 le 28 avril, 8 le 29, 25 le 4 mai, 100 le 9 juin, 50 le 6 juillet, 10 le 14, 5 le 24 août.
Boué : 81 le 26 janvier, 1 le 27 août, 2 le 29, 5 le 10 novembre.
Chigny : 15 dont 3 juv. le 24 juillet.
Plomion : 40 en vol vers l'W le 23 mars.

MISQ : de février à mai puis d'octobre à décembre (maximum de 30 individus).
Soissons : hivernage le long de l'Aisne, dortoir proche ?
La nidification est constatée en trois localités.
Bucy-le-Long : 200 ad., 1 nid/3 oeufs, 1 nid/2 oeufs le 15 mai.
80 ad. en vol, 1 ad. mort, 12 pontes : 2 de 4 oeufs, 6 de 3, 3 de 2, 1 de 1 oeuf ; 7 pulli morts, 26 vivants hors des nids le 10 juin.
Estimation : minimum 30 couples nicheurs (relevés effectués par B. Tailliez).
La mention de 205 nids publiée dans Le Passer 1981 n°18 semble très curieuse.
Vermand : colonie de 90 nids (S. Boutinot), hivernage régulier.
Vierzy : 1 petite colonie qui existait déjà en 1979 (A. Tombal).

MOUETTE PYGMEE Larus minutus
1 juv. le 8 juin à Bucy-le-Long.

GUIFETTE NOIRE Chlidonias niger
Notée au passage prénuptial.
ASL : 14 le 29 avril, 2 le 4 mai.
Boué : 1 le 24 mai, 2 le 25.
Bucy-le-Long : 1 le 15 mai.

GOELAND CENDRE Larus canus
MISQ : 1 im. le 20 mai (1ère mention dans les synthèses de l'Aisne), 1 im. le 12 décembre).

PIGEON COLOMBIN Columba oenas
3 le 18 mai en FSG.
4 à Saint-Boétien le 24 décembre et 6 sur la carte I.G.N. de Craonne le 26.

PIGEON RAMIER Columba palumbus
Nicheur bien répandu (dès mars) en FNT.
1er chant le 7 février à Margival.
Laonnois : gros hivernage en décembre notamment à Chivres avec plusieurs milliers le 24.
Soissonnais : grosses bandes en décembre.

TOURTERELLE DES BOIS Streptopelia turtur
1ères le 1er mai à Saint-Boétien.
En mai à Boué, Le Nouvion-en-Thièrache, Chassemy...
FNT : nicheuse assez commune.
MISQ : 5 à 8 couples nicheurs, espèce notée jusque fin septembre.
ASL (Reneuil) : 2 juv. de 12 jours le 24 août.

TOURTERELLE TURQUE Streptopelia decaocto
Elle est commune comme nicheuse partout. Elle pénétre de plus en plus en forêt.

COUCOU GRIS Cuculus canorus
1ers : 2 le 15 avril en FCB.
Noté ensuite en avril et mai à Presles, Vermand, Boué; ASL (Reneuil), Missy-les-Pierrepont, Verneuil, Passuicourt, Agnicourt-Séchelles.

2 ind. paradent le 11 mai à Prisces.
MISO : 3 à 4 couples nicheurs, le dernier ind. est noté fin août.

HIBOU MOYEN-DUC Asio otus
1 ind. trouvé écrasé le 23 mars à Marcy.
Taillefontaine : 1 couple nicheur en mai (A. et G. Tombal).
MISQ : 5 à 10 ind. au dortoir en décembre.

HIBOU PETIT-DUC Otus scops
Donnée très intéressante : 2 à 3 M. chanteurs au printemps à Mont-Bonny/Mont-Notre-Dame. Cela faisait quelques années que l'espèce n'avait pas été notée dans l'Aisne (information C. Riols). Boutinot la donne comme absente du Vermandois depuis 1959 et Yeatman ne donne qu'un indice de nidification possible pour le secteur de Château-Thierry entre 1970 et 1975.
A noter aussi que l'espèce a été entendue en juin près de la forêt d'Ermenonville (Oise), à peine plus au sud.

CHOUETTE CHEVECHE Athene noctua
Peu observée en Thiérache où elle niche : 1 ind. le 7 avril à la Rue Charles. Un recensement serait utile pour connaître la densité de cette espèce.

CHOUETTE HULOTTE Strix aluco
Quelques données sur la nidification et les chanteurs.
FCB : 2 ind. le 23 janvier, 1 nid/2 oeufs le 26 mars, 3 oeufs le 30, le nid est à 1,80 m du sol. La couvée est détruite par la suite (E. Novak).
FNT : nicheuse, chante en janvier.
FSG : 13 chanteurs entendus dans la nuit du 23 au 24 janvier, 1 nid/2 oeufs le 27 mars, notée en décembre.
MISQ : 1 ind. chante à partir du 8 septembre, 3 im. en septembre, entendue en novembre et décembre.
Soissonnais : 3 chanteurs le 9 janvier à Nanteuil-la-Fosse
1 chanteur le 25 janvier à Soissons puis 1 le 4 mai
2 chanteurs minimum les 19 et 20 mars à Presles et Boves puis 1 le 4 juin.

CHOUETTE EFFRAIE Tyto alba
Fort peu observée, un recensement dans les clochers et vieux bâtiments nous renseignerait fort.

ENGOULEVENT D'EUROPE Caprimulgus europaeus
Forêt de Retz/Cabaret : 1er chanteur le 28 mai, 2 chanteurs en 800 m en juin. Ne chante pas avant 22 h (A. et P. Tombal).
Il serait à rechercher en FSG, dans le camp de Sissonne, etc...

MARTINET NOIR Apus apus
1er le 27 avril à Boué puis 10 le 1er mai.
Noté ensuite à Soissons le 28 avril, à ASL le 29.
MISQ : 200 à 300 en juillet quand il pleut ; le dernier est noté le 22 août.

MARTIN-PECHEUR Alcedo atthis
Boué: ? paradent le 23 mars, noté en août.
MISQ : 1 à 2 de fin août à novembre.
C'est bien faible pour ce bel oiseau.

GUEPIER D'EUROPE Merops apiaster
Une colonie existe dans l'Aisne dans le Laonnois depuis 1977. Par précaution nous ne citons pas la localité : l'espèce a occupé un secteur début juin puis un couple a été retrouvé dans une sablière un peu plus loin. Le 31 juillet, 1 couple nourrit et 3 ind. volants non nicheurs. 1 seul couple a donc niché sur tous les individus observés (P. Pigeon).
L'espèce avait déjà niché sporadiquement de 1968 à 1973 près de Soissons. Elle y est peut-être revenue.

HUPPE FASCIEE Upupa epops
ASL : 1 ind. le 4 mai.
Marchais : 1 nid/3 pulli au printemps (P. Pigeon).
Mont-Notre-Dame : notée au Mont-Bonny en mai.
Elle n'est plus observée en Thièrache. Elle semble en régression sur sa bordure nord-ouest.

PIC VERT Picus viridis
Bien observé, surtout des chanteurs au printemps et des hivernants.
FCB : 1 le 23 janvier, 1 couple le 26 mars, 1 le 6 décembre.
FSG : noté en décembre.
MISQ : 1 couple nicheur sédentaire.
Soissonnais : 1 les 3 janvier et 17 mars à Pommiers
noté en mars à Vauregis et en décembre à Condé-sur-Aisne.
Thièrache :noté en mars-avril, surtout des chanteurs à Autreppes, Boué, Malzy, La Rue Charles, Renneval, en forêt du Regnaval, de la Haye d'Aubenton et en FNT.
1 parade le 27 avril à Autreppes.

PIC NOIR Dryocopus martius
FSG : 1 M. le 18 mai, contacté plusieurs fois ensuite. Nicheur quasi-certain d'après P. Pigeon.
Marchais : 1 M. crie le 31 juillet. Il nicherait d'après le garde.
Il serait à rechercher en forêt d'Hirson et en forêt de Retz où il a déjà niché (nombre de couples ?).

PIC EPEICHE Dendrocopos major
Quelques données éparses.
FNT : 1 ind. en mars-avril (tambourine).
FCB : 1 ind. le 1er janvier, 1 ind. dans un Chêne le 1er avril, 1 couple (parades) le 10 mai, 1 autre couple (parades) le 16.
MISQ : ? couples nicheurs sédentaires.
Thièrache : des tambourineurs en mars-avril à Autreppes, Cuiry-les-Iviers et La Rue Charles.
FSG : hivernants en décembre.

PIC EPEICHETTE Dendrocopos minor
MISQ : 1 M. tambourine à Rouvroy le 9 mars, 1 couple probable sédentaire.
FSG : en décembre.

COCHEVIS HUPPE Galerida cristata
Soissons : noté de janvier à avril, chanteurs en mai.
Prisces : noté en mai.
L'espèce doit être plus répandue qu'il n'y paraît.

ALOUETTE DES CHAMPS Alauda arvensis
Présente dans les champs.
Juvincourt : 20 couples sur 5 km^2 le 2 mai soit 0,4 couple/10 ha pour ce secteur du sud du Laonnois.
S. Boutinot donne une densité de 0,5 couple/10 ha pour le Vermandois.
Noté en migration en bocage : 1 le 23 février à Chigny et 1 le 24 mai à Malzy.

HIRONDELLE DE CHEMINEE Hirundo rustica
1ères le 3 avril à Soissons.
Dernières le 13 octobre à Saint-Quentin.

HIRONDELLE DE FENETRE Delichon urbica
1ères le 10 avril à Folembray.
Dernières : 30 le 14 octobre à Saint-Quentin.

HIRONDELLE DE RIVAGE Riparia riparia
Aucune donnée sur les colonies existant les années précédentes.
Nomanpteuil : 1 colonie.
Dernières : 60 le 13 octobre à Saint-Quentin.

PIPIT DES ARBRES Anthus trivialis
1er chant le 16 avril à Presles.
Noté un peu partout.

PIPIT FARLOUSE Anthus pratensis
Noté comme hivernant en FCB (janvier), à Condé-sur-Aisne (décembre).
Nicheur possible à Juvincourt, Prisces...

BERGERONNETTE PRINTANIERE Motacilla flava
ASL : 10 le 28 avril.
1 le 4 avril à Guignicourt.
Noté en mai à Juvincourt, Ponsericourt.
1 flavissima à Marle le 26 août.

BERGERONNETTE DES RUISSEAUX Motacilla cinerea
En mars à Renneval.
Mondrepuis : 2 juv. fin juin.
Saint-Quentin : 2 en décembre.

BERGERONNETTE GRISE Motacilla alba
Notée à Dagny et Iviers en mars ainsi qu'à Condé-sur-Aisne le 25 décembre.
Boué: notée en avril-mai puis des juv. observés ensuite.
MISQ: 2 couples nicheurs, espèce notée jusqu'en novembre.
Vermand : 1 nid/6 oeufs le 3 juin.

PIE-GRIECHE ECORCHEUR Lanius collurio
On note le retour de cette espèce dans le nord de l'Aisne.
Englancourt : 1 M. bien cantonné le 24 juillet (H. Dupuich), pas revu par la suite mais nicheur possible.

FCB : 1 couple le 17 mai, 1 M. chante le 29, 2 ad./2 juv. à l'envol le 20 juillet (E. Novak)
FSG : 1 ind. le 18 mai (P. Pigeon)

PIE-GRIECHE GRISE Lanius excubitor
Peu de données pour cette espèce.
Dagny : 2 individus distants de 50 m dont 1 alarme le 23 mars.
Guignicourt : 1 le 2 mars.
Plomion : 1 le 23 mars.
MSB : 3 le 24 décembre.
Sissonne : 1 le 25 août dans une pâture près d'une peupleraie, peut-être un nicheur local ?
Une recherche de l'espèce en Thièrache pourrait apporter quelques renseignements.

LORIOT D'EUROPE Oriolus oriolus
Les premiers début mai : 1 chanteur en FCB le 5, puis 2 couples avec M. chanteurs le 7 à Chassemy, 1 le 10 mai à Bois et 3 le 11 en Forêt de Marfontaine.
Bois du Hauty (orée est) : 4 chanteurs du 27 juin à début juillet (camp G.O.N.).
MISQ : 4 à 6 couples.

ETOURNEAU SANSONNET Sturnus vulgaris
De grosses bandes en hivernage. Dortoir en décembre au marais Saint-Boétien.
Vermand : 1 nid/1 oeuf puis 6 le 12 avril.
Nicheur courant.

CINCLE PLONGEUR Cinclus cinclus
Noté au printemps au Pas Bayard/Hirson sur l'Oise. Un recensement le long de l'Oise et des ruisseaux affluents en Forêt de Saint-Michel renseignerait sur le statut de cet oiseau.

TROGLODYTE Troglodytes troglodytes
1ers chants le 20 février en FNT.

ACCENTEUR MOUCHET Prunella modularis
Aucune donnée intéressante.

TRAQUET MOTTEUX Oenanthe oenanthe
1 le 11 mai dans le secteur de Ponséricourt.

TRAQUET TARIER Saxicola rubetra
Noté en migration.
5 le 4 mai à ASL, plusieurs le 26 août à Mâchecourt dans les champs.
Aucune donnée de nidification.

TRAQUET PATRE Saxicola torquata
Noté en mars à Saint-Clément, 1 M. le 18 mai en FSG.
Peu de données par ailleurs.

ROUGEQUEUE NOIR Phoenicurus ochruros
Hivernage : 1 M. fin janvier à Dagny-Lambercies.
Noté en mars : 1 M. à Brunehamel, 1 F. à Cuiry-les-Iviers et 1 M. à Le Hocquet.

Soissons : 1 chanteur le 28 mars.
Englancourt : 1 le 26 août.
Boué : 1 le 27 août.

ROUGEQUEUE A FRONT BLANC Phoenicurus phoenicurus
Beaucoup de M. cantonnés en mai et juin. On note une augmentation du nombre des données.
Bosmont : 1 M. le 11 mai.
Boué : 1 M. le 1er mai.
Chassemy : 1 M. chanteur le 13 mai.
Pommiers : 1 M. chanteur le 25 avril.
Soissonnais : 1 M. cantonné le 8 avril et en mai dans le quartier Gouraud, 1 M. chanteur le 29 avril au Bois de Bresles.

ROUGEGORGE Erithacus rubecula
Nicheur courant.
Vermand : 1 nid/pulli de 3 à 4 jours le 6 mai.

ROSSIGNOL PHILOMELE Luscinia megarhynchos
1ers le 15 avril en FCB.
Noté en avril à Margival, Vermand, ASL et en mai à Boué, Verneuil, Ponséricourt et au Nouvion-en-Thièrache.
MISQ : 20 à 30 couples nicheurs.

GRIVE LITORNE Turdus pilaris
Notée en hivernage jusque fin mars en Thièrache.
Etang du Pas-Bayard/Hirson : min. 2 couples, transport de nourriture (Le Héron 1980 n°4, p. 31 à 41).
Le Moulin-Lointain/Le Nouvion-en-Thièrache : 1 ad. le 1er mai, pas noté en juin (absence d'observateurs), 1 ad. le 29 juillet au même endroit (H. Dupuich) ; nicheuse probable.
La Folie/Boué : 1 ad. seul le 10 mais, pas revu par la suite.
Toutes ces observations confirment l'installation de l'espèce en Thièrache. Le biotope est bien typé : bordures d'étangs avec haies ou bois proches.
Cette arrivée de l'espèce dépend du même noyau de Grives litornes que l'Avesnois tout proche.
Cette progression sera à surveiller en 1981.

MERLE NOIR Turdus merula
Nicheur courant et précoce.
Vermand : couvée la 1ère quinzaine de mars, 1 nid/4 oeufs le 25 mars, pulli le 1er avril.
Reneuil/ASL : 1 nid/4 oeufs le 28 avril.

GRIVE MAUVIS Turdus iliacus
Hivernage jusque fin mars et à partir de novembre en Thièrache et au MSB.

GRIVE MUSICIENNE Turdus philomelos
Bien notée en hivernage en Thièrache.
Vermand : 1 nid/3 oeufs le 30 mars (S. Boutinot).
FCB : 4 nids en avril puis 10 nids, aucun ne résiste aux prédateurs.
MISQ : 3 à 5 couples nicheurs.

GRIVE DRAINE Turdus viscivorus
Notée en mai à Bosmont.
Vermand : envol de jeunes le 18 avril.
MISQ : 2 couples nicheurs.
Notée en hivernage.

BOUSCARLE DE CETTI Cettia cetti
Quelques chanteurs sont notés.
Boué : 1 chanteur en mars, 2 le 27 avril, 3 en mai puis 2 fin mai. 2 à 3 couples probables. L'espèce n'a pas disparu après le coup de froid de janvier 1979.
Chassemy : 1 chanteur le 7 mai.
MISQ : 2 à 3 couples nicheurs.
Reneuil/ASL : 1 chanteur le 28 avril, retour depuis l'hiver 1978-79.
Saint-Boétien : 2 chanteurs en mai.
On note un léger retour de l'espèce après le dur hiver 1978-79.

LOCUSTELLE LUSCINIOIDE Locustella luscinioides
Quelques chanteurs entendus.
MISQ : 1 chanteur, 1 couple nicheur ?
Reneuil/ASL : 1 le 28 avril.
Verneuil : 2 le 3 mai.

LOCUSTELLE TACHETEE Locustella naevia
Saint-Boétien : 2 chanteurs le 2 mai.
Boué : 1 chanteur le 10 mai.

PHRAGMITE DES JONCS Acrocephalus schoenobaenus
Boué : 1er chanteur le 27 avril, 1 parade le 1er mai, noté jusque fin août, min. 4 couples nicheurs.
MISQ : nicheur commun.
Reneuil/ASL : 1ers le 28 avril.
Verneuil : chanteurs en mai.

ROUSSEROLLE VERDEROLLE Acrocephalus palustris
MISQ : 2 couples nicheurs.
Happencourt et Artemps : 2 couples le 5 mai.

ROUSSEROLLE EFFARVATTE Acrocephalus scirpaceus
Boué: 1ers chants le 1er mai, nombreux couples nicheurs.
MISQ : retour le 24 mai.
Reneuil/ASL : notée le 4 mai.
Aucune donnée par ailleurs.

ROUSSEROLLE TURDOIDE Acrocephalus arundinaceus
Vermand : nicheuse en 1979 et 1980.
Aucune donnée par ailleurs.

HYPOLAIS ICTERINE Hippolais icterina
1 chanteur le 15 juin en forêt du Nouvion-en-Thièrache. Cette observation semble marquer la limite sud de l'espèce en Avesnois et Thièrache. Elle se situe plus au sud que les Hypolaïs ictèrines signalées par J.C. Tombal dans Le Héron.
L'espèce a toujours été présente en forêt du Nouvion.

HYPOLAIS POLYGLOTTE Hippolais polyglotta
1 M. chanteur en juin-juillet au Bois de Hauty (J.C. Tombal).
1 chanteur le 11 mai à Bosmont (C. Delahoche).

CISTICOLE DES JONCS Cisticola juncidis
1 chanteur le 24 août à Bucy-le-Long (G. Baudoin).

FAUVETTE DES JARDINS Sylvia borin
Observée assez couramment en forêts, bocages et parcs.
1ères le 1er avril en FCB.

FAUVETTE A TETE NOIRE Sylvia atricapilla
Notée en mars à Boué. Nicheuse commune.

FAUVETTE GRISETTE Sylvia communis
1ères (dont 1 chanteur) le 25 avril à Soissons.
Nombreuses en mai dans les biotopes favorables.

FAUVETTE BABILLARDE Sylvia curruca
1ères le 29 avril à Vermand.
Notée ensuite à Prisces, Chassemy (mai).
MISQ : 1 chanteur du 1er au 25 juin, ensuite plus rien...

POUILLOT FITIS Phylloscopus trochilus
1ers le 3 avril à Soissons.
Noté ensuite à Boué.
FNI : 1 ad./5 juv. le 15 juin.

POUILLOT VELOCE Phylloscopus collybita
Retour le 16 février au Nouvion-en-Thièrache.
Noté le 27 février à Guignicourt puis près de Soissons et à Vermand en mars. Courant dès avril.
Vermand : pulli le 3 juin, envol le 18.

POUILLOT SIFFLEUR Phylloscopus sibilatrix
Marfontaine : 2 le 11 mai.
Bois Morin/Chassemy : 2 chanteurs le 5 juin.

ROITELET HUPPE Regulus regulus
Hivernant commun.
Marle : le 27 août en forêt.

ROITELET TRIPLE-BANDEAU Regulus ignicapillus
Bois du Hauty/Mondrepuis : 2 chanteurs en juin-juillet, c'est un site éventuel de nidification.

GOBEMOUCHE NOIR Ficedula hypoleuca
1er(migrateur) le 4 mai à Reneuil/ASL.
Aucune donnée de nidification.

GOBEMOUCHE GRIS Muscicapa striata
1er le 4 mai à Reneuil/ASL.

MESANGE NONNETTE Parus palustris
Notée en divers lieux. Peu de données intéressantes.

MESANGE BOREALE Parus atricapillus
Peu de données sur l'espèce.

MESANGE HUPPEE Parus cristatus
FCB : notée en hivernage, abondante en avril et mai.
Pommiers : notée en avril.

MESANGE BLEUE Parus caeruleus
FCB : nicheuse (nid découvert).
Espèce commune.

MESANGE NOIRE Parus ater
Surtout notée en hivernage : plusieurs ind. en FCB en janvier.
1 ind. le 9 mars à Saint-Quentin.

MESANGE CHARBONNIERE Parus major
Courante. 1 oeuf le 16 avril à Vermand.

MESANGE A LONGUE QUEUE Aegithalos caudatus
FCB : en janvier et avril-mai (max. de 10 ind.).
ENT : 2 ad./5 juv. le 22 juillet.
Vermand : 1 nid le 25 mars.
Notée en mars à Ringeot, Saint-Clément, Plomion et en décembre au MSB.

SITTELLE TORCHEPOT Sitta europaea
Des chanteurs signalés en FCB, en forêt de Marfontaine, à Margival, Nanteuil-la-Fosse, Presles, Boves et Soissons.
Rouvroy/Saint-Quentin : 1 nid à 1,5 m de haut, entrée rétrécie, envol des juv. le 3 juin (S. Boutinot).

GRIMPEREAU DES JARDINS Certhia brachydactyla
FCB : en janvier.
MISQ : 1 à 2 couples.
Des chanteurs sont signalés à Presles et Boves (mars), Saint-Clément, Soissons (février) et en forêt de Marfontaine.

BRUANT PROYER Emberiza calandra
Assez bien répandu dans les régions agricoles comme à Saint-Clément, Prisces...
Juvincourt : cantons notés le 1er mai.
ASL : 2 couples le 28 avril.

BRUANT JAUNE Emberiza citrinella
Noté en période de nidification à ASL, Autreppes, Boué, Dagny (2 M.), Margeval, Malzy, Le Nouvion-en-Thièrache, Prisces, Renneval.
A noter, 1 ind. avec une tête blanche et le reste jaune le 4 août à Boué.

BRUANT ZIZI Emberiza cirlus
Aucune donnée. L'espèce doit pourtant nicher dans le sud de l'Aisne.

BRUANT DES ROSEAUX Emberiza schoeniclus
Observé en mars à Dagny et Boué.
Boué : quelques couples nicheurs.
FCB : 5 M. 1 F. le 26 mai dans une clairière en milieu sec.
Juvincourt : 1 le 2 mai en milieu cultivé.

MISQ : 1 couple nourrit le 4 juin.
Ponséricourt : 1 canton en milieu cultivé le 11 mai.

PINSON DES ARBRES Fringilla coelebs
Bien répandu en hivernage et en nidification dans les lieux propices.

PINSON DU NORD Fringilla montifringilla
Quelques bandes : 100 le 15 mars à Dagny, 300 le 23 mars à Cuiry, 8 à Ringeot, 30 à Saint-Clément.
FCB : 1 M. tardif le 26 mai (E. Novak).

VERDIER D'EUROPE Carduelis chloris
Noté en février, avril et mai en Thièrache et en FCB.
Vermand : 1 nid, 1 nid/3 pulli le 6 avril.

CHARDONNERET Carduelis carduelis
Noté en janvier à Saint-Simon, en mars à Carneaux.
Individus cantonnés en mai à Boué, Prisces, Ponséricourt et en FCB.

TARIN DES AULNES Carduelis spinus
Derniers le 7 avril à Brunehamel : 15 ind.
Bande en hivernage : 60 le 24 décembre au MSB.

LINOTTE MELODIEUSE Carduelis cannabina
Notée régulièrement tous les mois.

SIZERIN FLAMME Carduelis flammea
6 ind. en hivernage le 24 décembre au MSB (L. Kérautret).

SERIN CINI Carduelis serinus
1 M. chanteur le 23 mars à Vermand, 1 M. chanteur le 3 avril à Soissons.
2 ind. le 24 décembre dans le secteur 4 carte IGN 1/50 000e de Craonne.

BEC-CROISE DES SAPINS Loxia curvirostra
FCB : 1 M. le 1er avril, 1 M. 1 F. le 28 mai (E. Novak).
Il semble que l'espèce soit observée actuellement en forêt de plaine (Somme, Marne).

BOUVREUIL PIVOINE Pyrrhula pyrrhula
Bien noté en janvier en FCB.
Noté en mai à Boué, Prisces, Ponséricourt.

MOINEAU DOMESTIQUE Passer domesticus
Rien à signaler.

MOINEAU FRIQUET Passer montanus
Noté en mai à Boué, Ponséricourt...

GEAI DES CHENES Garrulus glandarius
Noté en hivernage dans les massifs forestiers. Nicheur commun.

PIE BAVARDE Pica pica
Nicheuse commune.
MISQ : 3 juv. peu volants le 13 mai.

CHOUCAS DES TOURS Corvus monedula
MISQ : 2 à 3 nids.
Le Nouvion-en-Thièrache : 1 colonie.

CORBEAU FREUX Corvus frugilegus
Quelques colonies
Cuiry-les-Iviers : 100 à 150 nids
Athies-sous-Laon : 30 nids
Dagny : 15 nids
MISQ : 21 nids
Verneuil : 5 nids

CORNEILLE NOIRE Corvus corone
- type C. c. corone
400 le 23 mars à Cuiry-les-Iviers
commune en Thièrache
MISQ : 2 à 3 couples
- mantelée C. c. cornix
1 avec des Corbeaux freux le 25 décembre à Pernant (J.C. et C. Tombal).

Corneille mantelée

