Recensement 1996 des oiseaux nicheurs des falaises picardes

François SUEUR

Introduction

L'avifaune des falaises picardes a dans l'ensemble été assez peu étudiée. Une brève synthèse a été publiée (SUEUR, 1983a) et 2 recensements assez complets effectués (SUEUR, 1983b ; RAEVEL, 1986). Des études mentionnant des résultats quantitatifs ont été réalisées sur 2 espèces : Fulmar boréal *Fulmarus glacialis* (ROBERT, 1979a & 1984) et Goéland argenté *Larus argentatus* (ROBERT, 1979b). Depuis 1986 aucune donnée chiffrée n'a été publiée sur ce site, aussi avons-nous entrepris de réaliser un recensement exhaustif de l'avifaune nicheuse. Celui-ci, effectué le 13 juin 1996, est toutefois un peu tardif pour 2 espèces : Choucas des tours *Carvus manedula* et Etourneau sansonnet *Sturnus vulgaris*.

Résultats

Les résultats du recensement 1996 et les données antérieures connues figurent dans le tableau ci-après.

Fulmar boréal *Fulmarus glacialis*
14 couples nicheurs potentiels, étant donnée la date, ont été repérés. Une certaine confusion règne quant à l'évolution du nombre de couples nicheurs car les différents auteurs (ROBERT, 1979a & 1984 ; SUEUR, 1983b ; RAEVEL, 1986 ; MERCIER, 1987 & *in* COMMECY & *al.*, 1995) ne retiennent pas les mêmes classes pour définir le statut des oiseaux : nombre de « couveurs », de couples (y compris immatures), de sites... Dans le tableau ci-après, sont mentionnés le nombre de couples nicheurs probables et certains résultant d'une interprétation des travaux publiés et de nos propres observations. Dans l'ensemble, une augmentation de cet effectif est constaté.

Faucon crécerelle *Falco tinnunculus*
2 couples ont été notés lors de notre recensement mais un seul était cantonné de manière certaine dans la falaise. ROBERT (1984) mentionnait déjà, sans plus de précisions, la reproduction de cette espèce dans les falaises.

Goéland argenté *Larus argentatus*
Même en tenant compte de la fourchette assez large de 350 à 500 couples en 1980 (moyenne de 425 couples mentionnée dans le tableau ; RAEVEL & SUEUR *in* COMMECY & *al.*, 1995), les effectifs semblent s'être accrus entre la période 1979-1985 (220 à 425 couples ; valeurs pouvant varier fortement en raison des dates de dénombrement comme l'écrivent RAEVEL, 1986 puis RAEVEL & SUEUR *in* COMMECY & *al.*, 1995) et ce recensement de 1996 (480 couples) effectué à une période où les effectifs cantonnés sont moindres qu'en avril et mai (époque des dénombrements de 1983 par exemple).

Effectifs des oiseaux nicheurs des falaises picardes de 1972 à 1996 (en nombre de couples ; en nombre d'individus pour *Columba livia* ; taux d'occupation des terriers de *Riparia riparia* inconnu en 1982 et extrapolation du nombre de couples pour *Corvus monedula* en 1996)

	1972	1973	1974	1975	1976	1977	1978	1979	1980	1982	1983	1985	1986	1996
Fumarus glaciulis	1	1	4	4	8	5	7	9		12	9	11	+ 8	14
Falco tinnunculus														1-2
Larus argentatus								300	425		220	310		480
Columba livia									(6)		(7)	(15)		(24)
Columba oenas											31	35		30
Strix alnco														1
Riparia riparia				13						(69)	+	12		
Delichon urbica										9	8	45		21
Motacilla alba											1	1		4
Phoenicurus ochruros												2		
Corvus monedula											26	47		(26)
Sturnus vulgaris											12	13		3-4
Passer domesticus												18		3

Pigeon biset (feral) *Calumba livia*
24 individus ont été recensés le 13 juin 1996 ce qui tendrait à montrer une certaine tendance à l'augmentation si nous considérons les résultats précis publiés mois MERCIER (*in* COMMECY & *al.*, 1995) mentionne la présence d'une vingtaine d'individus dans les années 80. Une certaine tendance au retour vers le phénotype sauvage s'observe à quelque distance des agglomérations : 3 couples bleutés à mi-distance entre Mers-les-Bains et Le Bois de Cise.

Pigeon colombin *Calumba oenas*
Avec 30 couples cette année et malgré une date de recensement peut-être un peu tardive pour cet oiseau, ses effectifs semblent sensiblement constants.

Chouette hulotte *Strix aluca*
La découverte d'un pullus mort permet de prouver pour la première fois la reproduction certaine de cette espèce dans les falaises picardes.

Hirondelle de fenêtre *Delichan urbica*
21 couples ont été notés cette année. Les effectifs paraissent très fluctuants selon les années sans que les dates de dénombrements en soient uniquement responsables.

Bergeronnette grise *Matacilla alba*
4 couples nicheurs ont été observés en 1996 alors qu'un seul était recensé en 1983 et 1985.

Choucas des tours *Corvus manedula*
18 couples et un groupe de 26 individus ont été observés. En admettant une production d'environ 2 jeunes à l'envol par couple, l'effectif nicheur devait être de l'ordre de 26 couples.

Etourneau sansonnet *Sturnus vulgaris*
Etant donnée la date tardive du recensement pour cette espèce et le départ de la plupart des oiseaux hors de la zone d'étude, 3 à 4 couples seulement ont été repérés.

Moineau domestique *Passer domesticus*
Seuls 3 mâles chanteurs ont été notés à proximité de Mers-les-Bains. Cette espèce n'ovait pas été observée lors du recensement de 1983 (SUEUR, 1983b) mais 18 couples se reproduisaient en 1985 (RAEVEL, 1986). Il semble que les effectifs de cet oiseau soient très fluctuants dans ce biotope, somme toute marginal pour lui.

Conclusion

Ce recensement de 1996 a permis de prouver la nidification de la Chouette hulotte et d'actualiser les données sur les effectifs des oiseaux nicheurs sur les falaises picardes. Une augmentation du Fulmar boréal, du Goéland argenté et de la Bergeronnette grise est constatée. Les autres espèces rencontrées cette année ont des effectifs stables ou fluctuants sans tendance précise. 4 oiseaux cités précédement comme nicheurs dans ce biotope n'y ont pas été retrouvés cette année : Hirondelle de rivage, Troglodyte mignon *Troglodytes troglodytes*, Rougequeue noir et Moineau friquet *Passer montanus* (SUEUR, 1983b ; ROBERT, 1984 ; RAEVEL, 1986).

Bibliographie

COMMECY X., MERCIER E. & SUEUR F. (1995) Atlas des oiseaux nicheurs de Picardie (1983-198
(2ème édition). *L'Avocette*, 241 p.

MERCIER E. (1987) Le Fulmar (*Fulmarus glacialis*) estivant et nicheur en Picardie. *L'Avocette*, 11 : 1
40.

RAEVEL P. (1986) Effectifs au printemps 1985 des oiseaux nicheurs des falaises picardes. *L'Avacett*
10 : 33-36.

ROBERT J.C. (1979a) Actualités ornithologiques du printemps 1979. *Documents zool.*, 2 (2) : 41-44.

ROBERT J.C. (1979b) Le statut des Laridés de la baie de Somme. *Alauda*, 47 : 247-258.

ROBERT J.C. (1984) La colonisation des falaises picardes par le Fulmar boréal *Fulmarus glacialis*
Picardie Ecalagie, Série II (2) : 19-34.

SUEUR F. (1983a) Faune des falaises et de l'estran rocheux picards. *Picardie Nature*, (19) : 8-10.

SUEUR F. (1983b) Recensement des oiseaux nicheurs des falaises picardes. *L'Avacette*, 7 : 193-195.

Couple de Faucons crécerelles *Falca tinnunculus* (Dessin de CHRIS)

