Mue tardive d'un Pluvier doré *Pluvialis apricaria*

Florent VIOLET

Le 5 décembre 1998, au Nord de la Réserve Naturelle de la Baie de Somme, parmi un groupe 291 Pluviers argentés *Pluvialis squatarola* et plusieurs milliers d'autres limicoles (Bécasseaux variabl *Calidris alpina*, Huîtriers pies *Haematopus ostralegus*, Courlis cendrés *Numenius arquata*, Barges rouss *Limosa lapponica* et Grands Gravelots *Charadrius hiaticula*), un Pluvier doré *Pluvialis apricaria* distingue tout particulièrement. Sa présence au sein des autres Pluviers est déjà un fait remarquable, m c'est surtout pour son apparence que l'observation présente toute son importance. En effet, cet indivi arbore, en net contraste avec tous les autres Charadriidés, un plumage de type nuptial. L'aspect est parfa le dos est jaune doré et du noir s'étend de la tête jusqu'à la base de la queue avec de larges sourcils blar se prolongeant en bandes sur les côtés du cou et s'élargissant de chaque côté de la poitrine pour s'ache au niveau des couvertures sous-caudales.

Les données bibliographiques à ce sujet (CRAMP & SIMMONS, 1983) nous révèlent que la m post-nuptiale s'étend habituellement de fin juillet à mi-octobre alors que la mue pré-nuptiale s'effectue la fin février à début mai et le plus souvent entre mi-mars et mi-avril. Il s'agit donc vraisemblablement d' cas de mue post-nuptiale tardive. De plus, il est intéressant de noter que le changement complet de pluma prend en moyenne 14 à 15 semaines et peut dépasser les 4 mois lorsque l'individu est en migration, com c'est sans doute le cas avec cet oiseau.

Bibliographie

CRAMP S. & SIMMONS K.E.L. (1983) *The Birds of the Western Palearctic*, vol. III. Oxford, London, N York (Oxford University Press), 913 p.

Florent VIOLET
11/13 boulevard Carnot
80460 Ault