

ENQUETE NATIONALE LIMICOLES NICHEURS DE FRANCE 1995 - 1996

BILAN DE LA PROSPECTION 1995 ET ORIENTATIONS POUR 1996.

Par : Franck SPINELLI

1 - BILAN DE LA PROSPECTION 1995.

Le premier bilan qui s'impose pour la saison 1995 est que la prospection a été très faible, en témoigne le nombre d'observateurs : 7 au total.

Serge BARANDE : SB
Jean Bernard MARQUE : JBM
Mr LEROY : L

Pascal MALIGNAT : PM
Rémi FRANCOIS : RF

Rémy BARADEZ : RB
Franck SPINELLI : FS

En ce qui concerne les espèces retenues pour cette enquête, seules deux ont été contactées dans l'Oise à savoir :

- LE VANNEAU HUPPE et
- LE PETIT GRAVELOT

LE VANNEAU HUPPE EN 1995.

BILAN DES OBSERVATIONS.

(Np: Nicheur possible - NP: Nicheur Probable - NC: Nicheur Certain)

| COMMUNE | MILIEU | OBSERVATIONS | COMPORTEMENT | EFFECTIF |
|--------------------------|----------------|--|---|------------------------|
| LE LYS | Prairie humide | 8 le 22/03/95 (JBM) 15 le 11/04/95 (JBM) 5 le 06/06/95 (JBM) 1 le 04/07/95 (JBM) 0 le 17/07/95 (JBM) | Parades Certains semblent couvrir Attaque d'une corneille qui survole le territoire | 7 à 8 cples NP |
| CHEVRIERES | Gravière | 3 cples le 29/04/95 (PM) 3 cples le 04/05/95 (PM) | Couples cantonnés + défense de territoire | 3 cples NC |
| LA CROIX SAINT OUEN | Prairie | 1 cple le 17/04/95 (PM) 1 cple le 20/05/95 (PM) | 1 individu couve | 1 cple NC |
| BORAN SUR OISE | Marais | 1 à 2 cples le 01/05/95 (PM) | 1 couple cantonné | 1 cple NP 1 cple NC |
| LA CHAPELLE EN SERVAL | Prairie | 2 cples le 01/05/95 (PM) | Les 2 couples couvent | 2 cples NC |

Vanneaux huppés (suite)

| COMMUNE | MILIEU | OBSERVATIONS | COMPORTEMENT |
|---------------------|----------------|---|---|
| PIMPRESZ SUD-EST | Prairie humide | 6 le 12/04/95 (FS) 2 le 27/04/95 (FS) 2 le 09/06/95 (FS) | 2 individus paragent Défense de territoire |
| BAILLY NORD | Prairie humide | 0 le 12/04/95 (FS) 5 le 27/04/95 (FS) 6 en mai 95 (L) 4 le 09/06/95 (FS) | Parades et défense de territoire |
| PIMPRESZ | Gravière | 1 à 2 cples le 15/04/95 (RF) | Alarmes et défense de territoire |
| NOYON Z.I. | Champ maïs | 1 cple le 12/05/95 (RF) | Parades |
| BABOEUF | Champ maïs | 4 à 5 cples le 12/05/95 (RF) 3 cples le 30/05/95 (RF) | Parades Parades et alarmes |
| MORLIN-COURT | Champ maïs | 2 cples le 30/05/95 (RF) | Parades et alarmes |

Soit au total pour l'Oise : - **14 à 19 couples Nicheurs Probables** et
 - **11 couples Nicheurs Certains**

CARTOGRAPHIE DES COUPLES DE VANNEAUX HUPPÉS RECENSES EN 1995



LE PETIT GRAVELOT EN 1995.

BILAN DES OBSERVATIONS.

| COMMUNE | MILIEU | OBSERVATIONS | COMPORTEMENT |
|------------------------|------------|---|--|
| VERBERIE | Gravière | 1 cple le 03/05/95 (SB) 1 cple le 04/05/95 (SB) | Alarmes Alarmes |
| MORU | Gravière | 3 ad le 22/04/95 (PM-RB) 2 ad le 04/05/95 (PM-RB) 4 ad le 20/05/95 (PM-RB) 2 ad le 10/06/95 (PM-RB) 3 ad le 24/06/95 (PM-RB) | Nombreuses parades pendant le mois de Mai |
| CHEVRIERES | Gravière | 4 ad le 06/05/95 (PM-RB) 3 ad +1 juv le 24/06/95 (PM-RB) | 2 ad couvent mais sans suite puis obs de plusieurs juvéniles |
| VERBERIE (Pont TGV) | Gravière | 1 cple +1 ad le 20/05 (PM-RB) | 1 couple parade |
| VERBERIE | Gravière | 3 + 2 le 20/05/95 (PM-RB) 2 cples le 27/05/95 (PM-RB) 3 + 1(couve) le 10/06 (PM-RB) 8 ad le 17/06/95 (PM-RB) 2 cples +3juv le 08/07 (PM-RB) | Parades 1 cple + 2 juv non volants 1 cple + 2 juv volants 3 individus couvent |
| BORAN SUR OISE | Gravière | 3 cples le 20/05/95 (PM-RB) | 2 ind couvent et alarment 1 cple + 2 juv non volants |
| BABOEUF | Champ maïs | 1 le 12/05/95 (RF) 1 le 19/05/95 (RF) | Parades Parades |
| PIMPRESZ | Gravière | 3 à 4 cples le 15/04/95 (RF) | Parades |
| VARESNES | Champ maïs | 1 à 2 cples en mai 95 (RF) | |

Soit au total pour l'Oise :
- **2 couples Nicheurs possibles,**
- **11 à 14 couples Nicheurs Probables et**
- **5 couples Nicheurs Certains.**

CARTOGRAPHIE DES COUPLES DE PETITS GRAVELOTS RECENSES EN 1995.



2 - ORIENTATIONS POUR 1996.

Comme nous pouvons le voir sur les deux cartes précédentes, la prospection dans l'Oise a essentiellement concerné la vallée de l'Oise et ses abords immédiats. L'ensemble des autres sites n'ayant reçus aucune visite.

De ce fait en 1996 il faudra s'attacher à revisiter les sites préalablement décrits mais surtout à prospecter toute la partie Ouest du département ainsi que la partie Sud-Est.

D'autre part il serait intéressant de préciser ou de confirmer le statut de "Nicheur Certain" sur les sites connus en 1995 et dont les indices de nidification ne sont restés que "Probable".

Nous reprendrons donc dans les lignes qui suivent les orientations et les directives de prospection, espèce par espèce, pour 1996 dans l'Oise.

A - LE VANNEAU HUPPE.

Comme nous pouvons le voir au niveau des observations de 1995, le vanneau huppé fréquente dans l'Oise essentiellement les **PRAIRIES HUMIDES** mais aussi les **CHAMPS DE MAÏS**.

Si l'intérêt des vanneaux huppés pour les prairies humides n'est plus à prouver, l'intérêt pour les champs de maïs s'explique essentiellement du fait que la culture du maïs entraîne une nudité prolongée du sol au printemps tout à fait favorable à la recherche de milieu dégagé pour nidifier, ceci contrairement aux champs de céréales qui ne sont plus favorables à l'époque du cantonnement des couples, c'est à dire dès la mi mars mais surtout en avril. Dès juin nous assistons déjà à des stationnements post nuptiaux.

Si l'on se réfère à " l'atlas des oiseaux nicheurs de France. 1985-1989", le vanneau huppé était noté présent sur quasiment toutes les cartes exceptée la zone du plateau Picard.

Dans le but d'orienter vos recherches en 1996, le vanneau huppé était noté dans l'Oise :

Nicheur possible :

- Au marais Dozet - Touthoie en 88, 90, 91 et 92.
- A Uilly Saint Georges en 88.
- A Commelles en 90.
- En Forêt de Chantilly - Parcelle 340-342 en 92.
- A Soutraine en 91.
- A Breuil - Neuville en 92.
- En vallée de la Thève en 91 et 92.

Nicheur Probable :

- A Chantilly en 91.
- A Coye - Lamorlaye en 89 et 90.
- A Neaufles en 90.
- A Héronval - Vaudancourt en 92.
- Au Marais de Sacy en 88, 89 et 90.
- A la sucrerie de Bresles en 90.
- A Thiers sur Thève en 92.
- A Le Berval en 88.
- A Pondron en 89 et 90.

Nicheur Certain :

- A Lamorlaye en 91.
- A Chantilly en 92. (Prairie humide séparant le canal Saint Jean et le grand canal)
- A Verneuil en Halatte en 88 et 89.
- A Moru en 88 et 89.
- A Montlognon en 88.
- A Peroy en 89.
- A Vauciennes (Bassins de décantation) en 88, 89, 90 et 91.
- A Mortefontaine en 93 et 94.
- A Noyon Nord "Bois de Breuil" en 94.
- A Chiry Ourscamps en 94.
- A Varesnes en 94.

B - LE PETIT GRAVELOT.

Les biotopes utilisés par le petit gravelot dans l'Oise pour nidifier sont, quand à eux, représentés essentiellement par **GRAVIERES**. Il conviendra donc, en 1996, de visiter l'ensemble de ces sites existant dans notre département; ceci le mois d'avril et en mai.

Il faut cependant noter que le petit gravelot peut également utiliser pour nidifier des sites beaucoup plus artificiels comme les ballastières, les sablières, les digues, les parkings, etc...

Comme pour le vanneau huppé, en 1996 il faudra étendre la prospection aux sites où il était déjà connu auparavant et aussi à de nouvelles zones.

Le petit gravelot a déjà été contacté dans l'Oise sur les sites suivants :

Nicheur possible :
- Au Marais Dozet - Touthoie en 89.
- A Chantilly en 89 et 90. (Entre le canal Saint Jean et le grand canal)
- A Baillon en 89.
- A Commelles en 90.

Nicheur Probable :
- Au grand marais - Maysel en 89
- Près de Compiègne Z.I. en 90.
- A Dangu en 89.
- A Villers Saint Sulpice en 90 et 91.
- A la sucrerie de Bresles en 90.
- A la sucrerie de Saint Just en Chaussée en 89 et 90.
- A Wavignies en 90.

Nicheur Certain :
- A Vineuil en 91.
- A Neaufles en 90, 91 et 92.
- A Verneuil en Halatte en 92.
- A Vauciennes (bassins de décantation) en 90 et 91.
- A Morlincourt en 94.
- Au Nord de Thourrotte en 94.

Bien que le vanneau huppé et le petit gravelot soient les espèces les plus communes à rencontrer dans l'Oise, il ne faut pas oublier les autres qui ont déjà été contactés auparavant et qui font partie de l'enquête nationale; à savoir :

C - L'ECHASSE BLANCHE.

La reproduction de cette espèce est certaine en 1994 à Chevières.
Très nombreuses observations des adultes et des juvéniles.

D - LE COURLIS CENDRE.

Observé en période de reproduction :
- A Manicamps en 90, 91, 92 et 93.
- A Varesnes en 90.
- A Morlincourt en 93.

E - LA BECASSINE DES MARAIS.

Nidification possible dans le Nord de la vallée de l'Oise, malgré le peu d'observation en période de reproduction. Dans "l'atlas des oiseaux nicheurs de France. 1985-1989" elle était notée "nicheuse Certaine" vers Boran sur Oise "nicheuse Probable" en Vallée de l'Oise et de l'Aisne.

F - LE CHEVALIER GUIGNETTE.

Il était noté "Nicheur Probable" dans toute la partie Est du département de l'Oise lors de l'enquête de "l'atlas des oiseaux nicheurs de France. 1985-1989".

Toutes ces précisions aidant, je vous souhaite de bonnes et nombreuses observations pour 1996.