

CARNET DE ROUTE
LEUCATE (AUDE)



Un séjour dans la région méditerranéenne offre pour des ornithologues picards, un dépaysement assuré. Le site de Leucate (Aude) permet, outre l'observation de la migration prénuptiale, de faire connaissance avec de nombreuses espèces méditerranéennes.

Nous avons eu l'occasion d'y séjourner durant la première quinzaine du mois de Mai 1997 et n'avons pas été déçus par la richesse et la variété de l'avifaune de cette région.

Le site de Leucate a été l'objet, durant les années 80, d'un suivi de la migration suite à la constatation d'actes de chasse sur les bondrées en migration. Quelques procès ont suffi à faire cesser cette pratique. Selon la force de la tramontane (vent du NO), il est possible d'y faire de nombreuses et belles observations. En effet, ce vent repousse les oiseaux vers le littoral. Les mois de Mars et Avril voient passer des belles troupes de passereaux, alors que la bondrée choisit plutôt le mois d'Avril et le début de Mai. Lorsque le vent tourne au Sud, les oiseaux passent plus haut. S'il vient de la mer, les migrateurs se déplacent davantage à l'intérieur.



Le plateau au-dessus de Leucate et le rebord de la falaise qui domine la Mer Méditerranée nous ont permis d'observer la migration des hirondelles, martinets et guépiers. Sur ce site, nous avons pu voir : Monticole bleu, Traquet oreillard, Alouette calandrelle, Pipit rousseline, Fauvette à lunettes, Huppe fasciée et le Cochevis huppé très abondant.

Sur la rive de l'étang de Leucate, un Etouneau unicolore venu se baigner, des Stemes naines, Gravelots à collier interrompu, Goélands leucophées, Bruants zizi, un Balbuzard pêcheur en migration ont été observés; un Hibou petit-duc s'est fait entendre une nuit.


Sur le site des Coussoules à quelques kilomètres au Nord de Leucate, des bassins de décantation offrent de bonnes possibilités d'observation ; un Râle d'eau, une Marouette ponctuée, une Marouette poussin femelle ainsi que des Echasses blanches s'y sont laissés admirer.

Les sansouires proches (terres salées inondables plus ou moins couvertes de salicornes) sont d'excellents sites pour observer les Bergeronnettes, Pipits à gorge rousse (réguliers au passage), Alouettes calandrelles. A noter que la première Bergeronnette citrine trouvée en France l'a été sur ce site en Avril 1987.



A proximité de ces bassins, nous avons vu à plusieurs reprises des Faucons kobez. Les rives de l'étang de Lapalme nous ont permis d'observer : Coucou geai, Alouette calandrelle, Pipit rousseline, une Sterne hansel, et quelques Goélands railleurs. Des limicoles étaient aussi présents, outre le Gravelot à collier interrompu omniprésent dans la région, Chevalier aboyeur, Pluvier argenté, Bécasseaux variables, minutes et cocoris, courlis cendrés. On est surpris de retrouver ici en halte migratoire un Gobe-mouche noir et une Locustelle tachetée dans des milieux bien différents de leurs habitats picards, les Cisticoles des joncs et Bouscarles de Cetti sont par contre ici très présentes. Dans les vignes nous avons observé quelques Perdrix rouges et Bruants ortolans.

La jetée de Port-la-Nouvelle nous a permis de voir dans d'excellentes conditions, à l'occasion de la rentrée des chalutiers, des Puffins de Méditerranée et des Baléares.




Sur la rive Ouest de l'étang de Leucate, les vastes roselières à proximité de Salses offrent encore d'autres possibilités. Nous y avons observé : Flamants roses, Héron pourpré, Aigrette garzette, Crabier, Faucon hobereau, Busard des roseaux, Guifettes noires, 2 Sternes hansel, Echasses blanches, Chevaliers sylvains, Panures et Lusciniolles à moustaches.



Dans l'arrière-pays, les Corbières présentent encore une autre variété de milieux.

Ainsi entre Fitou et Treilles, nous avons fait connaissance avec le Cochevis de Thékla. Le Traquet oreillard et la Pie-grièche à tête rousse sont fréquents dans la région. Vers Feuilla, les superbes Monticoles bleu et de roche étaient au rendez-vous.

Près de Caves, outre les Fauvettes mélanocéphales et orphées locales, sont passés en migration: Bondrées à faible altitude pour cause de tramontane, un Aigle royal immature, un Percnoptère d'Egypte, quelques Milans noirs et royaux, Guépriers et Tourterelles des bois.



Autre bon site pour l'observation de la migration, le Plat de la Gardie domine l'Etang de Leucate: Bondrées, Milans, Guépriers, Cigognes noire et blanche, Circaètes locaux dans le ciel; " au sol ": Pipits rousselines, Fauvettes pitchou, Traquets oreillards et Pie-grièche à tête rousse.

Pour varier les plaisirs, nous avons effectué une visite au site de Pissevache, situé plus au Nord près de Gruissan. Etaient présents sur la lagune: Bécasseaux variables, minutes, sanderling, maubèches et cocoris, Pluviers argentés, Chevaliers aboyeurs, gambettes et arlequins, Tournepierres, Grands Gravelots et Gravelots à collier interrompu, Avocettes, Barges rousses, Sternes naines et pierregarin, Guifettes noires et une Guifette leucoptère, Hérons gardeboeufs, Flamants roses, Mouettes pygmées et Goélands railleurs.

Près de Gruissan, dans la **saline de Mandirac**, nous avons pu admirer une autre Guifette leucoptère, des Hérons gardeboeufs, des Aigrettes garzettes, des Chevaliers aboyeurs et sylvains et les sympathiques Echasses blanches.

Plus à l'intérieur, l'**Étang de Vendres**, constitué d'immenses roselières, est le refuge de nombreuses espèces: Hérons cendrés et pourprés, Butors, Gardeboeufs, Crabiers, Busards des roseaux, Panures à moustaches et Rousserolles turdoïdes. Aux alentours, les Guépriers arrivaient sur leurs sites de nidification.

Près de Fleury, dans la **basse vallée de l'Aude**, la recherche infructueuse de la Pie-grièche à poitrine rose nous a permis de voir malgré tout quelques magnifiques Rolliers et une Pie-grièche écorcheur.



En descendant la côte vers le Sud, l'**Étang de Canet** (où se sont reproduits les Talèves sultanes en 95 et 96), héberge de nombreuses Foulques. Une petite troupe de Flamants roses y était également visible ainsi que des Guifettes noires et moustac, des Sternes naines et caugek, un Héron pourpré. Aux alentours de l'étang, nous avons pu voir un Martinet pâle tandis que 2 Rolliers se tenaient côte à côte sur un fil téléphonique près de St Nazaire.

En continuant le long de la côte rocheuse, nous arrivons dans la région de **Banyuls**. Du sommet de la Tour Madeloc, nous observons un Bruant fou chanteur, 2 Circaètes, une Fauvette mélanocéphale, une Pie-grièche à tête rousse et quelques Bondrées en migration; le Traquet rieur reste invisible, l'espèce est-elle éteinte dans la région ?

A **Port Vendres**, les Martinets noirs et à ventre blanc sont nombreux. Du **Cap Béar**, nous observons dans les rochers: Monticole bleu, Bruant fou et Martinet à ventre blanc. En mer passent quelques Puffins de Méditerranée.

Malgré une bonne "moisson" d'observations, il reste nombre d'espèces que nous aurions pu rencontrer dans la région. Ainsi, d'autres découvertes seront encore possibles lors d'un prochain voyage pour observer entre autres l'Hirondelle rousseline, le Pipit à gorge rousse, le Goéland d'Audouin, les Pie-grièche grise méridionale et à poitrine rose, le Moineau soulcie, le Puffin cendré, les Petit et Grand Ducs, les Bergeronnettes à tête noire et citrine et autres raretés éventuelles...



Bibliographie : Ornithos- Vol 1- n° 1: Observer les oiseaux à Leucate par A. ROUGE
Oiseau Magazine n° 5 : A Leucate, les hirondelles font le printemps
La passion des oiseaux par P.J. DUBOIS et M. DUQUET

Rédaction: Pierre et Marc SENGEZ
Dessins: Marc SENGEZ