

Identification des Grèbes en hiver

Les Grèbes sont sans doute les oiseaux les mieux adaptés à la vie aquatique et ce n'est pas sans raison.

En effet, leurs pattes sont situées très en arrière du corps, ce qui améliore la propulsion dans l'eau. Ils possèdent également des membranes ou palmures de chaque côté des doigts.

Les Grèbes sont très rapides et agiles sous l'eau, condition indispensable pour la pêche. De même, on peut remarquer leur faculté d'immerger plus ou moins leur corps dans l'eau au gré de leurs émotions. Inquiets, ils chassent l'air renfermé dans leur duvet, ne laissant que le cou et une partie du dos émergés, prêts pour la plongée immédiate.

Ils sont par contre très maladroits sur terre et il n'y a qu'à les observer sur leurs nids pour s'en rendre compte.

Ces oiseaux sont facilement observables dans notre région et nous allons tâcher, ici, de détailler les traits caractéristiques de leur plumage hivernal.


LE GREBE HUPPE (*Podiceps cristatus*)

L'ordre des Podicipédiformes ne comprend qu'une seule famille en Europe : celle des Grèbes.

"*Podiceps*" vient du latin "*podis*" = croupion et "*pes*" = pied, les deux termes accolés signifient que les pattes sont situées très en arrière du corps.

Le nom latin "*cristatus*" signifie : qui a une crête, une aigrette ou une huppe.

Commun dans notre région, il fréquente les étangs toute l'année. Il est plus abondant en hiver, car les populations d'Europe du Nord viennent hiverner dans notre région.



C'est le plus grand des Grèbes visibles chez nous :

Longueur : 46-51 cm

Envergure : 85-90 cm

Poids : 650-1400 g

Périodes de mues

Adulte	J	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D
Jeune	J	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D

- Sa huppe disparaît en hiver, le cou est long et fin, le bec rose et assez long. La calotte est sombre, les joues blanches.
- Un trait sombre relie l'œil au bec, surmonté par un espace blanc sous la calotte, ce dernier critère n'existe pas chez le Grèbe jougris.
- Le dessous du corps, quand il est visible, est très clair.
- Le Grèbe huppé juvénile garde quelques traces de raies sur la tête.
- L'identification du Grèbe huppé en hiver ne présente pas de difficultés majeures.

LE GREBE JOUGRIS

(*Podiceps grisegena*)

Le nom latin "*grisegena*" vient de "*gena*" = la joue et "*griseis*" = gris.

Il est observé le plus souvent en période hivernale d'Octobre à Mars, avec un maximum en Décembre. Néanmoins, quelques cas d'estivage ont pu se produire, principalement à Verneuil en Halatte.


Son aire de nidification se situe en Europe du nord-est; en hivernage, il est plus abondant sur les côtes qu'à l'intérieur des terres.

Plus petit et plus ramassé que le Grèbe huppé avec un cou plus court et plus épais, sa silhouette permet aisément de le différencier de l'espèce précédente.

Longueur : 40-50 cm

Envergure : 75-85 cm

Poids: 480-920g



Périodes de mues

Adulte	J	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D
Jeune	J	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D

- Le dos est gris noirâtre, les flancs tachetés de gris. Le cou assez court et épais est gris-brun contrastant avec la gorge et le menton blancs.
- La calotte noire atteint l'œil et s'estompe progressivement vers les joues plus claires. Le bec en forme de dague est gris foncé avec une tâche jaune plus ou moins étendue à la base.
- Le principal risque de confusion possible reste avec le Grèbe huppé. Les différences sont toutefois assez nettes : chez le Grèbe huppé, la silhouette avec un cou fin, le bec long et rose, l'espace blanc entre l'œil, la calotte et la racine du bec sont de bons critères distinctifs.
- Le Grèbe jougris juvénile/1^{er} hiver garde lui quelques traces de roux sur le cou, et les raies sombres en travers des joues s'estompent progressivement au cours de l'automne.

Juv le 5/10/97 à Moru



Juv le 28/10/97 à Moru



LE GREBE ESCLAVON

(*Podiceps auritus*)

Le nom latin "*auritus*" signifie: qui a de longues oreilles, il évoque la bande dorée derrière l'œil qui se termine en pinceau et qu'arborent les adultes en été. " Esclavon " est un terme employé par Buffon. Il se rapporte à la Slavonie ou Esclavonie. Cette ancienne dénomination désigne deux régions, l'une en Austro-Hongrie, l'autre un ancien royaume d'Europe du nord (région de Lübeck). Cette dernière région borde la mer Baltique et est un des lieux de reproduction du Grèbe esclavon.

Nicheur dans les régions boréales d'Europe du nord, il hiverné régulièrement en France le long des côtes de la Manche et de l'Atlantique.

Il apparaît sporadiquement à l'intérieur des terres dans la moitié nord de la France, notamment dans l'Oise de Novembre à Mars, avec un maximum en Mars.

C'est un petit Grèbe de taille intermédiaire entre le Grèbe huppé et le Grèbe castagneux :


Longueur : 31-38 cm

Envergure : 59-65 cm

Poids : 300-470 g

Périodes de mues


Adulte	J	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D
Jeune	J	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D



- En plumage d'hiver, le Grèbe esclavon est nettement noir et blanc, le dos est presque plat, le front plutôt bas, le cou assez épais, l'arrière-train n'est pas ébouriffé comme chez les Grèbes castagneux et à cou noir.
- La calotte sombre atteint l'œil sans l'englober et contraste fortement avec le blanc des joues. Le bec est droit, foncé avec la pointe pâle. Une tâche pâle entre l'œil et le bec (lores) est fréquente.
- La couleur du plumage, noir et blanc, permet d'écarter facilement lorsque l'éclairage est bon, une confusion avec le Grèbe castagneux, aux formes par ailleurs différentes.
- L'angle du bec et du front est un critère pratique afin d'écarter un Grèbe à cou noir: chez ce dernier le front forme un angle presque droit avec le bec, alors que chez le Grèbe esclavon le bec et le front se prolongent avec un angle assez faible.
- Chez les individus de 1^{er} hiver, les joues peuvent être marquées de taches grises diminuant ainsi le contraste avec la calotte noire.

LE GREBE A COU NOIR (*Podiceps nigricollis*)

Le nom latin "*nigricollis*" signifie: à cou noir et évoque donc le plumage d'été



Longueur : 28-34 cm
Envergure : 56-60 cm
Poids : 230-450 g

Périodes de mues

Adulte	J	F	M	A	M	J		A	S	O	N	D
Jeune	J	F	M	A	M	J		A	S	O	N	D

Le Grèbe à cou noir se reproduit principalement dans le centre de la France, de la Sologne aux Dombes, plus rarement dans le nord-est.

Sa nidification est souvent conditionnée par l'existence de colonies de Laridés, avec lesquels il s'associe presque toujours. On note également une certaine expansion avec des cas de nidification en Lorraine, dans le Nord-Pas de Calais.

Ce sont les oiseaux d'Europe du nord qui viennent hiverner dans notre pays, essentiellement le long des côtes, mais aussi à l'intérieur dans la partie nord de la France. Les effectifs sont plus importants lors des hivers rigoureux.

Un peu plus petit que le Grèbe esclavon, ses formes se rapprochent du Grèbe castagneux.

- Le dos est arrondi, l'arrière-train souvent ébouriffé. Le cou assez épais est blanc grisâtre. La calotte noire s'étend jusqu'en-dessous de l'œil et s'estompe sur les joues, sa limite n'est donc pas aussi nette que chez le Grèbe esclavon.
- Le front est nettement bombé, des tâches blanches sur les lores peuvent exister, elles sont alors très petites et beaucoup moins visibles que chez le Grèbe esclavon.
- Le bec mince est entièrement noir, légèrement retroussé, accentuant l'impression d'un angle presque droit avec le front.

LE GREBE CASTAGNEUX

(*Tachybaptus ruficollis*)

Le nom latin "*ruficollis*" vient de "*rufus*" = roux et de "*collum*" = cou.

Le terme "castagneux" est un dérivé de châtain qui évoque la couleur des joues et de la gorge en été.

Le Grèbe castagneux est répandu partout en France, se contentant de petits plans d'eau où son chant typique signale sa présence. Sédentaire, il est visible chez nous toute l'année.



C'est le plus petit de nos Grèbes :

Longueur : 25-29 cm

Envergure : 40-45 cm

Poids : 120-320 g

Périodes de mues

Adulte	J	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D
Jeune	J	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D

- Sa forme ronde, compacte est caractéristique. Le cou court, le dos rond et l'arrière-train ébouriffé dessinent une silhouette typique.
- En plumage d'hiver, la teinte des joues, du cou et des parties inférieures est beige, chamois-crème. Les parties supérieures sont brunes, la gorge et les sous-caudales blanchâtres. L'ensemble ne présente jamais de contraste noir et blanc aussi marqué que chez les Grèbes à cou noir ou esclavon.
- Le bec est épais, très différent du bec fin du Grèbe à cou noir.

Nous citerons pour mémoire le **Grèbe à bec bigarré** "*Podilymbus podiceps*" originaire d'Amérique du Nord dont l'apparition en France reste occasionnelle : il n'est mentionné que trois fois en France sur les côtes et la probabilité de son observation dans l'Oise est minime !

L'observation des Grèbes en hiver demande donc un minimum de rigueur pour bien identifier certaines espèces proches. La silhouette et la forme de l'oiseau permettent souvent à elles seules une détermination fiable. Bien avoir "dans l'œil" le gabarit des Grèbes huppés et castagneux permet de repérer plus facilement les individus d'espèces moins communes.

Bibliographie :

Guides : L.JONSSON, H.HEINZEL, R.PETERSON, B.BRUUN

Ouvrages : Identifier les oiseaux par A.HARRIS

L'Etymologie des noms d'oiseaux par P.CABARD,

La Faune de France par Marc DUQUET, Muséum National d'Histoire Naturelle

Les Palmipèdes par Paul GEROUDET

Reconnaître les plumes, les traces et les indices des oiseaux par R. BROWN, J. FERGUSON

Dessins : Marc SENGEZ

Rédaction : Pierre et Marc SENGEZ

Remerciements :

Nous tenons à remercier chaleureusement Franck SPINELLI qui a bien voulu relire ce texte.