SYNTHESE DES OBSERVATIONS 1981 DANS LA SOMME

INTRODUCTION

Voici enfin cette synthèse des observations ornithologiques réalisées dans la Somme en 1981. Nous sommes en retard mais bien décidés à le rattrapper. Nous espèrons faire paraître la synthèse 1982 dès cette fin d'année 1984 et la suivante peu après.

Pour revenir à la présente, notons qu'elle s'est épaissie ; ceci étant dû à ce qu'aux données accumulées par la Centrale Ornithologique G.E.P.O.P. sont venues s'ajouter les nombreuses observations d'ornithologues non-membres de ce groupe. La prochaine synthèse sera d'ailleurs publiée sous l'égide de la Centrale Ornithologique Picarde créée en décembre 1982. L'augmentation du nombre des observateurs permet notamment d'obtenir une meilleure couverture géographique.

Parmi les faits ornithologiques remarquables pour cette année, notons :

- les observations d'un Puffin fuligineux et d'une Grande Aigrette ;
- la fréquence inhabituelle de la Cigogne noire en août et septembre ;
- l'installation de quelques couples de Busards cendrés ;
- 4 données hivernales de Marouette ponctuée ;
- 2 mentions de Pluvier guignard ;
- une observation de Petit Chevalier à pattes jaunes ;
- le nombre de plus en plus important de Goélands leucophées sur le littoral ;
- 3 données de Goéland bourgmestre et une des Mouettes mélanocéphale et de Sabine ;
- les observations des Pipits rousseline et à gorge rousse.

X. Commecy, T. Rigaux et F. Sueur

ABREVIATIONS

BdA : baie d'Authie.
BdS : baie de Somme.
HA : Hâble d'Ault.
MdBM : marais du Bout du Monde à Amiens.
POM : Parc Ornithologique du Marquenterre.

OBSERVATEURS

G. Balança (GOP), F. et G. Baudry, G. et J. Bellard, M. Bellart, J.M. Beron, P. Biet, D. de Boer, A. Brosset, P. Caruette, AM. et X. Commecy, B. Couvreur, P. Croisy, M.A. Czajkowski, J.P. Daussy, C. Delahoche, E. Delvoye, D. Dequiedt, C. Deveriendt, C. et R. Devisse, F. Dordain, A. et G. Duhamel, H. Dupuich, A. Dupuis, M. Duquef, P. Etienne, C. Fadat, J.P. Ferré, G. Flohart, D. Fosse, L. et P. Gavory, J.M. Gernet, P. Grangé, O. Hernandez, C. Hovette, G. et M. Hullé, M. Jeanson, C. Lallier, O. Manneville, T. Marce, M. Melius, J., M. et V. Mennecart, E. Mercier, C. Mesnard, C. et Ch. Miette, M. Montadert, B., E. et F. Montel, F. Montelet, D. Mouillon, G. Neveu, P. Noël, J. Poidevin, P. Raevel, E. et N. Ranson, T. Rigaux, J.C. Robert, P. Royer, J.P. Siblet (GOP), F., M. et P. Sueur, P. et Ph. Thiery, P. de Thieulloy, D. Toulon, P. Triplet, A.M. van Ulsen, I. Veriere, R. Veroy et J.L. Vigneux.


CLIMATOLOGIE 1981

tirée du "Bulletin Climatologique de la Somme" Association Météorologique de la Somme, année 1981, n° 176.

L'année 1981 est une année banale qui n'est caractérisée ni par de grandes chaleurs ni par de grands froids (si ce n'est fin décembre) mais qui a tout de même été très pluvieuse (seuls les mois de février, avril, août et septembre étant déficitaires en précipitations par rapport à la moyenne).

L'hiver et le début du printemps sont doux (sauf février qui est assez froid mais sans excès). D'avril à août, temps frais avec des températures légérement inférieures à la moyenne. De plus, quelques gelées tardives sont notées (24 avril - 3 mai). Septembre à novembre sont doux, décembre étant assez froid. 1981 est l'année la moins ensoleillée depuis 27 ans. Janvier, mars et octobre sont marqués par de grandes périodes de vents forts. La tempête la plus forte est notée le 14 décembre (115 km/h).

Ces quelques informations météorologiques ont pour but de tenter d'expliquer quelques comportements des oiseaux au cours de cette année : dates des passages, retards ou avances dans la nidification...



PLONGEON ARCTIQUE Gavia arctica
En janvier, plusieurs données d'oiseaux mazoutés sur le littoral : 2 morts et 1 recueilli (il mourra quelques jours plus tard).
2 observés : 1 le 25 au HA, 1 le 14 en BdA.
Mais aussi 2 le 2 en mer et 3 le 20.
Encore un mazouté du 9 au 25 février au POM. 3 à Fort-Mahon le 1er (H. DUPUICH, A. DUPUIS et E. MERCIER) et 1 les 17 et 23 en RBdS (T. RIGAUX et P. TRIPLET).
Avril : 1 blessé en RBdS le 6 (O. MANNEVILLE), 1 le 12 à Ault (A.P.O.), 1 en plumage nuptial en migration le 22 à Fort-Mahon (P. RAEVEL).
1 le 8 octobre au POM (D. FOSSE).
Décembre : 1 les 20, 27 et 28 au HA et 1 le 20 à Cayeux-sur-Mer.

PLONGEON CATMARIN Gavia stellata
Nombreux morts mazoutés en début d'année : 11 du 1er janvier au 15 février.
Janvier : minimum de 80 entre Ault et le Bois de Cise le 21 (X. COMMECY), 30 le 24 à Cayeux-sur-Mer/Woignarue.
HA : 1 le 4, 7 le 12, 11 le 20, 3 le 25.
2 le 1er à Hautebut.
Le 8, 25 Plongeons (probablement à majorité G. stellata) à Quend-Plage ; encore 10 le 25.
Février : le 1er, 3 en BdA, 7 à Cayeux-sur-Mer + 53 en mouvement vers le sud de 8 h 30 à 8 h 45 (G.E.P.O.P.).
HA : 1 les 1er, 9 et 26.
POM : 1 du 4 au 19, 3 le 23 et 2 le 25.
Le 15, 5 à Cayeux-sur-Mer et 2 en BdA.
2 le 25 à Quend-Plage, min. 34 le 26 en BdS sud.
Mars : 2 le 14 au HA, 1 les 20, 26 et 31 dans cette même localité.
Entre Noyelles-sur-Mer et Saint-Valery-sur-Somme (étangs de la commune de Boismont) , 1 du 14 mars au 5 avril (il est mazouté).
Toujours en mars à Quend-Plage : 1 les 22 et 30 (3 Gavia sp. le 23, 6 le 30, 2 le 31).
Avril : 1 le 5 à Quend-Plage, 19 (Gavia sp.) en migration le 22 en 3 heures (P. RAEVEL).
Mai : 3 le 3 à Quend-Plage.
Retour en octobre : du 27 au 30; 2, 1 et 1 sont observés en migration vers le sud en BdS.
Novembre : le 9, 85 de Cayeux-sur-Mer à Woignarue.
Le 14, 10 à Cayeux-sur-Mer.
Le 23, 181 de Cayeux-sur-Mer à Ault (F. SUEUR et P. TRIPLET) ; 1 à Quend-Plage.
Décembre, HA : 1 les 7 et 15, 3 le 19, 2 les 21, 22, 27 et 30.
3 en migration vers le sud le 23 et 1 le 31 à Quend-Plage.

GREBE HUPPE Podiceps cristatus
Migrations et hivernage sur le littoral
Janvier : peu sont observés mais 50 (dont au moins 44 mazoutés) sont trouvés morts du 1er janvier au 15 février.
En janvier, max. 3 au HA, 1 au POM et 30 le 8 en BdS nord.
Février : très net passage dans la deuxième moitié du mois.
BdS nord : 40 le 1er, 370 le 15, 50 le 25.
BdS sud : 49 le 1er, 30 le 15.
HA : max. 2.

BdA : 30 le 1er, 4 le 15.
Mars, HA : max. 12.
Avril : max. 10 au HA, 15 le 6 en BdS nord et 10 le 12 en BdS sud.
Mai : 6 (nicheurs locaux) au HA, 5 le 2 (derniers observés en mer) en BdS nord.
De fin juin à fin août, 1 au POM où l'espèce ne niche pas.
Août : 1 le 10 et 6 le 13 en BdS nord, 1 le 12 en BdA, 3 le 22 au POM.
Septembre : max. 7 au HA, 2 le 4 au POM, 1 le 6 en BdS nord et 2 le 5 en BdS sud.
Octobre : max. 3 au HA.
Novembre : fort passage remarqué.
15 le 8 en BdS nord, 261 le 14 et 341 le 23 en BdS sud, max. 2 au HA.
Décembre : max. 5 au HA, 1 au POM, 11 le 5 en BdS nord, 23 le 27 en BdS sud et 7 le 30 au Crotoy.

Migrations et hivernage à l'intérieur des terres

Janvier : 7 le 28 à Cléry-sur-Somme.
Février : 16 le 19 dans la HVS, 11 le 13 à Long-le-Catelet, 2 le 11 à Boves.
Mars : 59 le 15 dans la HVS, 3 le 15 et 10 le 28 à Camon.
Avril à juillet : nicheurs.
Août : pas d'observations.
Septembre : 82 le 28 dans la HVS, 4 le 14 à Boves, 4 le 29 à Bray-sur-Somme.
Octobre : 30 le 14 dans la HVS.
Novembre : 15 le 12 dans la HVS.
Décembre : 5 le 2 et 4 le 27 dans la HVS.

Nidification

Nous indiquons pour chaque localité, de l'amont vers l'aval pour la vallée de la Somme, le nombre de couples.
Nicheurs certains (N) : nid, transport de matériaux ou de nourriture, pulli observés.
Nicheurs probables (NP) : plus d'un contact sur le site avec au moins 2 oiseaux observés.
Nicheurs possibles (Np) : 1 contact entre février et juin.
Un astérique (*) indique qu'il n'y a eu qu'une visite sur le site.

Nidification dans la vallée de la Somme

Saint-Christ-Briost	: 1 NP, 1 Np
Brie-sur-Somme	: 2 N, 2 NP
Flamicourt	: 1 N, 2 NP
Péronne	: 3 N
Sainte-Radegonde	: 13 N, 3-4 NP
Halles	: 1 Np
Biaches	: 2 N
Cléry-sur-Somme	: 4 N, 6 NP
Feuillères	: 1 NP
Curlu	: 2 N
Vaux-sur-Somme *	: 1 Np
Frise	: 1 NP
Cappy *	: 1 Np
Bray-sur-Somme	: 3 N, 2 NP
Camon	: 2 N, 1 NP
Amiens	: 2 N



Longpré-les-Amiens	: 1 NP
Argoeuves	: 1 NP
Saint-Sauveur	: 2 N
Belloy-sur-Somme	: 1 Np
Bourdon/Flixecourt	: 5 N
Condé-Folie/L'Etoile	: 13 Np (*)
Long-le-Catelet	: 2 N, 2 Np
Fontaine-sur-Somme *	: 3 N, 13-16 Np
Vieulaines	: 1 N
Longpré-les-Corps-Saints *	: 2 N, 2 Np
Erondelle *	: 1 Np
Bray-les-Mareuil	: 1 Np
Nidification dans les autres vallées	
Longueau	: 2 N, 1 NP
Boves	: 4 N, 1 NP
Gamaches *	: 2 Np
Hailles	: 1 N
Rue	: 1 N, 1 Np
HA	: 4 N, 1 NP



Pour corps cristaux
13 .

Conclusion sur la nidification
Soit 62 couples nicheurs certains, 24 ou 25 nicheurs probables, 41 à 44 nicheurs possibles.
Soit 127 à 131 couples pour la Somme en 1981 (96 à 99 avaient été remarqués en 1980) dans 34 localités (26 localités en 1980).
Sur les 18 localités recensées en 80 et 81, il y avait eu 84 couples recensés en 1980 et 73 en 1981.
Sur 59 couples où le nombre de poussins ou de juvéniles a pu être relevé, on note : 17 couples/1 jeune, 18 couples/2 jeunes, 15 couples/3 jeunes et 9 couples/4 jeunes soit 134 pulli ou juvéniles donc une moyenne de 2,27 jeunes/couple (2,22 en 1980).

GREBE JOUGRIS Podiceps griseigena
Plusieurs trouvés morts ou agonisants sur le littoral en janvier : 1 le 6, 4 le 10, 6 le 18, 1 le 23 et encore 1 les 1er et 23 février (mazout).
Observations : 2 les 20 et 21 janvier au HA, 4 le 22, 3 les 23 et 25 ; 2 le 1er février en BdA, 1 le 15 à Ault (Bois de Cise) et 2 le 25.
1 le 23 novembre à Woignarue.
Décembre : 1 les 15, 19 et 22 au HA ; 2 le 27 en RBdS.

GREBE A COU NOIR Podiceps nigricollis
1 le 24 janvier au HA (O. HERNANDEZ et P. ROYER).
Passage de printemps remarqué de fin mars à mi-avril : 1 ad. le 25 mars en plumage nuptial à Estrées-Mons (H. DUPUICH), 2 le 30 à Quend-Plage (+ 2 cou noir/esclavon - G. FLOHART), 2 en plumage nuptial au POM le 4 avril et 1 du 5 au 14 (9 observateurs) ; et se poursuivant en mai : 1 en plumage nuptial à Roye le 11 (X. COMMECY) et 1 au HA le 24 (C. et R. DEVISSE).
Dispersion postnuptiale : 1 ad. en plumage nuptial le 29 juillet au HA (P. TRIPLET) et 1 le 30 octobre au même endroit (T. RIGAUX et O. HERNANDEZ).
Le 19 décembre suite au coup de froid, 5 cou noir/esclavons à Ault.

GREBE ESCLAVON Podiceps auritus
Le 22 avril, 2 en plumage nuptial en migration vers le nord à Quend-Plage (P. RAEVEL).
1 en plumage nuptial le 27 mai au HA (J.P. DAUSSY, B. et F. MONTEL).
1 au HA les 20 et 21 décembre (5 observateurs).

GREBE CASTAGNEUX Podiceps ruficollis
Nidification certaine
Abbeville : 1 couple/1 grand juv. le 9 septembre.
Bergicourt : 21 ad., 2 juv., 2 grands pulli, 2 pulli, 1 nid/3 pulli d'environ 2 jours le 19 juillet.
Le Crotoy : 1 couple/2 pulli le 2 juillet.
Froise (Quend) : 1 couple/1 nid et 1 couple/juv. le 7 juin.
Famechon : 1 nid le 29 mai, éclosion de 4 pulli le 6 juin.
HA : 1 couple/2 juv. le 21 juin,
1 couple/1 pullus et 1 couple/2 pulli le 20 juillet,
1 couple/1 juv. le 14 août.
Longpré-les-Amiens : 1 couple/1 pullus le 12 mai, 1 couple/2 juv. (2ème couvée) le 10 septembre.
POM : 1 couple/4 pulli le 10 mai,
1 couple/1 juv. et 1 couple/3 pulli le 24 juin.
Rue : 3 pulli de moins de 10 jours le 27 août.
Nidification probable ou possible
Boismont : 1 chanteur de fin mars à début mai.
Boves : 1 chanteur le 12 avril, espèce observée en mai.
Long-le-Catelet (Le Catelet) : 1 chanteur le 10 mai.
Cléry-sur-Somme : 1 chanteur le 12 mai.
Rue/Favières : 6 couples le 16 juin.
Observé aussi en
Janvier : 1 le 6 à Abbeville, 7 le 24 à Bergicourt, 2 le 28 à Cléry-sur-Somme, 10 le 31 au Hamel, 1 les 25 et 31 à Tilloy-les-Conty, 2 le 11 à Velennes et 9 le 19 au Crotoy ;
Février : 2 du 10 à la fin du mois à Amiens (La Hotoie) et 3 les 1er et 18 (MBdM), 5 le 26 à Bergicourt, 3 le 19 à Cléry-sur-Somme, 4 le 19 à Eclusier-Vaux, 16 le 26 à Famechon, 10 le 8 à Fréchemont, 2 le 19 à Frise, 1 le 1er et 2 le 15 à Saint-Valery-sur-Somme, 2 le 7 à Tilloy-les-Conty ;
Mars : 2 du 1er au 9 à Amiens (La Hotoie), 5 le 27 à Boves, 9 le 3 ainsi que 4 les 17 et 20 à Bergicourt, 2 le 9 à Contre, 1 les 11, 15 et 25 à Cléry-sur-Somme, 1 le 5 à Fossemanant, 1 le 15 à Tilloy-les-Conty, Saint-Valery-sur-Somme (4 le 15, 8 le 20, 3 le 26 et 1 le 29) ;
Avril : 2 les 22 et 30 à Longpré-les-Amiens, 1 le 19 à Velennes, 4 le 14 à Port-le-Grand, Saint-Valery-sur-Somme (6 le 9, 8 le 12 et 3 le 25) ;
Mai : 4 le 1er et 5 le 5 à Bergicourt, 2 le 29 à Estrèes-Mons, 4 le 1er à Famechon, 5 le 4 au marais de Rue et 2 le 2 à Saint-Valery-sur-Somme ;
Juin : 3 le 1er et 1 le 10 à Estrèes-Mons ;
Juillet : 9 le 27 à Estrèes-Mons, 6 le 26 à Rue, Saint-Valery-sur-Somme (2 les 6 et 17, 1 le 29).
Septembre : 4 le 14 à Amiens (MdBdM), 4 le 28 à Cléry-sur-Somme, 2 le 28 à Frise, 3 le 5 au Crotoy et 8 le 30 à Abbeville ;
Octobre : 5 le 18 à Amiens (MBdM), 10 le 14 à Brie, 3 le 14 à

Grèbe castagneux Podiceps ruficollis

Chiffres relevés en dehors de la période de nidification (mai à juillet) dans les lieux régulièrement suivis. Maximum par décade (pulli exclus).

	J	F	M	A	A	S	O	N	D
POM	03.01.04	06.03.04	03.05.05	04.06.03	03.03.05	08.11.12	15.19.23	22.20.22	17.17.04
HA	.03.	01.02.01	01.04.04	10.21.02	.07.	10.03.03	.08	05.06.	10.02.04
Rue					02.17.24	.32.			.02.
EM		.01.	.20.			.36.	.13.	.06.	.01.
P + SR		.02.				.12.	.05.	.31.	.27.
SCB			.02.			.16.	.33.	.19.	.37.
A	03. .05	08.05.	04.04.	01.	01.	02.05.08	14.12.07	03.04.02	07.04.05

EM : Estrèes-Mons
P : Péronne
SR : Sainte-Radegonde
SCB : Saint-Christ-Briost
A : Abbeville



Cléry-sur-Somme, 12 le 20 au Hamel et 1 le 30 à Saint-Valery-sur-Somme ;
Novembre : 4 le 3 à Abbeville, 8 le 27 à Boves, 3 le 12 à Cléry-sur-Somme, Le Crotoy (17 le 6, 27 le 19, 34 le 30), Saint-Valery-sur-Somme (3 le 9, 2 le 14, 3 le 27) ;
Décembre : 5 le 16 à Abbeville, 2 les 23 et 24 à Amiens, 9 le 2 et 10 le 27, 10 le 2 et 6 le 27 à Cléry-sur-Somme, 1 le 11 à Saint-Valery-sur-Somme, 3 le 27 à Noyelles-sur-Mer.

FULMAR Fulmarus glacialis
6 morts le 18 janvier, 2 le 1er février et 1 le 20 décembre sur le littoral (mazoutage).
Observé régulièrement aux falaises du sud du littoral picard : Ault (y compris le Bois de Cise), 2 le 21 janvier, 10 le 9 février, 1 le 20 mars, 10 le 12 avril, 7 cantonnements le 10 mai, 1 individu le 5 septembre.
Migrations, avril : 3 en 3 heures à Quend-Plage et 1 le 25 à Cayeux-sur-Mer ;
août : 1 le 13 à Quend-Plage.

PUFFIN FULIGINEUX Puffinus griseus
2 le 31 août en RBdS (T. RIGAUX).

PUFFIN DES ANGLAIS Puffinus puffinus
1 le 14 novembre à Cayeux-sur-Mer (P. ETIENNE, P. TRIPLET et I. VERIERE).

FOU DE BASSAN Sula bassana
Hivernage surtout montré par la découverte d'oiseaux morts, le plus souvent mazoutés : 7 le 10 janvier, 4 le 18, 1 le 2 février, 1 le 27, mais aussi par quelques observations : 5 en BdA le 1er février, 4 ad. et 3 im. à Cayeux-sur-Mer.
Migration de printemps : 12 le 30 mars à Quend-Plage et 16 le 31, 1 le 12 avril à Ault, 3 ad. 1 subad. 1 im. en migration vers le nord à Quend-Plage en 3 heures le 21.
Estivage toujours net : 1 ad. le 20 juin, 1 ad. 1 im. de 2ème année le 21, 3 le 22 juillet et 1 les 19 juillet (mort), 23, 25, 27 et 28 à Quend-Plage et encore 1 les 1er et 24 août.
Septembre : 1 im. le 6 à Quend-Plage.
Migration d'automne : 1 ad. trouvé affaibli en forêt de Crécy le 11 octobre (D. MOUILLON et F. SUEUR), 2 à Quend-Plage le 6 novembre et 5 en RBdS le 15, 2 ad. en migration vers le sud-ouest à Woignarue le 23.
Hivernage : 1 mort le 20 décembre.

GRAND CORMORAN Phalacrocorax carbo
Sur le littoral, maxima mensuels des individus stationnant.
BdA : 1 le 18 janvier, 1 le 1er février, 5 le 15 mars, 8 le 9 avril, 2 le 23 août.
BdS nord : 9 en janvier, 2 en février, 6 en mars, 18 le 17 avril, 1 en mai, 13 en juillet, 70 le 19 août, 33 en septembre, 6 en octobre, 16 en novembre et 19 en décembre.
BdS sud : 1 en janvier et en février, 10 en mars, 29 le 5 avril, 7 en mai, 6 en juin, 7 en juillet, 21 le 14 août, 4 en septembre, 10 en octobre, 2 en novembre.

Mis à part 1 à Quend-Plage le 31 mai, les observations de mai, juin et début juillet n'ont été réalisées qu'au HA mais il n'y a apparemment pas eu de reproduction. Le retour des migrateurs est observé le 29 juillet (13 à Quend-Plage). Notons le fort passage de la 2ème quinzaine d'août : 6 le 3, 41 le 13, 61 le 18, 70 le 19, 34 le 24 en BdS nord.
Des passages de migrateurs sont observés en
mars : 3 le 6 et 23 le 27 au POM,
avril : 35 le 6 à Ault, 28 à Quend-Plage le 22 en 3 heures, 2 ad. 8 im. au HA le 28,
mai : 8 le 8 en RBdS, 1 le 10 à Ault,
août : 2 le 21 à Fort-Mahon,
décembre : 15 le 5 en RBdS.
1 individu était marqué avec des bagues de couleur le 25 avril 1981 au HA : il avait été marqué poussin le 15 juin 1980 à Fyn au Danemark (X. COMMECY, information C.R.B.P.O.).
A l'intérieur des terres, traces des passages migratoires : 4 le 7 mars et 5 le 9 à Cléry-sur-Somme, 1 le 26 avril à Boves, 1 im. le 6 mai à Cléry-sur-Somme et 2 autres le 10 à Fontaine-sur-Somme, 2 le 28 septembre à Cléry-sur-Somme.
Abbeville : 2 en migration vers le nord-est le 12 avril, 18 en migration vers le sud-ouest le 14 septembre.

HERON CENDRE Ardea cinerea

Nidification

Boismont : construction de nids encore notée le 26 mars, 84 nids sont recensés le 30 ; la colonie s'est divisée en deux, 1 de 70 couples (l'ancienne colonie) et 1 de 14 (la nouvelle) dans un bois à environ 50 m de la première ; ce jour-là, des oeufs éclos sont trouvés au pied des nids.
Cléry-sur-Somme : 6 nids le 15 mars, 8 le 25.
Péronne (Sainte-Radegonde) : rechargement des nids le 19 février, 9 nids le 15 mars, 11 le 27 avril.
POM : construction d'un 2ème nid le 16 mars, 3 nids terminés le 31, un 4ème est commencé le 5 avril.
Fréchencourt : renseignements peu précis sur une petite colonie (3-4 couples ?), 1 nid occupée de façon certaine en mars.


Migrations

6 le 18 juillet à Corbie, 5 le 28 à Saint-Quentin-en-Tourmont (Le Bout des Crocs), 6 le 29 août à Quend (+ passages nocturnes), 6 le 30 au Crotoy, 32 le 2 septembre en RBdS, passages nocturnes le 3 à Amiens.

Lieux régulièrement prospectés

POM (maximum par décade) et autres localités (maximum mensuel).

POM, janvier : 15.13.18
février : 13.07.02
mars : 07.08.07
avril : 08.22.
mai : 01.15.07
juin : nicheurs
juillet : 29.24.30
août : 36.53.48
septembre : 78.57.33



Octobre : 12.16.16
Novembre : 23.16.07
Décembre : 15.18.09

Famechon : observé en janvier et février, 7 le 28 août, 6 le 11 octobre.

Airaines : 15 le 15 janvier, 12 le 15 février, 6 le 8 mars, 3 le 28 juin (première observation du mois : 1 le 27), 2 le 4 octobre, 1 le 1er novembre.

HVS : 2 en janvier, 20 en février, 60 le 11 mars, seuls les nicheurs sont présents ensuite, 9 en septembre, 9 en septembre, 10 en octobre, 9 en novembre, 12 en décembre.


Tilloy-les-Conty : 9 le 18 janvier, 12 le 21 février, 1 le 11 mars, 1 le 1er avril.

Abbeville/Drucat : 13 les 8 et 16 janvier, 12 le 13 février, 1 le 4 mars, 1 le 17 juillet, 2 le 21, 2 le 7 août, 9 le 1er septembre, 6 les 8 et 14 octobre, 8 le 20 novembre, 14 le 16 décembre.

Boves/Fouencamps : 18 en janvier, 6 en mars, 2 en avril, 13 le 25 juillet, 15 le 3 août, 20 le 7, 4 en septembre.

Les migrations et dispersions juvéniles sont aussi notables si on relève chaque mois le nombre de localités où des Hérons cendrés ont été observés ;

janvier	: 15
février	: 11
mars	: 13
avril	: 11
mai	: 7
juin	: 8
juillet	: 12
août	: 16
septembre	: 9
octobre	: 7
novembre	: 8
décembre	: 9



A noter, 1 tué par plomb à Abbeville/Drucat le 30 septembre (oiseau de 1ère année) et 1 autre le 23 février dans la réserve de la baie de Somme. Confondus avec des Perdrix...??

HERON POURPRE Ardea purpurea
1 le 24 mai au HA (C. et R. DEVISSE).
1 du 30 août au 21 septembre à Fouencamps (G. NEVEU, D. MASSON, T. RIGAUX et P. ROYER).
1 le 12 septembre à Noyelles-sur-Mer (P. TRIPLET).

GRANDE AIGRETTE Casmerodius albus
1 le 10 novembre au POM (M. MENNECART).

AIGRETTE GARZETTE Egretta garzetta
RBdS/POM (maximum par décade)

janvier	: 01.01.01
février	: 01.01.01
mars	: 01.01.02
avril	: 02.02.02

mai : 03.03.02
juin : 03.02.03
juillet : 01.03.04
août : 05.06.05
septembre : 04.05.09
octobre : 03.02.02
novembre : 02.01.02
décembre : 01.01.01

1 le 31 mai entre Noyelles-sur-Mer et Saint-Valery-sur-Somme. Construction d'un nid le 11 mai au POM mais apparemment pas de jeunes à l'envol cette année (F. SUEUR).
1 nid dans la héronnière de Boismont le 18 avril (J.C. ROBERT), l'Aigrette garzette a déjà été observée en ce lieu (N. RANSON).

HERON BIHOREAU Nycticorax nycticorax
Uniquement observé au POM cette année : 1 ad. les 17 et 18 avril, 2 du 20 au 29, 1 ad. le 19 mai, 1 ad. 1 im. les 6 et 7 juin, 1 subad. le 15, 1 ad. le 21, 2 im. le 9 juillet, 1 juv. fin juillet, 1 im. le 28 septembre.

BLONGIOS NAIN Ixobrychus minutus
Secteur de Boves/Fouencamps : premiers (2) le 12 mai, minimum de 4 cantons en mai-juin, maximum de 4 ad. ensemble le 24 juin au marais communal.
1 le 17 août à Abbeville.

GRAND BUTOR Botaurus stellaris
Hivernage : 1 le 15 janvier à Famechon, 1 le 26 février au HA. Cantonnements notés au printemps à Amiens (MBdM), Abbeville (1 le 8 mai), Boves (minimum 2 endroits différents), Fouencamps (maximum de 3 le 5 mai, 1 trouvé mort le 6 avril), La Chaussée-Tirancourt (2 chanteurs), Noyelles-sur-Mer, Rue.
Peut-être des traces d'un passage discret avec 2 observations sur le littoral en décembre : 1 les 19 et 21 au HA, 1 du 19 au 30 à Saint-Quentin-en-Tourmont en bordure de la RBdS.

CIGOGNE BLANCHE Ciconia ciconia
Le 4 mars, 2 oiseaux volants nés au POM en 1980 de parents captifs et rentrés pour l'hiver dans un bâtiment avec les individus désailés sont relâchés. Ils restent dans le POM au moins jusqu'en septembre. Le 12 mai, ils y sont rejoints par 4 migrateurs. Le 30 mai, des transports de matériaux par 2 individus sauvages sont notés (F. MONTEL) mais seul cette année 1 jeune naîtra de parents captifs.
Un couple s'installe en mai dans le secteur de Ponthoile mais pas de suites.
En janvier-février, 2 hivernants à Noyelles-sur-Mer/Boismont/Saint-Valery-sur-Somme où des oiseaux seront encore vus de mars à mai. Retour en ce secteur de migrateurs dès juillet : 5 le 3 puis 1 à 2 régulièrement observés jusque fin novembre.
Nouvel hivernage au POM : 3 jusqu'au 5 octobre puis 2 jusqu'en décembre.
1 le 30 juin à Neuville-Marais, commune de Forest-Montiers.

CIGOGNE NOIRE Ciconia nigra
P. TRIPLET a discuté les observations de l'année 1981 dans

"L'Avocette", avec cependant un rectificatif : 1 le 14 août et non le 16 à Sallenelle, commune de Pendé (B. et F. MONTEL). En bref, 2 individus du 12 au 30 août sur le littoral picard avec un passage le 21 : 4 en RBdS puis 3 les 23 et 24 au HA puis 1 jusqu'au 11 septembre.

SPATULE BLANCHE Platalea leucorodia
Passage de printemps, 6 le 28 mars au Crotoy.
Avril : 1 le 8 à Rue, 2 les 9 et 10 au POM puis 1 le 11, 1 le 12 au HA, 1 le 17 à Noyelles-sur-Mer, 1 le 19 en BdA, 3 le 29 à Saint-Valery-sur-Somme.
Mai : 1 les 7 et 17 au POM.
2 le 18 juillet au Crotoy (estivage ou migrateur précoce).
Passage d'automne, retour le 13 août : 2 ad. 3 juv. en RBdS/POM, 2 les 17 et 23, 1 juv. du 24 août au 10 septembre.
Net passage ensuite : 8 le 9 septembre au HA, 12 le 11 au POM, 24 le 17 en RBdS, encore 5 le 27 au POM, 1 le 28 à Noyelles-sur-Mer.
Octobre : 1 ad. 3 im. le 10 et 2 le 15 au POM, 1 le 30 à Saint-Valery-sur-Somme.

FLAMANT ROSE Phoenicopterus ruber
1 chilensis le 21 juin à L'Etoile (X. COMMECY).
1 chilensis du 4 juillet au 19 août à Boismont et Noyelles-sur-Mer et 2 de fin juillet à début août.
1 le 21 août en RBdS.
1 les 14 et 15 septembre au HA.


CYGNE TUBERCULE Cygnus olor
Nidification
Abbeville : 3 couples mixtes (1 des 2 partenaires est éjointé) dont 2 échecs et 1 couple/6 pulli.
Amiens (La Hotoie) : 1 couple/1 pullus ;
(MBdM) : 1 " /9 pulli ;
(marais des 3 vaches) : 1 couple/7 pulli.
Bray-sur-Somme : 1 couple/1 pullus.
Brie : 1 couple/6 pulli.
Cayeux-sur-Mer : 1 couple/1 nid mais aucun pullus.
Cléry-sur-Somme : 1 couple/4 pulli.
Curlu : 1 couple/1 nid.
Flixecourt : 1 couple/1 nid.
Quend (Froise) : 1 couple/5 pulli.
Fouencamps : 1 couple/1 nid.
Flamicourt : 1 " /9 pulli.
HA : 5 couples/9, 6, 5, 3 et 3 pulli.
Port-le-Grand : 1 couple/1 nid.
Noyelles-sur-Mer : 3 couples/1, 0 et 0 pullus (2 nids détruits volontairement)
Péronne : 1 couple/8 pulli.
Soit un minimum de 25 couples. L'effectif français est estimé à environ 400 couples (P. DUBOIS, Enquête BIROE 1978-79-80).
Quelques dates de premières observations de pulli : 13 mai au HA et 11 juin, 20 juillet à Noyelles-sur-Mer, 25 mai à Brie et 1er juin à Péronne.

	janvier	février	mars	avril	mai	juin
1ère déc.	? -43 (06)	41-27 (01)	02-52 (10)	22-10 (10)	32-15 (06)	10-07* (08)
2ème déc.	45-12 (20)	17-63 (15)	58-16 (16)	33-10 (17)	41-12* (13)	10-44* (11)
3ème déc.	61-39 (23)	13-72 (28)	31-21 (31)	45-10 (25)	34-29 (31)	10-72* (27)
	juillet	août	septembre	octobre	novembre	décembre
1ère déc.	8*-55* (08)	10*-83 (03)	14-74 (06)	18-85 (10)	12-53 (09)	30-22 (07)
2ème déc.	5*-44 (20)	11*-88 (18)	13-104 (20)	51-66 (18)	15-65 (14)	43-49 (19)
3ème déc.	4*-12* (29)	11*-78 (26)	12-76 (28)	28-15 (26)	15-65 (23)	64-75 (28)

Cygne tuberculé Cygnus olor

Lieux régulièrement suivis sur le littoral : secteur de Noyelles-sur-Mer, Boismont et Saint-Valery-sur-Somme (1er chiffre) + HA (2ème chiffre).
Dates entre parenthèses.
* pulli exclus des comptages.

Recensement aérien du nord de la BS : 85 le 5 décembre.



POM (maxima mensuels) : 14 en janvier, 7 en février, 5 en mars, 3 en mai, 6 en juin, 2 en juillet, 4 en août, 9 en septembre, 15 en octobre, 23 en novembre et 15 en décembre.
HVS : 34 en février, 29 en mars, 10 en avril, 9 (pulli exclus) en mai, 6 (pulli exclus) en juin, 10 (pulli exclus) en juillet, 38 (pulli exclus) en septembre, 25 (pulli exclus) en octobre, 23 en novembre et 32 en décembre.
Espèce notée aussi hors des lieux de nidification à l'intérieur des terres.
3 en janvier à Airaines, 2 en juin à Bergicourt, 2 en mai à Biaches, 1 en avril et 4 en octobre à Boves, 2 en février à Feuillères, 2 ad. 3 im. en octobre à Famechon/Bergicourt, 1 en février-mars à Fleury, 4 en mars à Gamaches.
Long-le-Catelet : 5 en février, 7 en mars et 6 en avril.
9 en décembre à Mareuil-Caubert et 7 à Régnière-Ecluse, 14 en janvier à Rue.
Saint-Sauveur : 2 en mai et septembre, 5 en octobre.
1 en mars à Tilloy-les-Conty.

CYGNE DE BEWICK Cygnus bewickii
3 du 2 décembre 1980 au 2 février au POM (+ 10 observateurs).
1 à Noyelles-sur-Mer et Boismont du 9 au 23 janvier ainsi que les 15 et 28 février (H. DUPUICH, P. GRANGE et P. TRIPLET).
1 du 9 au 12 novembre au POM (M. MENNECART).
1 du 7 au 19 décembre à Noyelles-sur-Mer et Boismont (X. et A.M. COMMECY, F. SUEUR et P. TRIPLET).
1 le 20 décembre au POM (GEPOP).

CYGNE SAUVAGE Cygnus cygnus
2 les 28 et 30 décembre au HA (E. CHACRON, F. MONTEL, P. TRIPLET et P. ROYER).

OIE DES MOISSONS Anser fabalis
RBdS-POM : min. 100 le 7 janvier, min. 180 le 20, min. 150 le 22, 1 le 1er février, 1 du 5 mars au 31 août, s'accouple avec un mâle captif du POM le 1er mai.
2 du 4 au 17 septembre, 3 du 19 septembre au 11 décembre, 47 le 18 décembre, 65 le 29.
Ces oiseaux se nourrissent avec les Oies cendrées A. anser à Vron : 130 le 9 janvier (+ 20 Oies cendrées), 36 le 18 février.
1 A. f. rossicus le 2 janvier au POM (M. HULLE, F. SUEUR et P. TRIPLET).
90 le 28 décembre à Rue.
A l'intérieur des terres : 120 en migration vers le NE le 18 février à Taisnil et 30 vers le NW le 18 mars au même endroit (J.C. ROBERT).

OIE RIEUSE Anser albifrons
RBdS-POM (maxima mensuels) : 35 en janvier, 3 en février et mars (dernières : 2 le 24)
Du 25 août au 16 novembre, 2 juv. issus d'un couple captif au POM ; 23 en migration vers le sud le 8 novembre, 65 en décembre.
12 en migration vers le SW le 16 décembre à Abbeville.

OIE CENDREE Anser anser

Des oiseaux probablement nés sur place hivernent toujours au POM : maximum 21 en janvier. Ce groupe (amputé de ce que les chasseurs prélévent) reste constamment dans le secteur aussi dans la suite n'indiquerons nous que les migrateurs.

Passage de printemps

Janvier : 26 + 4 + 32 en migration vers le nord le 10 au Crotoy.

Février : noté le 1er en BdA et le 10 à Ault ;
27 le 13 en RBdS et au POM, 150 le 17, 100 le 23, 200 le 25, 290 (5 vols) le 26 ;
15 le 24 à Rue, 8 le 19 à Curlu, 4 à Famechon du 16 au 24 (dortoir sur les étangs), 150 le 17 à Quend (Froise).

Mars : 122 le 1er à Amiens, 40 le 6 à Nouvion-en-Ponthieu, 20 le 10 et 19 le 11 à Cléry-sur-Somme, 120 le 15 à Fouencamps et 73 le 19 ;
40 le 10 en RBdS et au POM, 189 le 15 et 20 le 25 ;
1 le 26 à Cayeux-sur-Mer, 14 le 16 à Rue, 4 le 14 à Abbeville ;
stationnement au HA : 4 le 10, 35 le 15, 35 le 21 ;
et à Boismont : 28 le 8, 27 le 29 (encore 4 le 12 avril).

Avril : 15 ad. se cantonnent dans le POM, 1 accouplement le 20, 1 couple/4 pulli le 24, 1 couple/6 pulli le 28... 6 couples nicheurs au total.
Au HA, le stationnement continue, 23 le 9, 90 le 17, 68 le 26, 34 le 31.
Passages sur le littoral : 25 le 7, 43 le 8, 38 le 17, 11 le 20 et 27 le 22 ;
51 le 16 à Amiens, 2 le 22 à Abbeville et 8 le 20 à Long-le-Catelet.

Mai : encore quelques migrateurs surtout à l'intérieur des terres; 40 le 5 au Quesnoy, 1 les 6 et 7 à Fouencamps, 7 le 10 à Fontaine-sur-Somme, 30 le 15 à Aumont ;
toujours un stationnement au POM, 10 le 3, 89 le 13, 62 le 24, 1 migrateur le 27, 34 le 31 ;
7 le 2 à Noyelles-sur-Mer et 11 le 10 à Ault.

Juin : 5 le 5 au HA.

Retour des migrateurs le 22 septembre : 50 en RBdS puis 150 le 27.

Octobre : 235 le 20 à Fouencamps et 1 le 23, 1 le 17 à Famechon, 18 le 14 et 91 le 18 à Abbeville.

Novembre : 30 le 7 à Saint-Gratien et 50 à Famechon, passages nocturnes à Amiens et à Saint-Gratien le 29, 36 le 15 à Abbeville.

Décembre : 17 le 2 à Corbie, 25 le 15 à Abbeville ; 2 le 15 au Hourdel, commune de Cayeux-sur-Mer.

Environ 20 à 25 stationnent en RBdS et au POM en octobre, novembre et décembre (une quinzaine seulement subsistent fin décembre).

OIE DES NEIGES Anser caerulescens

1 ad. atlanticus du 1er janvier (présente depuis le 1er décembre 1980) au 10 avril au POM.

1 ad. du 1er au 31 décembre 1981 au POM.

BERNACHE DU CANADA Branta canadensis
3 fin avril à Fontaine-sur-Somme et 1 recueillie affaiblie le 3 mai (origine ?).

BERNACHE NONNETTE Branta leucopsis
Toutes les observations sont réalisées au POM où il y a aussi des individus captifs : 5 du 1er janvier au 13 février, 18 du 19 février au 5 mars, 6 le 13 mars, 5 du 16 au 24, 2 ad. du 27 mars au 10 septembre ; l'un d'entre eux (la femelle) s'accouple avec 1 mâle captif, 1 nid/4 oeufs le 3 juillet, éclosion le 17, plus que 3 pulli le 20, 2 juv. à l'envol le 11 septembre, ils restent au POM au moins jusqu'au 16 novembre ; 3 oiseaux volants observés au POM en novembre-décembre.

BERNACHE CRAVANT Branta bernicla
Peu observée cette année : 2 en RBdS le 9 février, 7 le 25, 1 le 26 puis 1 le 20 avril.
1 le 25 avril au HA.
Décembre : 3 le 6 et 2 le 18 en RBdS et au POM, 1 le 20, 2 les 27 et 28, 5 le 30.
Une observation à l'intérieur des terres, 2 le 24 décembre à Famechon (J.C. ROBERT).

TADORNE DE BELON Tadorna tadorna
Stationnement en BdA : 300 le 22 février et 110 le 15 mars.
Reproduction
La population nicheuse de l'ensemble du Marquenterre est estimée à 235 couples par F. SUEUR et P. TRIPLET mais une forte proportion semble ne pas se reproduire effectivement.
5 couples dans les renclôture de Noyelles-sur-Mer et de Saint-Valery-sur-Somme.
3 couples cantonnés au HA ; aucun pullus observé.
1ers pulli le 15 mai et dernières éclosions début août.
A l'intérieur des terres
Cléry-sur-Somme/Péronne : 9 le 28 janvier, 4 le 19 février, 1 le 14 octobre et le 12 novembre, 5 le 2 décembre, 63 le 27.
Estrèes-Mons : 1 le 7 février, 3 couples appareillés plus 1 individu le 25 mars, 4 couples le 25 mai, 11 individus le 1er juin, pas de pulli observés cette année.
1 le 7 février à Fouencamps, 1 en migration vers l'ouest le 15 décembre à Abbeville, 1 couple le 27 à Famechon.


Hybride TADORNE DE BELON Tadorna tadorna x TADORNE D'AUSTRALIE Tadorna tadornoides
1 mâle les 9 et 11 février au POM et en BdS (F. SUEUR).

TADORNE CASARCA Tadorna ferruginea
1 femelle les 16 et 26 juin au POM (F. MONTEL et F. SUEUR).

CANARD COLVERT Anas platyrhynchos
Cléry-sur-Somme : 300 le 28 janvier, 130 le 28 septembre, 800 le 31 octobre, 150 le 27 décembre.
Péronne : 80 le 19 février et le 27 juillet, 150 le 12 novembre, 100 le 27 décembre.
Nicheur à Amiens, Boves, Fouencamps, Cléry-sur-Somme, Péronne, au Crotoy, POM...


	Janvier	Février	Mars	Avril	Mai	Juin
1ère déc.		2500 (09)	500 (10)	450 (05)	300 (08)	300 + 40 (06)
2ème déc.	3000 (11)	670 (17)	600 (15)	500 (16)	250 (13)	350 + 70 (17)
3ème déc.	1500 (24)	1000 (23)	250 (25)	200 (22)	250 (22)	300 + 90 (22)
	Juillet	Août	Septembre	Octobre	Novembre	Décembre
1ère déc.	300 + 110 (2)	50 (10)	300 (08)	450 (04)		1300 (05)
2ème déc.	200 + 55 (19)	80 (18)	350 (17)	450 (17)	1100 (16)	3300 (13)
3ème déc.	50 (23)	140 (27)	500 (27)	1000 (27)	1100 (21)	4300 (28)

Tadorne de Belon Tadorna tadorna
Stationnements en RBdS et au POM : adultes + pulli et juv. peu volants.
Dates entre parenthèses.



	Janvier	Février	Mars	Avril	Mai	Juin
1ère déc.	620 (06)	560 (06)	320 (09)	40 (03)	45 (06)	75 (05)
2ème déc.	650 (19)	200 (19)	140 (16)	35 (16)	50 (16)	65 (19)
3ème déc.	600 (24)	600 (26)	100 (25)	30 (22)	55 (26)	110 (21)
	Juillet	Août	Septembre	Octobre	Novembre	Décembre
1ère déc.	145 (05)	245 (10)	310 (10)	465 (03)	275 (01)	410 (05)
2ème déc.	230 (16)	400 (14)	330 (13)	500 (11)	460 (16)	400 (20)
3ème déc.	382 (26)	320 (21)	260 (27)	410 (28)	600 (24)	1450 (24)

Canard colvert Anas platyrhynchos
Recensements au POM.
Dates entre parenthèses.



1 nid/12 oeufs le 11 février à Montdidier, 1ers pulli le 16 avril au POM.
Couvées observées : 34 couvées de 2 à 14 pulli, moyenne de 8 pulli.
Répartition :

pulli	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14
cas	1	1	5	3	3	3	2	2	2	7	2	1	2

SARCELLE D'HIVER Anas crecca
HA : 1 à 2 en janvier-février
passage net en mars et avril

mars	1ère décade	18
	2ème "	20
	3ème "	10
avril	1ère "	5
	2ème "	6
	3ème "	35
mai	1ère "	9

35 le 8 mars à Boismont.
Le 22 avril, 127 en migration vers le nord en 3 heures au nord de la BS.
Cléry-sur-Somme : 12 le 19 février, 17 le 15 mars, 1 le 12 mai, 21 le 28 septembre, 20 le 14 octobre, 18 le 2 décembre.
Péronne (Sainte-Radegonde) : 9 le 19 février, 3 le 15 mars, 1 le 6 mai, 3 le 27 juillet, 23 le 28 septembre, 40 le 14 octobre, 25 le 12 novembre, 130 le 2 décembre.
5 à Frise les 19 février et 28 septembre.
1 à Tilloy-les-Conty les 1er et 11 mars, les 6 et 9 avril.
1 à Biaches le 1er mai, 20 à Fontaine-sur-Somme le 14 octobre,
2 à Estrées-Mons le 31.
Famechon : 6 le 19 janvier, 10 le 7 octobre, 10 le 18 décembre.
Abbeville : 5 le 7 septembre, 1 le 27 octobre, 4 le 21 décembre.


CANARD CHIPEAU Anas strepera
HA : 1 couple/11 pulli et 1 couple/9 pulli.
Cantonnements notés en avril à Quend (Froise), Noyelles-sur-Mer et Rue.
1ère reproduction à l'intérieur des terres pour le département : 1 couple/6 pulli le 20 mai à Cléry-sur-Somme, 1 couple/4 pulli le 10 juillet soit au moins 2 couples (H. DUPUICH).
Des Canards chipeaux sont présents toute l'année dans la HVS avec toujours moins de 10 individus sauf en décembre : 25 les 2 et 27.
1 mâle 2 femelles le 8 mai à Famechon, 1 mâle le 20 avril à Long-le-Catelet, 1 le 29 septembre et 1 femelle le 8 octobre à Abbeville.

CANARD SIFFLEUR Anas penelope
Maxima mensuels en RBdS et au POM

janvier	: 200	le 24
février	: 115	le 26
mars	: 95	le 10
avril	: 25	le 16

	Janvier	Février	Mars	Avril	Mai	Juin
1ère déc.	350 (06)	95 (10)	165 (09)	55 (05)	11 (02)	1 (-)
2ème déc.	75 (16)	120 (17)	50 (16)	35 (15)	4 (11)	1 (19)
3ème déc.	175 (26)	110 (26)	75 (24)	30 (22)	1 (24)	6 (28)
	Juillet	Août	Septembre	Octobre	Novembre	Décembre
1ère déc.	4 (07)	1½ (10)	410 (10)	580 (02)	670 (01)	550 (01)
2ème déc.	16 (11)	90 (17)	500 (18)	480 (11)	550 (12)	315 (11)
3ème déc.	6 (30)	325 (31)	420 (21)	585 (28)	850 (24)	300 (22)

Sarcelle d'hiver Anas crecca
Recensements au POM.
Dates entre parenthèses.



	Janvier	Février	Mars	Avril	Mai	Juin
1ère déc.	57 (02)	17 (09)	25 (10)	6 (03)	8 (10)	9 (04)
2ème déc.	36 (15)	5 (11)	12 (17)	13 (16)	5 (19)	6 (14)
3ème déc.	36 (24)	26 (26)	18 (22)	11 (26)	4 (21)	6 (30)
	Juillet	Août	Septembre	Octobre	Novembre	Décembre
1ère déc.	13 (02)	-	12 (09)	14 (10)	13 (06)	20 (01)
2ème déc.	12 (13)	1 (14)	15 (15)	14 (14)	47 (12)	35 (20)
3ème déc.	-	6 (29)	8 (27)	45 (22)	45 (24)	48 (23)

Canard chipeau Anas strepera
Stationnements en RBdS et au POM.
Dates entre parenthèses.

mai : 20 le 8
juin : 3 le 13
juillet : 5 le 15
août : 14
septembre : 31 le 7, 45 le 20, 70 le 29
octobre : 150 le 27
novembre : 110 le 12
décembre : 300 le 31

11 en migration vers le nord le 25 février à Fort-Mahon, 36 le 8 avril au HA et 18 en migration vers le nord en 3 heures le 22 en BS.

A l'intérieur des terres

Abbeville : 1 femelle du 16 septembre au 31 décembre, 1 mâle le 12 novembre et 1 deuxième femelle du 18 au 21 décembre.

2 mâles 1 femelle le 5 janvier à Amiens, 12 le 11 décembre à Famechon, noté en février-mars et décembre en HVS, 1 mâle le 20 avril à Long-le-Catelet.

CANARD PILET Anas acuta

Stationnements en RBdS et au POM

janvier : 480 le 24
février : 1000 le 9
mars : 630 le 11
avril : 35 le 21
mai : 2 le 8
juin : 1
juillet : 2 le 12
août : 17 le 31
septembre : 19 lors de la première décade, 40 le 20, 120 le 28
octobre : 85 le 9, 270 le 14, 425 le 30
novembre : 450 le 29
décembre : 1250 le 30

11 en migration vers le nord le 24 février à Fort-Mahon, 7 en migration vers le nord le 13 mars en RBdS et 48 en migration vers le nord en 3 heures le 22 avril, 50 en migration vers le sud le 28 octobre en BdA.

HA : 10 le 26 mars, 17 le 17 avril, 8 le 2 mai, 1 le 5 juin, 2 le 28 décembre.

1 couple le 23 janvier à Fouencamps.

Cléry-sur-Somme : 3 le 28 janvier, 5 le 19 février, 8 le 2 mai, 1 le 5 juin, 2 le 28 décembre.

1 mâle du 4 au 18 mars à Fossemanant, 2 couples le 10, 20 le 15 octobre et 2 le 18 décembre à Famechon, 6 le 17 février à Quend (Froise).

SARCELLE D'ETE Anas querquedula

Premières : 1 mâle le 10 mars au POM, 1 mâle le 12 au HA et 1 couple le 13...

Arrivée généralisée dans la 3ème décade du mois : 40 le 26 au HA, 29 le 29 à Noyelles-sur-Mer...; le passage continue en avril : 12 le 9 au HA, 20 le 21 en RBdS...

Nidification certaine : Le Crotoy, HA et POM, Saint-Quentin-en-Tourmont.

Cantonnements notés aussi en mai à Rue et Noyelles-sur-Mer.

Passage en juillet-août : 16 le 29 juillet au POM, 14 le 12 août, 13 le 24; et se poursuivant en septembre : 8 le 4 au POM, 4 le 13, 1 le 27.

2 le 9 août au Hamel.
1 mâle retardataire le 8 octobre au POM.


CANARD SOUCHET Anas clypeata
10 le 21 février en BdA, 135 en migration vers le nord en 3 heures le 22 avril en BdS.
Nidification : 1 couple/2 pulli les 4 mai et 10 juin à Rue ;
2 couples/9 et 9 pulli le 14 mai au POM, 8 pulli du 8 au 22 juin ;
nicheur certain au HA.
Lieux régulièrement suivis
HA : 3 le 28 février,
66 le 8 mars, 67 le 16, 112 le 21
80 le 5 avril, 39 le 17, 12 le 26
14 le 2 mai, 5 le 13, 14 le 27
8 le 5 juin, 2 le 11, 1 le 30
2 le 12 juillet
2 le 18 octobre
1 en décembre
Noyelles-sur-Mer/Boismont/Saint-Valery-sur-Somme :
40 le 10 mars, 27 le 15, 90 le 26
60 le 7 avril, 49 le 12, 8 le 15
10 le 4 mai, 3 le 13
1 le 30 juin
Rue : 1 le 29 janvier
12 le 4 mars, 25 le 13, 42 le 27
4 le 8 avril
10 le 4 mai
35 (nidification) le 14 juin
HVS : 8 le 11 mars
5 le 20 avril, 6 le 27
9 le 20 mai
11 le 28 septembre
8 le 31 octobre
11 le 12 novembre
9 le 27 décembre
Localités moins régulièrement prospectées
Mars : 2 le 15 à Boves, 24 le 11 à Saint-Quentin-en-Tourmont, 1 couple le 26 à Bergicourt, 3 couples le 27 à Argoeuves, 1 le 18 à Fossemanant.
Avril : 6 le 21 à Long-le-Catelet, 1 le 19 à Corbie.
1 couple le 15 juin à Roye, 1 le 16 septembre à Abbeville, 12 le 13 novembre à Fouencamps.

NETTE ROUSSE Netta rufina
2 mâles entre Noyelles-sur-Mer et Saint-Valery-sur-Somme du 3 au 10 mai, 1 mâle le 5 au POM, 1 mâle au HA les 5 et 8 juin, 1 femelle le 8 à Rue (Larronville) et 1 mâle le 10 (marais de Rue).

FULIGULE MILOUIN Aythya ferina
HVS (maximum mensuel) :
350 le 28 janvier, 425 le 19 février, 265 le 15 mars, 14 le 27 avril, 25 (nidification) le 20 mai, 13 le 10 juin, 39 le 27 juillet, aucune donnée en août, 13 le 28 septembre, 400 le 31 octobre, 370 le 12 novembre, 185 le 2 décembre.

	Janvier	Février	Mars	Avril	Mai	Juin
1ère déc.	62 (08)	16 (06)	53 (09)	90 (05)	8 (06)	6 * (08)
2ème déc.	21 (16)	2 (11)	125 (18)	60 (21)	10 * (12)	4 * (13)
3ème déc.	4 (21)	15 (27)	230 (22)	12 (26)	3 * (23)	6 * (29)
	Juillet	Août	Septembre	Octobre	Novembre	Décembre
1ère déc.	9 (08)	9 (03)	20 (07)	57 (10)	13 (01)	11 (01)
2ème déc.	22 (15)	23 (15)	28 (13)	63 (19)	40 (16)	12 (18)
3ème déc.	15 (26)	19 (27)	38 (27)	31 (30)	40 (24)	8 (30)

Canard souchet Anas clypeata
Stationnements en RBdS et au POM.
Dates entre parenthèses.




	Janvier	Février	Mars	Avril	Mai	Juin
1ère déc.	46 (04)	20 (09)	0	20	5 (10)	9
2ème déc.	22 (19)	30 (17)	0	12 (20)	2	1
3ème déc.	40 (25)	4	1	7 (26)	1 (21)	6
	Juillet	Août	Septembre	Octobre	Novembre	Décembre
1ère déc.	1 (06)	4 (10)	7 (04)	6 (03)	19 (01)	10 (01)
2ème déc.	0	14 (15)	9 (13)	35 (20)	27 (12)	35 (20)
3ème déc.	0	7 (31)	4 (28)	40 (27)	12 (24)	25 (22)

Fuligule milouin Aythya ferina
Stationnements au POM.
Dates entre parenthèses.

	Janvier	Février	Mars	Avril	Mai	Juin
1ère déc.	23	25 (09)	12	7	3	1
2ème déc.	17	22	6 (15)	6	5	2
3ème déc.	16	6	6	25	2	2
	Juillet	Août	Septembre	Octobre	Novembre	Décembre
1ère déc.	2	1	3	5	10	4 (05)
2ème déc.	1	3	4	9	26	30 (20)
3ème déc.	1	5	2	135 (22)	7	50 (28)

Fuligule morillon Aythya fuligula
Stationnements au POM.
Dates entre parenthèses.



	Janvier	Février	Mars	Avril	Mai	Juin
1ère déc.	9 (06)	9 (02)	6 (08)	-	20 (04)	-
2ème déc.	10 (20)	11 (15)	6 (20)	22 (12)	1 (13)	6 (11)
3ème déc.	12 (25)	5 (26)	15 (26)	16 (25)	5 (31)	1 (30)
	Juillet	Août	Septembre	Octobre	Novembre	Décembre
1ère déc.	7 (08)	1 * (04)	-	3 (10)	24 (02)	32 (07)
2ème déc.	1 (20)	5 * (14)	-	26 (18)	18 (14)	200 (20)
3ème déc.	3 * (29)	1 (26)	24 (26)	23 (26)	26 (29)	165 (27)

Fuligule morillon Aythya fuligula
Stationnements au HA.
Dates entre parenthèses.
* : nidification.

Quelques observations sont aussi réalisées au nord :
1 mâle 2 femelles le 22 avril
10 le 6 septembre et 15 le 8
25 en migration vers le sud le 8 novembre
1 mâle 8 femelles le 5 décembre, 1 mâle 2 femelles le 30.

MACREUSE NOIRE Melanitta nigra
Maxima mensuels au nord de la BS : 100 le 25 janvier, 50 le 21 février, 297 en migration vers le nord en 3 heures le 22 avril (P. RAEVEL), 390 le 23, 175 le 2 mai (G. FLOHART), 9 les 20 et 21 juin, 36 le 27 juillet (moins de 10 dans la première moitié du mois, premiers passages après le 20), 30 le 6 août, 20 le 27 octobre, 50 les 15 novembre et 30 décembre.
Au sud de la BS : 50 le 18 janvier, 300 le 9 février, 920 le 26 (J.P. DAUSSY, B. et F. MONTEL), 50 le 12 avril, 12 le 23 novembre, 160 le 27 décembre.
16 individus trouvés morts mazoutés du 1er janvier au 15 février.
A l'intérieur des terres : 2 le 1er décembre à Estrées-Mons (E. MERCIER).

MACREUSE BRUNE Melanitta fusca
69 individus trouvés morts mazoutés en janvier-février (GEPOP).
15 le 22 janvier en RBdS et 25 le 24 à Quend-Plage, 20 le 1er février à Fort-Mahon, 48 en migration vers le nord en 3 heures le 22 avril à Quend-Plage.
Passage postnuptial : 1 mâle le 17 septembre en RBdS, 2 en migration vers le sud le 27 octobre à Quend, 10 le 20 décembre à Cayeux-sur-Mer.

GARROT A OEIL D'OR Bucephala clangula
RBdS/POM
Janvier : 11 le 9, 12 le 16, 13 le 23
Février : 13 le 4, 14 le 19, 5 le 27
Mars : 5 le 5, 1 le 19
1 femelle/im. du 19 avril au 6 mai
Novembre : 1 femelle/im. le 16
Décembre : 1 le 1er, 11 le 20, 19 le 27
HA, janvier : 1 mâle 1 femelle du 12 au 23
mars : 1 femelle/im. le 17, 1 mâle le 20
avril : 1 du 4 au 12
décembre : 1 femelle/im. le 14, 5 femelles le 19, 1 mâle 6 femelles le 20, 7 femelles le 22, 6 femelles le 28, 5 femelles le 30
2 le 5 avril à Noyelles-sur-Mer, 1 mâle 3 femelles le 30 décembre, 1 femelle/im. les 17 et 27.

HARLE PIETTE Mergus albellus
POM : 3 femelles/im. du 9 au 20 janvier, 7 femelles/im. le 22
8 femelles/im. le 1er février, 6 femelles/im. le 17, 1 mâle 6 femelles/im. le 26
2 femelles/im. du 12 au 19 décembre, 1 mâle 14 femelles le 20, 2 mâles 12 femelles les 22 et 24, 2 mâles le 27.
HA : 1 femelle/im. le 23 janvier, 1 femelle/im. du 19 au 31 décembre.

1 femelle/im. du 19 au 30 décembre au Crotoy.
A l'intérieur des terres, 1 mâle 1 femelle le 28 janvier à Cléry-sur-Somme.

HARLE HUPPE Mergus serrator
Hivernage
janvier : 2 mâles 1 femelle au HA, 3 le 9 à Cayeux-sur-Mer, 1 mâle le 18 en RBdS
février : 1 mâle 2 femelles le 9 au POM et 3 femelles en RBdS, 1 femelle le 15 à Ault, 1 mâle 6 femelles le 17 au POM.
Puis commence le passage de printemps qui est suivi au nord de la BS
mars : 9 les 5 et 10, 17 le 19, 7 le 22, 16 le 31
avril : 16 le 5, 17 le 7, 26 le 21, 152 en migration vers le nord en 3 heures le 22, 6 le 24
mai : 2 mâles 1 femelle le 1er, 12 le 2, 1 mâle le 3.
Retour le 15 novembre : 2 en RBdS et encore 2 le 29.
Décembre : 2 le 5, 1 le 11, 5 le 27
14 en migration vers le sud le 20 à Ault.

HARLE BIEVRE Mergus merganser
2 mâles 2 femelles du 11 au 16 février en RBdS et au POM ainsi que 3 mâles 5 femelles le 17 (F. SUEUR et P. TRIPLET).
1 femelle/im. le 29 novembre au POM (J.P. DAUSSY, B. et F. MONTEL).
1 femelle le 20 décembre au HA (H. DUPUICH), 1 mâle le 22 au POM (O. HERNANDEZ et T. RIGAUX), 5 femelles/im. le 31 (F. MONTEL et P. TRIPLET).

BUSE VARIABLE Buteo buteo
Observée en
janvier : Beauval, Boves, forêt de Crécy, Drucat (tout le mois), Epaumesnil, Frémontiers, Mesnil-Saint-Georges, POM, Quend, Taisnil, Tilloy-les-Conty, Velennes ;
février : Boves, Coisy, Drucat (jusqu'au 9), Epaumesnil, Fouencamps, POM, RBdS, Saint-Quentin-en-Tourmont (Le Bout des Crocs), Selincourt ;
mars : Airaines, Boves, Cléry-sur-Somme, Contre, forêt de Crécy, Epaumesnil, Fouencamps, Frémontiers, POM, Quend, Selincourt (transport de matériaux le 15), Taisnil (1 couple présent pendant toute la période de nidification), Tilloy-les-Conty, Velennes ;
avril : bois de Cambos, Frémontiers, Poix (transport de matériaux), Soues ;
mai : Bouttencourt, Dromesnil, Feuillères (1 en migration vers le nord le 11), Guizancourt, HA, Métigny, Neuilly-l'Hôpital, POM, Selincourt, Wailly, Woirel ;
juin : Epaumesnil (1 nid), Frémontiers (nicheuse probable), Métigny (nicheuse), POM (2 en migration vers le nord le 4), Saleux ;
juillet : Bergicourt, Epaumesnil (2 à 3 juv. à l'envol), Métigny, POM, Selincourt, Thennes ;
août : Abbeville, Ferrières, Montagne-Fayel, Noyelles-sur-Mer, POM (4 en migration le 14, 1 le 30, 3 le 31), Rollot, RBdS, Saint-Quentin-en-Tourmont ;

septembre : Avesnes, forêt de Crécy, Drucat (1 en migration vers le sud-ouest), Epaumesnil, Le Hamel, Loeuilly, Mouflers, POM (3 le 12), Pont-Rémy, RBdS, Tilloy-les-Conty, Yzeux ;
octobre : Airaines, Le Crotoy, Fouencamps, Le Hamel, POM, RBdS, Selincourt, Vaux-sur-Somme ;
novembre : Fouencamps, Noyelles-sur-Mer, POM, Quend (y compris Froise), RBdS (4 le 6, 3 en migration vers le sud le 8), Selincourt, Saint-Quentin-en-Tourmont ;
décembre : Abbeville, Amiens, Airaines, Boves, Drucat, Quend-Plage, RBdS.

BUSE PATTUE Buteo lagopus
1 en RBdS et au POM les 8 et 12 novembre (M. MENNECART et M. MONTADERT).

EPERVIER D'EUROPE Accipiter nisus
Hivernage : 2 en RBdS et au POM en janvier-février, 2 en forêt de Crécy en janvier ;
quelques isolés ailleurs : Amiens (tiré au fusil en ville, il mourra malgrè les soins), Fouencamps (1 le 22 février), Famechon (1 femelle le 10 janvier), Nouvion-en-Ponthieu (1 mâle le 17 février), Tilloy-les-Conty (1 femelle les 1er et 11 janvier).
Passage de printemps : en mars-avril et 1 retardataire le 11 mai à Amiens ;
mars : 1 femelle à Drucat le 4, 1 à Airaines le 7, 1 femelle à Feuquières-en-Vimeu le 13, 1 le 24 à Quend-Plage, 1 femelle le 14 à Saveuse, 1 le 10 à Saint-Quentin-en-Tourmont, 1 femelle du 19 au 24 en RBdS et au POM, 1 mâle le 6 à Saleux, 1 femelle le 18 à Wailly ;
avril : 1 à Grivesnes (Ainval-Septoutre) le 18, 2 au Crotoy le 13, 1 au POM le 18, 1 à Tilloy-les-Conty le 7, 1 femelle à Famechon le 20.
Passage d'automne
août : 1 le 1er au POM, 1 le 12 à Noyelles-sur-Mer, 3 le 31 au POM ;
septembre : 1 stationne au POM du 6 au 26, 1 autre de passage le 19, de même le 27 ; 1 les 28 et 29 à Abbeville, 1 mâle le 9 à Tilloy-les-Conty et 1 le 5 à Saint-Valery-sur-Somme ;
octobre : 1 tout le mois au POM ;
fort passage à la fin du mois, 1 le 24 à Vaux-sur-Somme, 1 femelle le 26 à Saint-Valery-sur-Somme, 16 (dont 1 groupe de 8) en migration vers le sud en 3 heures le 27 sur le littoral au nord de la BS, 2 en RBdS les 30 et 31, 1 au Hamel le 30 ;
novembre : suite du passage au début du mois, 2 le 1er à Ailly-le-Haut-Clocher ; 1 femelle à Abbeville les 4, 5, 13 et 28 ; 2 en migration vers le sud en 1 heure le 7 en RBdS et au POM ainsi que 2 autres le 8 alors que 3 stationnent ce jour-là.
Puis les hivernants s'installent (observations régulières en novembre et décembre) : 1 femelle autour d'Airaines présente à partir du 9 novembre, 1 mâle dans les bois plus au sud (Epaumesnil...), 2 en RBdS et au POM, 1 femelle à Drucat du 1er au 21 décembre (capture d'un Pinson des arbres Fringilla coelebs).

Quelques observations isolées : 1 femelle le 22 novembre à Tilloy-les-Conty, 1 le 23 à Cayeux-sur-Mer, 1 le 28 à Saint-Riquier, 2 le 28 en forêt de Wailly, 1 le 19 décembre à Saint-Quentin-en-Tourmont, 1 le 21 à Abbeville.
Le 14 novembre en forêt de Crécy, 4 plumées : 2 grives musiciennes Turdus philomelos, 1 mâle de Merle noir T. merula et 1 Verdier d'Europe Carduelis chloris.

AUTOUR DES PALOMBES Accipiter gentilis
1 le 2 octobre au POM (F. SUEUR), 1 femelle adulte le 14 à Drucat (F. MONTEL), 1 le 7 novembre au Crotoy (P. TRIPLET).

MILAN ROYAL Milvus milvus
Passage de printemps en avril (sauf 1 retardataire le 28 mai à Taisnil) : 1 le 5 à Airaines et 1 en vol vers le nord à Noyelles-sur-Mer, 1 les 10 et 17 au POM, 1 le 26 à Saint-Valery-sur-Somme et 1 le même jour à Blangy-sous-Poix.
Retour : 1 le 1er août au POM, 1 en migration le 4 octobre à Airaines.
Quelques observations ponctuelles d'hivernants : 1 le 13 décembre à Amiens, 1 le 20 en RBdS et au POM, 1 à Famechon et 1 à Blangy-Tronville le 21.

MILAN NOIR Milvus migrans
Contrairement au Milan royal, le Milan noir a tendance à stationner à la remontée sur la côte : 1 du 6 au 26 avril au POM, 1 le 9 mai et du 13 au 17, 2 du 20 au 24 et 1 le 30 puis 1 début juin.
Ailleurs : 1 le 17 mai à Boves, 1 le 3 à Wailly.
1 seule observation en dehors du passage de printemps : 1 le 15 juillet au POM.

BONDREE APIVORE Pernis apivorus
1 adulte le 3 mai à Guizancourt puis 1 au POM le 9 et toujours 1 net passage à la fin de ce mois : 1 le 21 à Amiens et 1 à Velennes (mangeant 1 Orvet Anguis fragilis), 1 le 24 à Arguel et 2 à Bouttencourt, 1 le 30 à Bertangles.
1 le 19 juin à Abbeville.
2 à 3 cantons pour la moitié ouest de la forêt de Crécy en juillet et août (G. FLOHART).
2 observations en juillet à quelques kilométres l'une de l'autre : 3 le 20 à Yzeux et 1 le 31 à Riencourt.
La migration de retour est notée le 2 août à Quend-Plage (1 im.) et au POM (1 ad.). Que faire de l'observation à cette même date d'un couple à Frémontiers : nicheurs ou migrateurs ?
1 le 5 à Méréaucourt et 1 le 6 à Bacouel ; ensuite : 1 les 13 et 21 au POM, 1 le 27 à Rue.
Dernières : 2 le 30 août à Rue.

BUSARD DES ROSEAUX Circus aeruginosus
Premiers : 1 mâle le 20 mars à Port-le-Grand, 2 femelles le 21 à Noyelles-sur-Mer, 3 autres observations en mars.
Avril : 1ère décade, 4 lieux d'observation pour 10 oiseaux
2ème " , 6 " " " 8 "
3ème " , 3 " " " 4 "
Mai : les couples nicheurs sont installés à Cléry-sur-Somme, au HA, à Noyelles-sur-Mer et Rue.

Observé aussi en période de nidification au POM, à Mareuil-Caubert, au Crotoy, au Mesge et au Hamel.

Août : dans la seconde moitié du mois et plus particulièrement pendant la 3ème décade a lieu la migration bien que des Busards des roseaux soient déjà observés en RBdS au début du mois (3 du 2 au 17) ;
1 le 14 à Quend (Monchaux), 1 en migration le 16 en BdA, 1 le 18 à Quend (Monchaux) et 1 au Crotoy, 4 migrateurs le 24 au POM, 1 à Port-le-Grand le 27, 3 le 28 en RBdS et au POM, 3 le 29 à Quend (Froise), 3 migrateurs le 30 au POM et 1 à Noyelles-sur-Mer, 1 migrateur le 31 au POM.

Septembre : 2 du 4 au 13 au POM ainsi qu'1 mâle et 2 femelles/im. le 27, 1 en migration le 14 à Abbeville.
1 im. pris dans un piége à poteau le 1er à Saint-Valery-sur-Somme ! On "protège" activement dans le secteur...

Octobre : 1 du 2 au 28 en RBdS et au POM, 1 femelle/im. le 8 à Airaines, 2 en migration le 16 à Abbeville.

Dernier : 1 le 12 novembre au POM.

BUSARD SAINT-MARTIN Circus cyaneus

Hivernage : 1 mâle à Airaines en janvier-février
nord de la BS, 1 mâle 2 femelles/im. (2 mâles les 10 et 11 janvier)
sud de la BS, 1 ou 2 femelles/im.

Quelques-uns observés occasionnellement ailleurs : Ailly-le-Haut-Clocher (janvier), Beauval (janvier), Belloy-sur-Somme (2 en janvier), Bray-les-Mareuil (janvier), Caix (2 en janvier), Drucat (février), Estrées-Mons (février), Famechon (janvier), Quend (Froise, février), Longvillers (janvier).

Mars-avril-mai : pas de passage de printemps net, les observations en dehors des sites de reproduction connus étant rares : Camon (mai), Coisy (mai), Cléry-sur-Somme (mai), Cayeux-sur-Mer (Le Hourdel, mai), HA (avril), Vaux-sur-Somme (mai).

Nicheur certain dans la région d'Airaines : 1 couple/4 pulli et 1 couple/3 pulli, ces derniers seront trouvés morts, probablement tués volontairement par l'homme après la moisson (les 2 nids avaient été protégés par le GEPOP).

Nicheur probable ou possible à Beauquesne, Frémontiers, Neuville-les-Loeuilly, Noyelles-sur-Mer, Quevauvillers, Rue et Vergies.

Quelques observations isolées en juin nous laissent supposer que le nombre de Busards Saint-Martin nicheurs est plus important que celui que nous connaissons : Bettencourt, Ferrières, Saint-Riquier.

Passage des migrateurs dès juillet : 1 mâle en migration vers le sud à Favières, 1 mâle le 26 à La Chaussée-Tirancourt.

Août : 5 localités d'observations hors lieux de nidification (surtout en fin de mois)

Septembre : 2 localités d'observations hors lieux de nidification

Octobre : 3 femelles/im. en RBdS le 27, 1 mâle le 26 au Crotoy, 1 le 21 à Mouflers

Novembre : 12 localités d'observations (7 à l'intérieur du département).

Décembre : 17 localités d'observations mais 12 sont situées en bordure de mer ou dans la Plaine maritime picarde ; maximum de 6 femelles/im. le 24 en RBdS, encore 4 le 28.

Dans la région d'Airaines, près du lieu où 2 couples ont niché de façon certaine, notons : 1 mâle 3 femelles/im. en septembre, 1 mâle 2 femelles/im. en octobre, 1 couple en novembre et décembre.


BUSARD CENDRE Circus pygargus
2 couples nicheurs dans la région d'Airaines, 5 jeunes à l'envol (J.P. FERRE). 1 autre couple s'était installé en mai-juin au sud-ouest d'Airaines mais le nid fut probablement détruit par la coupe des fourrages intervenue entre le 12 et le 18 juin. C'est d'ailleurs ce dernier jour que 2 mâles et 3 femelles sont observés là où 2 couples nicheront avec succès. La première observation dans ce secteur a été réalisée le 26 avril : 1 mâle puis 1 couple le 10 mai. Dernière observation le 15 septembre. Autres observations : 1 mâle adulte le 3 mai à Famechon et 1 mâle le 30 juin à Velennes.

BALBUZARD PECHEUR Pandion haliaetus
2 observations de printemps : 1 im. le 8 mai à Famechon, 1 en vol vers le nord-est le 20 en RBdS et au POM.
Retour : 1 juv. migrateur le 18 août au POM, 1 stationne en RBdS et au POM du 27 août au 11 septembre (le 28 août, 2 seront observés en RBdS) ; c'est probablement 1 autre qui est observé du 31 août au 27 septembre à Noyelles-sur-Mer ; 1 le 25 septembre à Saint-Quentin-en-Tourmont.

FAUCON PELERIN Falco peregrinus
Passage de printemps : 1 mâle 1 femelle le 3 mai à Ault (Bois de Cise), 1 en vol vers le nord-est le 26 au POM.
Retour : 1 femelle le 25 septembre en RBdS, 1 le 28 octobre au HA, 1 du 1er au 29 novembre en RBdS et au POM.

FAUCON HOBEREAU Falco subbuteo
Passage de printemps en mai : 1 le 6 à Frémontiers, 1 le 8 à Bellancourt, 2 le 19 à Selincourt, 2 le 31 en BdA.
1 les 10 et 11 juin à Airaines (migrateur ?).
Retour : 1 les 17 et 26 août à Saint-Quentin-en-Tourmont, 1 le 27 à Abbeville.

FAUCON CRECERELLE Falco tinnunculus
Noté en hivernage (janvier, février et décembre) dans 67 localités différentes.
Net passage en mars avec 42 localités d'observations.
Des recherches d'avril à juin dans toute la Somme (sauf le quart nord-ouest) ont permis de localiser des Faucons crécerelles dans 55 localités. Tous ne sont peut-être pas nicheurs mais ce chiffre est encourageant, cette prospection n'ayant pas été exhaustive et de nombreux individus ayant pu échapper aux recherches.
Juillet : 6 localités nouvelles par rapport à avril à juin (2 où l'espèce a niché de façon certaine dont 1 nid sur un pylône de ligne à haute tension à Mirvaux).
Août : après le 15, observations de familles hors lieux de nidification et premiers migrateurs (dunes du Marquenterre et BdA).
Septembre à novembre : le Faucon crécerelle est observé dans 65 localités, ce qui montre un net passage à cette époque (33 localités pendant ces 3 mois où l'espèce



Balbuzard pêcheur

n'avait pas été observée en période de nidification).
Au total : 134 localités d'observations.

FAUCON EMERILLON Falco columbarius
RBdS/POM : 1 femelle de passage le 27 septembre puis installation de 1 à 2 individus de la mi-octobre à la fin décembre.
Ailleurs sur le littoral : 1 femelle/im. le 26 octobre à Cayeux-sur-Mer, 1 le 1er novembre à Quend (Froise), 1 le 2 à Cayeux-sur-Mer (Brighton), 1 le 8 au Crotoy.
A l'intérieur : 1 femelle le 1er janvier à Airaines, 1 le 30 avril à Buire-sur-Ancre, 1 en migration le 19 octobre à Abbeville, 1 le 12 novembre à Estrées-Mons.

PERDRIX GRISE Perdix perdix
Reproduction : 4 couples/100 ha dans le Vimeu
10 " /100 ha sur le Plateau picard sud
potentialité moyenne de 15 à 20 couples/100 ha
23 % des nids dans les céréales d'hiver
23 % dans les bordures de chemins
nids détruits : 57 % par travaux agricoles
28 % par prédateurs
13,5 % par intempéries
taux d'éclosion : 82 % (12 pulli/nid)
Source : Le Courrier Picard 05/04/1982
Quelques rassemblements : 13 le 16 janvier à Drucat, 10 en février à Airaines, 8 + 5 + 7 le 17 décembre à Airaines et 5 + 5 + 7 à Métigny le même jour, 8 le 19 à Famechon.

FAISAN DE COLCHIDE Phasianus colchicus
Nicheur commun.

CAILLE DES BLES Coturnix coturnix
1 chanteur le 24 mai à Dromesnil.
4 sites recensés dans le secteur de Wailly, Frémontiers et Fleury.
Plusieurs chanteurs en juillet-août à Airaines.

GRUE COURONNEE Balearica pavonina
Les 2 adultes présents du printemps 1980 à la mi-juillet 1981 dans le marais de Rue se reproduisent cette année et donneront 2 jeunes à l'envol (M. MENNECART, M. MONTADERT, F. SUEUR et P. TRIPLET).

RALE D'EAU Rallus aquaticus
Probablement commun dans toutes les vallées, sa discrétion en été ne permet guère de le détecter (1 seul contact de la fin avril à la fin août : 1 le 8 juillet au HA).
Notons : 3 chanteurs le 31 janvier à Belloy-sur-Somme, 3 chanteurs le 10 mars à Boves, 10 chanteurs le 4 avril à Noyelles-sur-Mer, 3 chanteurs le 9 à Abbeville...
Toujours un net passage fin octobre-début novembre : 3 le 27 octobre contre 1 de fin août à la mi-octobre.
Abbeville (PMB) : retour, 1 le 29 août, noté jusqu'au 4 novembre, 3 les 6 et 9, puis 1 jusqu'à la fin décembre.
(marais Saint-Gilles) : 1 de août à décembre sauf plusieurs le 12 novembre.

MAROUETTE PONCTUEE Porzana porzana

L'hivernage exceptionnel noté le 3 décembre 1980 s'est prolongé en 1981 et a même été plus important que nous l'imaginions :
- 1 le 24 janvier à Saint-Quentin-en-Tourmont (P. TRIPLET),
- 1 le 27 au POM (F. SUEUR),
- 1 le 28 à Cléry-sur-Somme (H. DUPUICH),
- 1 le 2 février à Fouencamps (P. TRIPLET).

1 le 31 mars au HA (P. TRIPLET), passage de printemps ?
1 chanteur le 25 avril à Noyelles-sur-Mer (X. COMMECY, H. DUPUICH et P. THIERY), peut-être déjà entendu à cet endroit le 4.
1 chanteur le 12 mai à Cléry-sur-Somme (H. DUPUICH).
Passage d'automne :
- 1 adulte les 9 et 23 septembre au PMB, Abbeville (X. COMMECY),
- 1 le 16 novembre à Saint-Quentin-en-Tourmont (P. TRIPLET).

POULE D'EAU Gallinula chloropus

Nicheuse bien répandue dans tout le département.
Premiers pulli notés le 7 avril au POM, encore des éclosions à la mi-août.
Réussite des couvées : 2,8 pulli/11 familles suivies ainsi que 3 nids garnis observés contenant 5, 8 et 9 oeufs.
Quelques rassemblements :
HVS (Brie + Cléry-sur-Somme + Estrèes-Mons + Frise + Péronne + Saint-Christ-Briost) : 25 en mars, 40 en septembre, 50 en octobre, 110 en novembre, 180 en décembre ;
Abbeville : 40 en janvier, 35 en septembre, 90 en décembre ;
Amiens (MBdM) : 172 en février, 130 en septembre, 80 en octobre ;
POM (ad. seulement) : 40 en janvier, 25 en février, 30 en mars, 20 en avril, 12 en mai, 14 en juin, 45 en juillet, 60 en août et en septembre, 55 en octobre, 60 en novembre, 20 en décembre.

FOULQUE MACROULE Fulica atra

Nicheuse commune. Premiers pulli le 22 avril au POM.

pulli	01	02	03	04	05	06	07	08	09
cas	6	10	8	5	5	1	2	0	1

Moyenne : 3,3 pulli/couvée (2,5 en 1980 et 3,2 en 1979.
Stationnement pendant le coup de froid du 20 décembre
POM : 33 le 18, 150 le 20, 280 le 29 ;
HA : 320 le 15, 1920 le 19, 1100 le 22, 350 le 27, 310 le 28, 540 le 30.
Le passage de printemps est suivi à Noyelles-sur-Mer/Boismont en mars-avril : 9 le 10 mars, 31 le 16, 40 le 26, 50 le 9 avril, 46 le 11, 40 le 25, 25 le 2 mai ;
ensuite seuls sont présents les nicheurs. Ces mares montrent aussi de forts passages de décembre devant le froid :
0 avant le 18, 220 le 19, 370 le 21, 300 le 27, 35 le 30.
A l'intérieur des terres
Abbeville (PMB) : 120 le 8 janvier, 110 le 9 février, 65 le 4 mars, 44 le 20, 5 le 6 avril, 1 couple de la mi-avril au 19 juin où ce jour un autre adulte et 3 pulli sont observés, 11 le 26 août, 20 le 9 septembre, 30 le 27 octobre, 57 le 20 novembre, 120 le 20 décembre.

Amiens (La Hotoie) : 65 le 23 décembre, 95 le 28.
HVS : 650 en février, 370 en mars, 100 en mai, 250 en juillet (fin du mois), 1400 en septembre, 1310 en octobre, 2100 en novembre, 1860 le 2 décembre et 2200 le 27 (après le froid).

Stationnements sur le littoral

	POM	HA
janvier	220	85
février	200	480
mars	150	130
avril	16	90
mai	5	120
juin	8	170
juillet	15	360
août	35	1600
septembre	81	830
octobre	105	700
novembre	170	480
décembre	280	1920

HUITRIER-PIE Haematopus ostralegus

Toutes les observations ont été réalisées sur le littoral. Les fortes concentrations ne se rencontrent qu'en baie de Somme qui représente un des principaux sites d'hivernage français pour l'espèce.

Stationnements
BdS/POM

janvier : 2660 le 22
février : min. 1100 le 4, 2480 le 17, min. 2000 le 23
mars : min. 550 le 10, 1770 le 11, 800 le 25
avril : 1200 le 6 (35 à 40 % d'immatures sur 107 individus), 620 le 19, 650 le 22
mai : 750 le 7, 740 le 18, 750 le 24 (84 % d'immatures sur 215 individus)
juin : 870 le 4, 150 le 17, 630 le 25
juillet : 685 le 3, 510 le 18, 675 le 25
août : 1000 le 3, 2500 le 18, 3700 le 28
septembre : 3100 le 2, 2970 le 17 (56 ad. pour 44 im.), min. 2800 le 27
octobre : 1980 le 3, 3640 le 17, 4200 le 30
novembre : 4720 le 16, min. 3000 le 30
décembre : min. 3000 le 5, min. 5000 le 11, 7000 le 28.

autres données parvenues tardivement : 4500 le 23 février, 1900 le 19 janvier au Crotoy (oiseaux se réfugiant à marée haute dans la RBdS ou au POM).
Les variations saisonnières traduisent quelque peu les périodes de migration essentiellement nocturne de l'espèce dont on a cependant deux observations directes :
2 en vol vers le nord le 5 avril à Fort-Mahon
112 en vol vers le nord le 22 avril en RBdS-nord

BdA
Les effectifs hivernaux sont maintenus très en dessous des potentialités d'accueil de la baie suite à une intense pression cynégétique.
février : 50 le 1er, 80 le 15, 120 le 24
avril : 25 le 18
août : 3 le 12, 2 le 28
décembre : 30 le 20

Quend/Fort-Mahon
janvier : 7 le 8, 90 le 24
février : aucun individu noté
mars : 7 le 31
avril : 30 gagnant la baie de Somme le 10
mai : 5 le 1er
juin : 85 le 31
juillet : 1 le 12, 5 le 26
août : 14 le 3
novembre : 20 le 6
décembre : 16 le 23

Nidification
Le seul site où la nidification ait été prouvée est constitué par le POM et ses abords immédiats mais la nidification est suspectée à Noyelles-sur-Mer/Boismont, au HA et possible en BdA (bas-champs). Les principaux événements enregistrés sont les suivants :
mars : 1 couple parade le 28 à la Maye
avril : 1 " " le 26 au HA
1 accouplement les 4 et 29 au POM
mai : les couples sont bien cantonnés ; 8 le 4 au POM, 1 le 6 à Noyelles-sur-Mer/Boismont, 1 près du POM le 28
juin : 1 couple alarme au HA
2 pulli le 17 et 4 le 25 au POM
juillet : 1 ad./2 pulli et 1 ad./1 pullus le 8 au POM, 1 juv. non volant et 2 pulli le 2.

VANNEAU HUPPE Vanellus vanellus
Les mouvements automnaux et hivernaux de ce Limicole continental sont extrémement sujets aux conditions climatiques et en particulier au gel : mouvements de fuite vers le sud suivis en cas de redoux, éventuellement au sein de la même semaine, de mouvements de remontée.
Cette année, des mouvements vers le sud sont notés en janvier et février : 35 en vol vers le sud-ouest le 13 janvier à Amiens, 95 en vol vers le sud-ouest le 15 février au HA.
En mars, on assiste en revanche à une remontée très nette : 60 en vol vers le nord à Velennes le 1er, 260 en vol vers le nord le 1er à Amiens, 30 en vol vers le nord le 11 à Velennes, 150 en vol vers le nord le 12 à Frémontiers.

Nidification
Dès cette époque, les parades de nicheurs locaux, dont les premières manifestations avaient été notées le 25 février à la Maye (P. ROYER et O. HERNANDEZ), se généralisent : les 3 et 13 mars, elles sont observées respectivement à Boismont et Rue. Le 25, elles sont notées dans les dunes du Marquenterre ; en RBdS-POM, à Quend-Plage et Cayeux-sur-Mer. Le 28, 2 nids sont repérés dans les prés humides de la Maye (P. RAEVEL). La période de nidification est alors bien en cours et l'on peut finalement compter en :

avril : 2 couvées écloses le 18 à Saint-Quentin-en-Tourmont, 1 ad./2 pulli et 1 ad./1 nid le 26 au POM

mai : 1 nid/4 oeufs le 2 à la renclôture Elluin de Noyelles-sur-Mer où le 15 environ 15 couples sont cantonnés (O. HERNANDEZ et T. RIGAUX)
14 ad./4 pulli le 6 au POM

juin : 9 ad. 1 juv. 9 pulli le 15 au POM, 18 ad. et juv. volants ainsi qu'1 juv. non volant et 7 pulli le 24
18 ad. et 2 pulli le 5 au HA, 1 ad./3 pulli...le 27

Migration postnuptiale
Dès le mois de juin, d'abondants mouvements vers les sud, qu'avaient devancés 15 oiseaux le 30 mai au POM, sont observés sur l'ensemble du département :
30 en vol vers le sud-ouest à Lamotte-Brebière le 10, 20 en vol vers le sud à Camon le 13, 30 en vol vers le sud à Mouflers et 40 en vol vers le sud-ouest à Fransu le même jour.
A Airaines, localité de l'intérieur où la dernière observation "hivernale" avait été effectuée le 6 avril (6 individus), le retour est noté le 10 juin.
A Neuville-les-Loeuilly, 100 individus stationnent les 4 et 10.
Au Crotoy, 50 le 17.
Le passage postnuptial se poursuit en juillet alors que 13 ad. et juv. volants accompagnés de 3 pulli sont présents le 12 au POM :
105 en vol vers le sud-ouest le 6 et 73 migrateurs le 31.

août : 18 en vol vers le sud le 31 en RBdS, 40 migrateurs le 2 au POM

octobre : 32 le 5 au POM, 103 le 12 et 18 le 24
20 le 27 en RBdS
toutes ces données concernent des migrateurs.

novembre : 94 migrateurs le 6 au POM, 30 en vol vers le sud le 15 en RBdS, 4 en vol vers le sud-sud-est le 23 à Noyelles-sur-Mer.

décembre : le passage est alors intense.
le 11, 95 au POM, 75 en vol vers l'ouest à Saint-Valery-sur-Somme
le 12, 250 en vol vers le sud en 3 h 30 en RBdS, 270 en vol vers le sud à Ailly-le-Haut-Clocher, 3000 en migration en 3 h à Abbeville
le 16, 712 en 1 h 30 à Abbeville (migration toute la journée)
le 19, 200 en vol vers le sud en RBdS
le 20, 20 en vol vers le sud en BdA
le 21, 450 en vol vers le sud à Cayeux-sur-Mer (Le Hourdel) et 1500 en vol vers le sud au HA, soit près de 2000 en quelques heures
le 24, 50 en vol vers le sud en RBdS.


Stationnements
Parallèlement aux mouvements importants retracés ci-dessus, on peut assister à des stationnements conséquents dans les cultures et les prés de l'intérieur de janvier à mars puis à partir de juillet.

janvier : 280 le 5 à Talmas, 150 le 25 à Abbeville
février : des bandes d'environ 50 individus à Airaines pendant tout le mois, 130 le 7 à Saint-Riquier
mars : 150 le 5 à Saint-Quentin-en-Tourmont, 40 à Bellancourt et à Flixecourt le 6, 50 à Beauval le 11, min. 50 le 14 à Candas
juillet : 50 le 8 au POM, 25 le 19 à Bergicourt, le 23 plus de 30 à Vignacourt et de 50 à Saint-Vast-en-Chaussée
septembre: 150 le 2 à Grand-Laviers
octobre : 10 le 23 à Forest-Montiers, min. 150 le 23 à Abbeville
novembre : pendant tout le mois, 250 à 300 à la cote 102 d'Amiens/Saint-Fuscien
le 14, 100 à Rue, 100 à Bellancourt, 100 à Ailly-le-Haut-Clocher, 120 à Saint-Vast-en-Chaussée, 360 à Daours/Bussy-les-Daours
décembre : le 12, 350 à Forest-Montiers, 400 à Ailly-le-Haut-Clocher, 200 à Gorenflos
le 23, 48 à Rue

PLUVIER DORE Pluvialis apricaria
Noté aux deux passages surtout sur le littoral.
Passage prénuptial
Une observation d'un individu le 12 février au Crotoy lui est peut-être attribuable.

mars : 120 le 14 à Candas, 1500 à 1600 venant du sud se posent en RBdS le 25 (P. RAEVEL et G. FLOHART)
avril : 1 le 4 en RBdS, 390 le 12 à Boismont, 63 le 14 à Port-le-Grand, 2 le 18 en BdA, 500 le 20 en RBdS (P. RAEVEL)

Passage postnuptial
juillet : 2 dont 1 ad. de la forme du sud le 16 au POM, 1 le 20 en RBdS, 3 le 23 au POM
août : 1 les 14, 17 et 18 en RBdS, 2 le 31
1 du 29 juillet au 31 août au POM
septembre: 9 le 8 à Thennes (seule observation postnuptiale continentale communiquée cette année !)
1 le 8 en RBdS, 1 le 10 à Ponthoile (Morlay)
5 migrateurs le 27 au POM
octobre : 31 le 22 à Abbeville, 1 migrateur le 24 au POM
décembre (mouvements) : 25 le 10 à Abbeville, 1100 le 12 en 3 h, 3 le 16
20 en vol vers le sud le 19 en RBdS, 70 en vol vers le sud le 21 à Cayeux-sur-Mer (Le Hourdel), 9 en vol vers le sud le 29 au POM, 3 en vol vers le sud le 30 à Quend-Plage
(stationnements) : 160 le 12 dans les prés de la Maye, 20 le 21 au HA, 12 le 22 en RBdS, 17 le 23 à Rue, 1 au HA et 5 au Crotoy (Saint-Firmin) le 30.



Effectifs de l'Huîtrier-pie en baie de Somme.

complément : 3000 le 9 février en baie de Somme.


Autres données concernant le Pluvier doré :
1 le 4 avril à Noyelles-sur-Mer
130 le 4 septembre en RBdS (P. RAEVEL), encore beaucoup d'oiseaux en plumage nuptial ou en mue
5 le 8 novembre à la Maye


PLUVIER ARGENTE Pluvialis squatarola
Noté toute l'année sur le littoral avec un maximum lors des deux passages. Le passage postnuptial s'étend d'août à décembre et les effectifs, importants donc en début d'hiver, s'effritent par la suite.

janvier : 100 le 24 en RBdS
février : 30 le 9, 15 le 17, min. 50 le 23, tous en RBdS
mars : 3 le 25 en RBdS, 1 le 31 au HA
avril : 30 le 8, 15 le 19 et 30 le 21 en RBdS
respectivement 7 et 8 les 7 et 9 en BdA
7 (dont 4 en vol vers le nord) le 25 au HA
mai : 50 le 2 en RBdS, min. 40 (dont 30 migrateurs) le 7 au POM, min. 462 (dont 112 en vol vers le nord-est) le 8 en RBdS/POM, 46 (dont 12 en vol vers le nord-est) le 10 au POM, 60 migrateurs le 11 au POM et encore 43 migrateurs le 31 au même endroit
juin : 1 le 6 au POM, 2 le 17 en RBdS
juillet : 4 le 8 au POM, 1 ad. en plumage nuptial le 12, 2 les 27 et 31
août : 30 le 3 en RBdS, 100 le 13, 185 le 18, 222 le 19, 205 le 28 et 150 le 31
1 les 12 et 19 en BdA
septembre : 130 le 8 en RBdS/POM, 350 le 15, 180 le 27
octobre : 23 le 3 en RBdS/POM, 180 le 17 et 390 le 30
20 le 28 et 8 le 29 en BdA
8 le 26 à Fort-Mahon et 8 le 18 à Quend
novembre : 48 le 1er en RBdS/POM, min. 350 le 15, 200 les 29 et 30
5 le 6 à Quend-Plage
décembre : 66 le 11 en RBdS/POM, 120 le 24, 300 le 28, 250 le 30
15 le 3 à Quend-Plage, 6 le 20 en BdA, 9 (dont 2 en vol vers le sud) le 30, 15 le 31 à Quend/Fort-Mahon, 35 le 6 à Cayeux-sur-Mer (Le Hourdel).

GRAND GRAVELOT Charadrius hiaticula
Trois observations hivernales sont à remarquer : 1 les 22 janvier et 9 février, 2 le 30 décembre en RBdS.
Premiers migrateurs : 3 le 1er mars à Noyelles-sur-Mer.
Stationnements en RBdS/POM

mars : 48 le 11, 250 le 22
avril : 270 le 21
mai : 138 le 8, 26 le 22, 100 le 31
juin : 15 le 6, 5 le 13, 1 ad. le 21
juillet : 4 le 3, 27 le 20, min. 42 le 22
août : min. 150 le 3, 900 le 18, 1100 le 31
septembre : 1200 le 2, 595 le 17, min. 100 le 27
octobre : 15 le 3, 130 le 17, 17 le 30
novembre : 1 le 1er, 2 le 8, 5 le 15





Effectifs du Pluvier argenté en baie de Somme
et au Parc Ornithologique du Marquenterre.



Effectifs du Grand Gravelot en baie de Somme et au Parc Ornithologique du Marquenterre.

Stationnements en BdA
avril : 30 les 12 et 13
mai : 2 le 15
août : 12 le 12, 15 le 16, 40 le 21, 140 le 28, +300 le 29
septembre : +150 le 3
octobre : 25 le 29
HA : 32 le 10 mars, 2 le 31, 2 le 5 avril, 10 le 25, 5 le 2 mai, 1 couple alarme le 22 juin (nidification possible donc), 8 le 29 juillet, 3 le 4 et 8 le 28 août, 4 le 20 septembre.
11 le 2 novembre à Cayeux-sur-Mer (Le Hourdel).
A l'intérieur des terres :
2 le 11 et 1 le 18 mai à Roye, 1 le 20 juin à Bergicourt.

PETIT GRAVELOT Charadrius dubius
Première observation le 31 mars : 1 individu au POM ; dernière le 17 octobre : 1 individu au POM. Entre ces deux dates extrêmes, les observations sont assez fréquentes : certaines sont attribuables à des migrateurs de passage, d'autres à des nicheurs ou éventuellement à des estivants non nicheurs peu nombreux.

avril : 1 le 2, 2 le 9 et les 12 et 19 au POM
2 paradent les 5 et 9 au HA, 4 couples sont notés le 12 en cette localité où s'installera définitivement un minimum de 2 à 3 couples nicheurs ;
1 le 4 en BdA, 1 le 4 et 2 le 6 à Rue, 2 couples le 13 au Crotoy, 4 individus le 20 en RBdS, 4 le 29 à Roye, 2 le 30 à Fouencamps

mai : 2 paradent du 1er au 25 au POM, 3 y sont observés le 29
1 couple nicheur le 3 au Crotoy, 1 individu le 8 en RBdS, 3 le 11 à Roye, 1 le 12 à Boves, 4 le 13 à Rue, 1 le 17 à Fouencamps (Le Paraclet), 4 couples le 22 au HA

juin : 2 individus le 7 au POM, 6 le 10 au marais de Rue, 1 couple le 11 à Roye, 1 couple/2 juv. le 17 au HA, 1 individu le 22 au POM, 1 ad./2 pulli et 1 juv. le 22 à Fossemanant, 2 le 24 à Boves


juillet : 3 les 14, 15 et 25 ainsi que 7 le 30 au POM, 2 le 8 au HA, 1 le 20 en RBdS

août : 2 individus du 6 au 12 au POM, 7 dont 1 juv. le 14, 2 du 24 au 30
1, 2 et 3 respectivement les 4, 8 et 26 au HA
1 le 18 en RBdS, 1 le 27 à Rue, 3 le 31 en RBdS

septembre : 2 le 6, 3 les 8 et 10 au POM ; 3 le 10 à Rue, 15 le 28 au HA

octobre : 2 le 1er à Abbeville.

GRAVELOT A COLLIER INTERROMPU Charadrius alexandrinus
Contrairement aux deux espèces précédentes, mise à part la mention de 2 individus le 26 juillet à Rue, localité d'ailleurs peu éloignée de la côte, il n'a été rencontré que sur le littoral dont il fréquente surtout les étendues sablonneuses à sablo-vaseuses.
Comme le Petit Gravelot Charadrius dubius, son retour printanier a été noté en mars (100 le 25 en RBdS) tandis que les dernières observations ont été faites en octobre (9 le 30 au POM).



Effectifs du Gravelot à collier interrompu en baie de Somme et au Parc Ornithologique du Marquenterre.

mars : 100 le 25 en RBdS, 1 mâle 1 femelle les 28 et 29 au POM, 2 (dont 1 mâle) le 31 au HA

avril : 39 le 4 en RBdS, 4 en vol vers le nord le 5 à Fort-Mahon, 540 le 5 en RBdS, 16 le 6 en BdA, 4 le 7 au POM où est noté un accouplement ; 10 le 12, 6 le 13 et 15 le 22 en BdA ; 17 à 21 le 16 en RBdS/POM, 120 le 21 en RBdS, 9 (1 nid est "construit") le 26 au POM, 1 couple le 28 au HA.

mai : 60 le 2 en RBdS (2 nids sont alors notés au POM), 25 le 8 en RBdS/POM dont 3 couples installés au POM ; le 15, ce sont 4 couples dont 1 avec 3 pulli qui y sont notés ; les 21 et 24, on y relève 5 couples et le 26, 3 couples/pulli ; 1 individu le 31 au HA.


juin : 3 juv. volants le 13 au POM, min. 11 ad./6 pulli le 14, 10 ad. 2 juv. non volants et 14 pulli le 28
10 ébauches de nids et 1 nid trouvé détruit par un véhicule le 7, 7 nids/3 oeufs le 16, min. 12 ad. 2 pulli et 6 nids/oeufs le 30
2 couples le 22 au HA

juillet : 5 ad. 4 pulli le 2 au POM, 4 ad. 5 pulli le 5, 44 ad. et juv. volants ainsi que 2 pulli le 19 ; 150 le 20 en RBdS/POM, les 20 et 21 sont trouvés 10 couples nicheurs à l'anse Bidard et 6 au banc de l'Ilette.

août : 300 le 3 en RBdS/POM, 150 le 18, 120 le 30
4 le 16 en BdA, 3 le 28
septembre : 200 le 2 en RBdS, 105 le 17, 80 le 27
octobre : 1 le 29 en BdA, 9 (dont 1 oiseau de 1ère année) le 30 au POM.

PLUVIER GUIGNARD Eudromias morinellus
Ce Limicole rare sur nos côtes a été rencontré par deux fois lors des deux passages :
- prénuptial : 2 le 19 avril au HA (G. DELVOYE, A. et M.H. GERVAIS, M. HULLE et I. VERIERE)
- postnuptial : 1 le 28 août en RBdS parmi les Bécasseaux et Gravelots (G. FLOHART et B. TAILLEZ).

TOURNEPIERRE A COLLIER Arenaria interpres
Cette année, 3 observations hivernales : 1 le 23 décembre et 2 le 30 à Quend-Plage, 2 le 30 en RBdS, toutes en décembre donc. Toutefois, seuls les passages pré et postnuptiaux sont l'occasion d'observations abondantes. A noter, une observation continentale lors du passage prénuptial : 1 le 6 mai à Estrèes-Mons.
avril : 1 le 7 en BdA, 10 le 11 en RBdS, 1 le 13 en BdA, 2 le 17 au HA, 9 le 20 au Crotoy, 30 le 20 en RBdS, 23 en vol vers le nord le 22 en RBdS nord, 10 le 25 au HA, 3 le 26 au POM, 2 le 30 au Crotoy.
mai : 1 le 2 au HA, 8 le 2 en RBdS, 1 le 6 à Estrèes-Mons, 20 le 8 au POM, 2 le 15 au POM, 4 le 16 au Crotoy.
juin : 1 ad. en plumage nuptial les 19 et 20 au POM, min. 6 le 24.
août : 56 le 2 au POM, 50 le 3 en RBdS ; 3 le 18 au POM, 5 le 19, 9 le 20 et 10 le 22 ; 4 le 28 et 6 le 31 en RBdS.
septembre : 4 le 4 au POM
4 le 15 en RBdS, 1 les 17 et 27.



Effectifs du Tournepierre à collier sur le Littoral picard.

BECASSINE DES MARAIS Gallinago gallinago
Notée toute l'année, surtout sur le littoral (abondance de zones humides et d'observateurs), avec un maximum en août-septembre (ainsi qu'en avril, dans une moindre mesure toutefois car une seule observation est conséquente) et un minimum en mai-juin-juillet.

janvier : 1 le 1er à Tilloy-les-Conty, 5 le 18 et 2 le 31 ; 1 le 4 et 3 le 18 à Poix ; 3 le 23 au HA, 1 le 6 à Cayeux-sur-Mer, 1 le 24 au Crotoy, 1 le 30 au POM.

février : 5 le 1er à Poix, 8 le 22 et 3 le 25 ; 4 le 19 à Tilloy-les-Conty et 20 le 9 à la Maye.

mars : 1 le 1er et 3 le 3 à Tilloy-les-Conty, 3 le 1er et 4 le 15 à Poix, 31 le 8 à Boismont, 1 le 15 au HA, 1 les 5 et 20 au POM, 2 le 21 à Noyelles-sur-Mer.

avril : 2 le 9 ainsi que 1 les 19 et 27 au POM, 3 le 1er et 1 le 6 à Tilloy-les-Conty, plusieurs dizaines le 5 à Noyelles-sur-Mer (bêlements entendus avant le lever du jour), 3 le 4 et 25 le 14 en BdA, 1 le 18 à Poix, 1 le 16 à Saint-Quentin-en-Tourmont, 1 les 9 et 20 au HA, 1 le 6 à Rue, 4 le 19 à Noyelles-sur-Mer.

mai : 1 le 6 au HA.

juin : 1 le 30 au POM.

juillet : 1 le 8 au HA, 1 du 8 au 22 et 5 le 31 au POM.

août : 7 les 2 et 8 au POM, 15 le 14 et 16 le 31 ; 4 le 11 et 8 le 27 à Rue ; 1 le 13 en RBdS, 7 le 17, 2 les 28 et 31 ; 6 en vol vers le sud le 28 en BdA, 1 le 17 à Abbeville.

septembre : 4 le 2 en RBdS, 6 le 10 à Rue ; 8 le 6 au POM, 15 le 9, min. 21 le 12 et 4 du 19 au 28.

octobre : 7 le 10 au POM, 12 le 18 et 8 le 21 ; 4 le 2 au HA.

novembre : 1 en vol vers le sud le 4 à Amiens (Cité scolaire), 1 le 6 en RBdS, 1 le 9 à Abbeville, 2 (dont 1 en migration) le 6 et 3 le 12 au POM ; 5 le 30 à Noyelles-sur-Mer.

décembre : 1 les 1er et 9 au POM, 1 le 15 et 2 le 19 au HA ; 2 le 12 en RBdS, 2 le 19 et 3 le 28 ; 1 le 18 à Saint-Quentin-en-Tourmont, 1 le 20 en BdA, 2 le 21 à Saint-Valery-sur-Somme et 15 le 30 au bassin de chasse du Crotoy.

Notée régulièrement dans la vallée de la Bouvaque (Abbeville et Drucat) sauf du 20 mars au 17 août, max. 7 le 22 octobre.

BECASSINE SOURDE Lymnocryptes minimus
1 le 12 février au POM.

BECASSE DES BOIS Scolopax rusticola

janvier : 1 le 2 en forêt de Crécy et 2 le 26, 2 le 12 au POM, 8 tuées le 17 dans les dunes du Marquenterre (Saint-Quentin-en-Tourmont) ainsi que 1 les 25 et 26.

février : 1 les 13 et 24 au POM.

mars : 1 le 4 à Conty (bois de Wailly).
mai : 1 le 6 au POM.
Espèce absente en été.
octobre : 1 le 11 dans les dunes du Marquenterre (Saint-Quentin-en-Tourmont), 2 le 16 et 3 le 26 ; 2 le 18 et 5 le 26 au Crotoy, 1 le 24 à Boves (Fau Timon).
novembre : 3 tuées le 8 au Crotoy.
décembre : 2 le 18 et 1 le 30 à Saint-Quentin-en-Tourmont, 1 le 17 à Abbeville (posée dans un jardin).

COURLIS CENDRE Numenius arquata

Les effectifs de cet oiseau ont été minimaux en mai-juin, comme d'habitude, mais ils sont restés toujours relativement élevés.

Sur le littoral : BdS/POM

janvier : min. 1000 le 14, 1200 le 22.
février : 700 à 800 le 9, 840 le 17, 750 le 25.
mars : 600 le 15, 750 le 25.
avril : 600 du 5 au 7, 480 le 16, 310 le 21.
mai : 200 le 10, 196 le 20, 162 le 24 (dont environ 60 migrateurs).
juin : 91 les 1er et 4, 142 le 11, min. 220 le 30.
juillet : min. 220 le 3, 290 le 20, min. 360 le 23.
août : 850 le 3, 1000 les 18 et 19, 1400 le 27.
septembre : 960 le 2, min. 720 le 17, plus de 600 le 27.
octobre : 535 le 2, min. 400 le 13, 1220 le 30.
novembre : 1550 le 16, 900 le 30.
décembre : 900 le 5, 930 le 11, 1200 le 28.

Des migrations actives sont notées lors du passage prénuptial, débutées en mars (mouvements notés le 24 en BdS, 12 en vol vers le nord le 25 en RBdS), elles s'intensifient pour battre leur plein dans la 3ème décade d'avril, période pendant laquelle les effectifs stationnant en BdS fondent littéralement.


avril : 8 en vol vers le nord à Ault, passage nocturne dans la nuit du 20 au 21 en BdS, 40 en vol vers le nord-est le 20 au POM, 42 en vol vers le nord le 22 en RBdS nord, 179 migrateurs le 24 au POM, 1 en vol vers le nord-est le 26 à Saint-Quentin-en-Tourmont.
mai : encore 60 migrateurs le 24 au POM.

BdA : les effectifs observés restent toujours extrêmement modestes en comparaison des potentialités d'accueil probables de la baie.

février : 17 le 15, 20 le 21.
avril : 5 le 18.
août : 4 en vol vers le sud le 28.
décembre : 12 le 23.

HA : l'espèce y est pratiquement observée toute l'année mais en très petit nombre.

janvier : 1 le 23.
février : 1 le 29.
avril : 1 le 9, 2 les 17 et 25.
mai : 1 le 6.
juillet : 2 le 29.
septembre : 1 le 6.



Effectifs du Courlis cendré en baie de Somme et au Parc Ornithologique du Marquenterre.

octobre : 2 le 18.
décembre : 40 en migration le 27, 3 les 28 et 30.

Quend-Plage/Fort-Mahon : des oiseaux isolés ou de petits groupes y sont observés en janvier, mai, août, novembre et décembre.

janvier : 6 le 8, 2 le 24.
mai : 3 le 2.
août : 2 le 13, 13 le 24, 1 en vol vers le sud le 30.
novembre : 3 le 6.
décembre : 5 en vol vers le sud le 23, 30 en vol vers le sud le 30.

Sur cette plage peu propice à leur stationnement, beaucoup y sont donc observés en mouvement.

A l'intérieur des terres

Les observations sont exclusivement hivernales et automnales.

janvier : 1 le 5 à Fouencamps.
septembre : 2 en vol vers le sud-ouest le 17 à Abbeville.
novembre : 1 en vol vers le sud-ouest le 5 à Abbeville.
décembre : 1 le 12 à Amiens et 1 migrateur à Abbeville ainsi que 19 le 16, 3 en vol vers le sud-est à Amiens (Cité scolaire), espèce notée le 25 à Domart-en-Ponthieu et le 31 à Forest-Montiers.

COURLIS CORLIEU Numenius phaeopus

Surtout abondant en avril et en juillet-août, il a pu être observé en quantité importante. L'observation printanière la plus précoce a été réalisée en RBdS (15 le 25 mars), la plus tardive au POM (1 le 1er novembre).

RBdS/POM


mars : 15 le 25.
avril : 257 migrateurs le 10, 30 individus stationnent du 11 au 20, 150 le 21.
mai : 15 (dont 14 en vol vers le nord-est) le 10, min. 26 (dont min. 22 migrateurs) le 11, 9 le 27.
juin : 1 les 1er et 6, 3 le 13.
juillet : 14 le 5, 85 le 20, 140 le 24.
août : 250 le 4, 100 le 18, 450 le 21.
septembre : 25 le 2, min. 10 le 17.
octobre : 4 le 18.
novembre : 1 le 1er.

BdA


avril : 8 le 9, 20 le 15, plus de 120 le 18.
août : 12 le 12.

D'autres migrateurs que ceux signalés précédemment ont pu être observés toujours lors du passage prénuptial ;

avril : 16 migrateurs le 14 et 18 le 24 au POM, 9 en vol vers le nord-est le 14 à Rue, 30 en vol vers le nord en RBdS où se produit un passage nocturne dans la nuit du 20 au 21, 90 en vol vers le nord le 21 toujours en RBdS ; 27 en vol vers le nord le 14 et 35 en vol vers le nord le 15 au Crotoy ; 15 en vol vers le nord le 14 en BdA.
mai : migration nocturne le 3 à Rue.



Effectifs du Courlis corlieu en baie de Somme et au Parc Ornithologique du Marquenterre.



Effectifs de la Barge à queue noire sur le littoral picard.

BARGE A QUEUE NOIRE Limosa limosa

Comme d'habitude, elle n'a fait l'objet que de peu d'observations hivernales (une seule cette année : 1 le 9 février en RBdS) et ne s'est toujours montrée qu'en petit nombre, même en avril et juillet-août.

mars : 7 le 8 à Boismont et 46 le 29, 1 le 27 au POM.

avril : 11 le 4 en RBdS et 34 migratrices à Noyelles-sur-Mer ainsi que 12 migratrices à Rue, 13 le 5 en BdA, 8 le 7 au POM, 2 le 9 au HA, 2 le 12 au POM et 68 à Boismont ainsi que 14 au HA, 4 le 14 en BdA, 5 le 17 au HA et 9 à Noyelles-sur-Mer/Boismont, 1 le 19 au HA, 1 du 18 au 26 au POM, 2 dans un pré humide de la Maye les 20 et 21, 6 le 21 en RBdS et 17 en vol vers le nord le 22 en RBdS nord (moyenne horaire : 6 individus).

mai : 5 le 2 au POM, 1 le 18, 2 les 22 et 30 ; 4 le 22 en RBdS, 2 le 27 au HA.

juillet : 4 le 8 au HA ; 3 du 10 au 18 au POM, 11 le 19, 15 le 20, 5 les 29 et 31.

août : 6 le 2 au POM, 2 le 14, 5 le 16, 4 les 22 et 23 ; 3 le 19 et 1 le 22 en RBdS, 3 le 14 au HA.

septembre : 15 le 4 en RBdS ; 4 les 6 et 8 au POM, 6 le 17, 2 les 21 et 28.

octobre : 4 le 2 au POM, 2 le 18, 1 du 25 au 28.

novembre : 2 le 12 au POM.

BARGE ROUSSE Limosa lapponica


Cet oiseau littoral a été noté à l'intérieur des terres le 19 septembre à Corbie (1 individu) et le 6 mai à Estrées-Mons (2 individus). Cette dernière observation est attribuable au passage prénuptial qui a pris un aspect assez spectaculaire sur la côte au cours de la 3ème décade d'avril. En dehors du passage pré-nuptial, les effectifs observés restent en revanche très modestes.

février : 16 le 9 en RBdS/POM, 1 le 28 au HA.

mars : 6 le 22 et 20 le 25 (plumage nuptial) en RBdS.

avril : la première décade est calme et le passage, qui s'intensifie au cours de la décade suivante, n'atteint son paroxysme qu'aux environs du 25.
10 le 4 en BdS/POM, 107 le 19, 11 (dont 4 en vol vers le nord) le 21, min. 770 en vol vers le nord et le nord-est entre 12 h et 15 h TU le 25, min. 30 le 30 ;
2 le 11 au HA, 22 le 20, 1870 en vol vers le nord en 2 h le 25 (moyenne horaire : 935 individus);
2 le 7 à Fort-Mahon/BdA, 7 en vol vers le nord le 13, 6 le 15.

mai : 2 le 6 à Estrées-Mons ;
1 les 2, 10, 22 et 31 au HA ;
35, 75 et 33 respectivement les 1er, 2 et 3 à Quend-Plage.
De tels chiffres, de plusieurs dizaines d'individus en cet endroit peu favorable à l'espèce, laissent supposer une poursuite assez intense du passage. Des observations faites parallèlement en BdS le confirment.



Effectifs de la Barge rousse sur le littoral picard.

600 le 2 en RBdS/POM, 405 (dont des migrateurs actifs) le 5, 30 migrateurs le 11, 16 (dont 11 migrateurs) le 24.

juin : les derniers signes d'une migration active sont notés le 1er avec 16 individus en vol vers le nord-est au POM ; ne sont plus observés en RBdS et au POM les 14 et 25 que 10 et 3 individus.

juillet : 1 les 5 et 16 au POM.

août : les effectifs augmentent à nouveau suite au passage postnuptial ; 25 le 3 en RBdS/POM, 25 à 37 le 19, 13 le 31.

septembre : 14 le 8 en RBdS/POM, min. 37 le 17, 20 le 27 ; 1 en vol vers le sud le 19 à Corbie.

octobre : 1 le 14 au POM, 4 le 30 en RBdS.

novembre : aucune donnée n'est parvenue.

décembre : 2 en vol vers le sud le 20 en BdA, 3 le 15 et 70 le 28 en RBdS.

CHEVALIER ARLEQUIN Tringa erythropus

Le premier est noté le 21 mars au HA, le dernier le 11 décembre en RBdS. La plupart des observations se rapportent aux mois d'avril et d'août-septembre. Les groupes réunissant plusieurs dizaines d'oiseaux sont exceptionnels.

mars : 1 le 21 au HA, 2 le 29 au POM, 1 le 31 à Quend-Plage.

avril : les observations sont nombreuses dans la deuxième partie du mois et l'une d'elles est continentale (4 le 29 à Roye sur un bassin de décantation) ; 1 les 7 et 19 au POM, 5 le 20, 1 du 26 au 30 ; 5 les 14 et 18 en BdA, 45 le 21 en RBdS, 7 migrateurs en 3 heures le 22 en RBdS nord , 1 au HA et 2 à Noyelles-sur-Mer/Boismont le 28.

mai : 6 le 2 à Noyelles-sur-Mer ; 2 le 3 et 1 les 10 et 13 au HA ; 1 du 1er au 10 et 2 le 27 au POM ; 1 le 9 au Crotoy.

juin : 1 le 17 au HA et 1 le 30 au POM.

juillet : 1 le 2 au POM, 5 les 12 et 20, 2 le 24 et 1 le 26.

août : 1 le 2 au POM, 10 le 5, 3 les 13 et 16, 3 le 18, 4 le 19, 5 du 22 au 29 ; 1 le 28 en BdA.

septembre : 1 du 4 au 7 au POM, 8 le 12, 32 le 18, 5 le 21 ; 4 le 8 en RBdS.

octobre : 1 les 2 et 17 au POM.

novembre : 1 le 5 au HA, 3 le 15 en RBdS.

décembre : 1 le 11 en RBdS.

CHEVALIER GAMBETTE Tringa totanus


C'est, parmi les Chevaliers, l'espèce qui se montre le plus en grand nombre. Les bandes les plus conséquentes sont rencontrées lors du passage prénuptial, en avril-mai. A noter, cette année, une abondance relativement exceptionnelle fin décembre.

Sur le littoral en RBdS et au POM


janvier : 45 le 9, 50 le 24.

février : 52 le 9, 28 le 19, 35 le 25.

mars : 25 du 5 au 10, 20 le 17, min. 30 (dont 11 migrateurs) le 24.



Effectifs du Chevalier arlequin sur le littoral picard.



Effectifs du Chevalier gambette en baie de Somme et au Parc Ornithologique du Marquenterre.

avril : min. 84 migrateurs le 10, min. 500 le 11 (A.P.O.), 430 le 21.
mai : min. 215 (dont 40 en vol vers le nord-est) le 8, 65 en vol vers l'est-nord-est le 12, 34 migrateurs le 31.
juin : 49 en vol vers le nord le 6, 1 du 14 au 20, 46 le 21.
juillet : min. 121 le 5, 110 le 18, 115 le 22.
août : min. 130 le 3, 50 du 16 au 20, 89 le 27.
septembre : 57 le 6, 58 le 12, 20 le 27.
octobre : 12 le 3, 32 le 17, 8 le 27.
novembre : 5 le 1er, 56 le 12, 32 le 24.
décembre : 7 le 5, 29 le 11, 130 le 30.

BdA
avril : 70 le 5, 50 le 15, + 150 le 18.
août : 4 le 12.

HA
mars : 1 le 29.
avril : 25 le 9, 24 le 17, 5 le 25.
mai : 30 le 2, 3 le 13, 10 les 22 et 31.
juin : 9 le 3, 2 le 17, 20 le 22.
juillet : 42 le 8, 1 le 29.
août : 1 le 4, 8 le 14.

Noyelles-sur-Mer/Boismont
mars : 1 le 29.
avril : 2 le 17, 11 le 25.
mai : 12 le 2, 4 le 6.

Rue (marais)
avril : 20 le 4.

En plus des migrateurs déjà signalés, d'autres passages sont remarqués surtout en avril-mai.
avril : 4 en vol vers le nord le 13 à Fort-Mahon, passages nocturnes au cours des nuits du 20 au 21 et du 21 au 22 en RBdS.
mai : 40 migrateurs le 7 au POM.
août : 3 en vol vers le sud le 16 en BdA.

Nidification
Aucune preuve de nidification. Seuls des chants (2 à 3 chanteurs le 23 mars à Saint-Quentin-en-Tourmont/Le Crotoy) et des parades (4 individus paradent le 28 mars dans les prés humides de la Maye) sont observés mais ne constituent en rien des preuves de nidification certaine. Malgrè tout, celle-ci est à rechercher activement, dans les bas-champs de la BdA en particulier.

A l'intérieur, toutes les observations (à l'exception d'une seule : 1 individu le 21 juillet à Abbeville) sont faites lors de la remontée.
avril : 7 le 29 à Roye.
mai : 6 à Estrèes-Mons et 3 en vol vers le nord à Cléry-sur-Somme le 6, 1 le 11 à Roye, 1 le 17 à Fouencamps (Le Paraclet), 1 le 20 à Estrèes-Mons.
juin : 6 le 11 à Roye.


CHEVALIER ABOYEUR Tringa nebularia
Les premiers oiseaux observés le sont le 25 mars : 2 ou 3 en RBdS ; les derniers le 18 octobre : 3 au POM. La dissymétrie entre les passages pré et postnuptiaux est moins grande que

chez le Chevalier gambette Tringa totanus : certes plus étalé dans le temps que le passage prénuptial comme chez le Chevalier gambette, le passage postnuptial réunit souvent les oiseaux en des bandes à peu près aussi importantes que celles observées lors de la remontée.

Sur le littoral en RBdS et au POM

mars	: 2 ou 3 le 25.
avril	: 1 le 5, 3 le 14, 5 (dont 2 en vol vers le nord) le 21.
mai	: 6 (dont 2 migrateurs) le 10, 144 en vol vers le nord-nord-est le 12, 1 du 22 au 30.
juin	: 2 le 5, 1 du 7 au 25.
juillet	: 8 le 5, 52 le 19, 110 le 22.
août	: 15 le 7, 15 le 16, 24 le 29.
septembre	: 8 le 6, 14 le 12, 2 les 21 et 28.
octobre	: 1 le 2, 3 le 18.

BdA : 15 le 18 avril.
HA : 1 le 25 avril, 2 le 2 mai, 1 les 10 et 22, 1 le 17 octobre, 1 le 22 décembre.
Des oiseaux sont aussi observés à Noyelles-sur-Mer/Boismont (3 le 25 avril, 3 le 2 mai, 2 le 6, 1 le 20 juillet), à Rue (1 le 2 août) et au Crotoy (5 le 3 mai, 2 le 5).
D'autres encore sont observés en migration : celle-ci est signalée le 6 juin au POM, 2 le 31 juillet et 1 le 6 août à Quend-Plage, 1 les 23 et 30 août à Fort-Mahon.
A l'intérieur, le Chevalier aboyeur est observé uniquement en mai et en une seule localité : 5 le 6 et 1 le 20 à Estrées-Mons.



Effectifs du Chevalier aboyeur en baie de Somme et au Parc Ornithologique du Marquenterre.

PETIT CHEVALIER A PATTES JAUNES Tringa flavipes
Une observation tout à fait exceptionnelle : 1 le 8 août au POM (P. BIET).

CHEVALIER CULBLANC Tringa ochropus

Observé en toutes saisons, toujours en petit nombre, aussi bien à l'intérieur des terres que sur le littoral.

janvier : 1 le 4 à Poix.
février : 1 les 1er et 22 à Poix, 1 le 23 en BdS (observé tout l'hiver).
mars : 1 le 15 à Poix, 1 le 28 au POM.
avril : 1 le 4 et du 15 au 25 au POM ; 1 les 10, 17 et 18 à Poix ; 1 les 5 et 15 en BdA, 1 le 5 à Bergicourt, 1 le 13 à Boves, 1 le 17 à Velennes, 1 le 23 à Amiens (marais du Bout du Monde), 1 le 27 à Estrèes-Mons ; 1 les 17, 23 et 24 à Abbeville.
juin : 1 le 10 à Estrèes-Mons, 1 le 20 à Bergicourt, 2 le 24 à Boves, 1 du 26 au 30 au POM.
juillet : 1 du 1er au 18 au POM, 2 le 19 et 4 le 30 ; 1 le 29 au HA.
août : 3 le 2 au POM, 1 du 12 au 24, 3 le 25 et 2 le 29 ; 1 le 11 à Rue, 1 le 17 à Abbeville.
septembre : 1 le 8 en RBdS, 2 le 11 au POM où une migration est notée le 27.
octobre : 1 le 1er à Abbeville.
décembre : 1 les 22 et 24 au POM, 2 le 30 en RBdS (la Maye).

CHEVALIER SYLVAIN Tringa glareola

Uniquement observé en août-septembre en RBdS et au POM.


août : 7 le 2 au POM, 2 du 9 au 16 et 2 le 29 ; 1 le 28 en RBdS.
septembre : 1 le 6 au POM.


CHEVALIER GUIGNETTE Tringa hypoleucos

A l'intérieur des terres, ce petit Chevalier est principalement abondant en avril-mai tandis que c'est fin juillet-début août que se situe le maximum d'abondance sur le littoral. Il est très peu noté en hiver et ceci alors seulement sur le littoral.

Sur le littoral

janvier : 1 le 1er à Saint-Quentin-en-Tourmont, 1 les 9 et 10 au HA.
mars : 1 le 25 en RBdS.
avril : 1 le 4 en RBdS, 1 les 12 et 14 au POM, 1 le 9 à Noyelles-sur-Mer, 1 le 11 au HA, 1 le 12 à Boismont, 2 le 14 à Port-le-Grand, 1 le 18 en BdA, 1 le 25 à Noyelles-sur-Mer/Boismont.
mai : 1 le 6 au HA, 3 le 10 et 1 le 13 ; min. 4 le 7 en RBdS/POM, 7 le 8, min. 5 du 11 au 13, 1 du 21 au 23 ; 1 les 4 et 13 à Rue, 1 le 3 au Crotoy.
juin : 1 le 16 au POM.
juillet : 6 les 20 et 29 ; 1 le 5 en RBdS/POM, 4 le 9, 7 le 16, 3 le 20, 15 les 24 et 30 ; 1 le 26 à Rue.
août : 7 le 4 au HA, 1 le 11, 2 les 22 et 27 ; 38 le 2 en RBdS/POM, 12 le 12 et 7 le 23.
septembre : 8 le 5 au POM, 6 le 12, 1 les 27 et 28 ; 5 le 10 à Ponthoile (Morlay).
octobre : 1 le 2 au HA, 1 le 27 en RBdS.


Effectifs du Chevalier guignette sur le littoral picard.
35
30
25
20
15
10
5
J
F
M
A
M
J
Jt
At
S
O
N
D


Effectifs du Bécasseau maubèche en baie de Somme et au Parc Ornithologique du Marquenterre.
300
200
100
J
F
M
A
M
J
Jt
At
S
O
N
D

décembre : 1 le 12 en RBdS, 2 le 12 au bassin de chasse du Crotoy, 1 le 21 au HA, 1 le 30 en RBdS (la Maye), 2 le 31 au bassin de chasse du Crotoy.

A l'intérieur

avril : 2 le 27 à Estrèes-Mons et 1 à Péronne, 1 le 29 à Roye, 2 le 30 à Amiens (Longpré) et 1 à Velennes.

mai : 1 le 4 à Estrèes-Mons ; 4 le 6 dans cette localité, 1 à Péronne, 1 à Cléry-sur-Somme et 2 à Frise ; 4 ou 5 entre Fontaine-sur-Somme et Long le 10 ; 6 le 11 à Roye, 1 à Biaches et 3 à Amiens (marais du Bout du Monde) ; 1 le 12 à Boves et 1 à Abbeville, 2 le 13 à Amiens (Longpré), 1 le 17 à Fouencamps (Le Paraclet), 3 le 20 à Estrèes-Mons et 1 à Amiens (Longpré).

juin : 1 le 9 à Famechon.

juillet : 1 le 21 à Abbeville ; 1 le 26 à Saint-Sauveur, 1 à Argoeuves et 1 à Ailly-sur-Noye, 2 le 27 à Amiens (île Sainte-Aragonne)

août : 1 les 18, 22 et 24 à Abbeville.

septembre : 1 le 1er à Abbeville, 1 le 5 à Amiens (Hortillonages), 1 le 10 à Amiens (Longpré), 1 le 28 à Estrèes-Mons.

octobre : 1 le 8 à Abbeville.

BECASSEAU MAUBECHE Calidris canutus

Mise à part l'observation d'un individu le 17 mai à Fouencamps (Le Paraclet), cet oiseau est noté uniquement sur le littoral. Comme en 1980, aucune donnée ne met en évidence un hivernage digne de ce nom.

BdS/POM

mars : 4 le 25.
avril : 22 le 4, 4 le 19, 130 le 21.
mai : 152 le 8, 25 le 31.
juin : 264 le 2, 1 le 17.
juillet : 20 le 3.
août : 15 le 19, 185 le 31.
septembre : + 220 le 10, 50 le 15, 80 le 27.
octobre : 1 le 13, 12 le 27.
novembre : 8 le 15.
décembre : 2 le 28.

HA : 2 le 3 mai, 2 les 5 et 8 juin, 4 le 30, 1 le 6 septembre.
BdA : 2 le 28 août et le 20 décembre.


BECASSEAU MINUTE Calidris minuta

Les deux passages sont remarqués.


RBdS/POM

mars : 1 le 15.
avril : 25 le 21.
mai : 1 les 4 et 7, 76 le 8 (donnée exceptionnelle).
juillet : 1 le 12, 7 le 26.
août : 2 le 7, 16 le 16, 34 le 31.
septembre : 31 le 2, 34 le 12, 4 les 20 et 27.
octobre : 1 les 18 et 19.

HA : 2 le 17 juin, 2 le 29 juillet, 3 le 14 août, 2 le 20 septembre, 10 le 2 octobre.



Effectifs du Bécasseau variable en baie de Somme et au Parc Ornithologique du Marquenterre.



Effectifs du Bécasseau minute en baie de Somme et au Parc Ornithologique du Marquenterre.

BECASSEAU DE TEMMINCK Calidris temminckii
Uniquement observé au POM lors du passage postnuptial.
août : 2 le 14, 1 du 17 au 30.
septembre : 3 le 4, 1 les 6 et 7.

BECASSEAU VIOLET Calidris maritima
Une timide apparition lors de chacun des deux passages.
mai : 1 le 10 au Bois de Cise, commune d'Ault.
octobre : 1 le 28 en RBdA.

BECASSEAU VARIABLE Calidris alpina
Les comptages de cette espèce deviennent ardus au cours de la période hivernale par suite de la très grande taille des "essaims" alors observés. Dès que les marées sont trop faibles, les oiseaux deviennent trop distants ou dispersés pour être aisément comptabilisés. Malgré tout, nous avons pu rassembler les données suivantes qui montrent un net minimum d'abondance en juin.

RBdS/POM
janvier : 8000 à 10000 le 22.
février : 3500 à 4000 le 9, 4000 le 17, 3500 le 23.
mars : (410 le 11), 1500 le 25.
avril : (200 le 16), 500 le 21.
mai : 300 le 2, 30 le 30.
juin : 2 le 30.
juillet : min. 65 le 5, 200 le 19 (moins de 10 % d'adultes en plumage internuptial et de juvéniles), min. 230 le 22.
août : 400 le 3, + 300 le 18, 340 le 28.
septembre : 1500 le 4, 450 le 17, 600 le 27.
octobre : (65 le 17), 3400 le 31.
novembre : 142 le 1er, 5000 le 16, 3500 les 29 et 30.
décembre : 4200 le 11, + 10000 le 28.

BdA
février : 20 le 15, 160 le 21, 800 le 24.
avril : 320 le 9, 200 le 12, puis poursuite de la diminution progressive avec 150 le 13 et 100 le 15.
août : 6 le 16.
octobre : 120 le 29.
décembre : 120 le 20.

HA
mars : 6 les 3 et 10, 1 le 15.
avril : 20 le 9, 22 le 12, 10 le 25, 4 le 28.
mai : 5 le 3, 8 le 31.
juillet : 5 le 8.
août : 3 le 4.
septembre : 1 le 16, 20 le 20, 9 le 28.
décembre : 121 le 22, 168 le 28 et 160 le 30.

D'autres oiseaux, se nourrissant ou se reposant, sont observés dans d'autres localités.
avril : 1 le 4 à Rue (marais).
mai : 2 le 6 et 1 le 31 à Noyelles-sur-Mer/Boismont.
juillet : 3 le 22 et 5 le 31 à Quend-Plage.
août : 6 le 7, 4 le 24 et 3 le 31 à Quend-Plage.
décembre : 40 le 19 au bassin de chasse du Crotoy, 110 le 21 à Cayeux-sur-Mer (Brighton), 21 le 23 à Quend-Plage.

Quelques mouvements migratoires sont aussi notés.
* passage prénuptial : 7 en vol vers le nord le 26 mars à Cayeux-sur-Mer, de petits vols d'oiseaux migrateurs à la renclôture de Noyelles-sur-Mer et au HA le 4 avril, 234 migrateurs le 22 en RBdS nord (moyenne horaire : 80 individus) alors que passaient 134 Bécasseaux sp. supplémentaires, 1 en vol vers le nord-est le 31 mai au POM.
* passage postnuptial : 1 en vol vers le sud le 23 novembre au Hourdel, commune de Cayeux-sur-Mer ; 20 en vol vers le sud le 20 décembre en BdA, 4 en vol vers le sud le 30 à Quend/Fort-Mahon.

BECASSEAU COCORLI Calidris ferruginea

Rare lors du passage prénuptial, il est en revanche fréquent lors des mois de juillet, août et septembre.
* passage prénuptial (3 observations) : 4 le 29 mars au HA, 1 les 19 avril et 31 mai au POM.
* passage postnuptial : plus d'une douzaine d'observations en RBdS/POM ; signalons les observations suivantes :
  juillet : 1 ad. en plumage nuptial les 14 et 30,
  août : 7 le 1er, 16 le 16, 10 le 27,
  septembre : 9 le 2, 12 le 17, 3 le 27,
  octobre : 10 le 2 (la Maye).
  2 le 31 août à Quend-Plage.

Une observation hivernale est aussi remarquable : 1 le 11 décembre en RBdS.

BECASSEAU SANDERLING Calidris alba


Une note lui sera très prochainement consacrée. Rappelons que, comme bien d'autres Limicoles, il est surtout abondant sur nos côtes lors des deux passages.


RBdS/POM
- février : 2 le 15.
- mars : 41 le 11.
- avril : 20 le 11.
- mai : 94 le 17.
- juin : 1 le 17, 50 le 21.
- juillet : 1 ad. en plumage nuptial les 20 et 30.
- août : 6 le 3, 240 le 18, 200 le 22.
- septembre : 200 le 2, 250 le 4, 65 le 17, 90 le 27.
- octobre : 1 le 3, 15 le 27.
- novembre : 12 le 16.
- décembre : 40 le 30.


RBdA
- février : 100 le 1er, 100 le 15, 100 le 21.
- avril : on y note une augmentation graduelle dans la première partie du mois (170 le 7, 180 le 9, + 220 le 12, 280 le 13, 480 le 15). A cette époque est d'ailleurs noté un certain passage à Fort-Mahon (12 en vol vers le nord le 13, 2 en vol vers le nord le 17).
- août : 1 le 16.
- octobre : 220 le 29.


Fort-Mahon/Quend : min. 9 le 13 janvier, 2 le 30 mars, 5 le 1er mai, 15 le 22 juillet, 7 le 26 et 6 le 31, 22 le 26 octobre, 1 le 6 novembre, 1 le 23 décembre et 78 le 31.

3 le 6 septembre à Cayeux-sur-Mer.



Effectifs du Bécasseau cocorli sur le littoral picard.
20
10
J
F
M
A
M
J
J
A
S
O
N
D


Effectifs du Bécasseau sanderling en baie de Somme.
200
100
J
F
M
A
M
J
J
A
S
O
N
D





Effectifs du Bécasseau sanderling en baie d'Authie.



Effectifs maximaux du Bécasseau sanderling dans les baies de Somme et d'Authie.

COMBATTANT Philomachus pugnax
Une observation quasi-hivernale : 1 mâle 1 femelle le 19 décembre au bassin de chasse du Crotoy. Mise à part cette observation tardive, les mentions s'étalent du 28 mars (4 au POM) au 14 octobre (7 au POM).

- mars : 4 le 28 au POM, 13 le 29 à Boismont.
- avril : 1 le 4 au POM, 6 les 19 et 21 ;
  7 le 5 à Noyelles-sur-Mer/Boismont, 4 le 7, 33 le 12, 17 le 25, 7 femelles le 28 ;
  6 le 5 en BdA, 16 (dont 7 femelles) le 14 ;
  4 le 9 au HA et 8 femelles le 17 ;
  1 mâle 2 femelles en vol vers le nord le 13 à Fort-Mahon.
- mai : 1 le 14 et 2 le 15 en BdA ;
  1 mâle le 2 et 1 mâle 1 femelle le 15 à Noyelles-sur-Mer ;
  1 femelle le 6 à Estrèes-Mons (seule observation continentale) ;
  1 le 13 à Rue et 6 le 15 au POM.
- juin : 9 le 14 au marais de Rue et 1 mâle le 25 au POM.
- juillet : 7 le 19 et 6 le 31 au POM ; 22 le 6 et 19 le 8 à Noyelles-sur-Mer/Boismont ; 2 mâles le 8 au HA et 20 le 29 à Rue.
- août : 10 le 2 au POM, 10 le 17, 18 le 23, 1 juv. volant le 31 ; 12 le 11 à Rue.
- septembre : 9 le 9 au POM, 4 du 11 au 13, 1 le 21 ; 2 le 17 à Saint-Quentin-en-Tourmont.
- octobre : 1 le 2 au HA et 7 le 14 au POM.
- décembre : 2 le 19 au bassin de chasse du Crotoy.

Les contacts s'établissent donc surtout en avril-mai et juillet-août-septembre.

ECHASSE BLANCHE Himantopus himantopus
2 ad. du 2 juin au 4 juillet au marais de Rue.

AVOCETTE Recurvirostra avosetta
Cette espèce est désormais bien établie comme nicheuse au POM où ses effectifs s'accroissent d'année en année. Cette année, 68 couples y ont niché et un couple a fait de même en RBdS (F. SUEUR). En dehors du littoral, c'est une occurence rare : 16 le 6 avril à Boves.
RBdS/POM (toutes les données consignées ici concernent le POM sauf indication contraire)

- février : 1 le 25 en RBdS.
- mars : les premiers accouplements, en même temps que les premiers oiseaux, sont notés le 5 au POM. Le 16, parmi 40 ad., un minimum de 12 couples semblent s'être formés. Le 23, un autre accouplement est observé alors que 86 individus sont présents. Le 25, 22 en vol vers le nord en RBdS. Les 29 et 30, on recense 112 oiseaux.
- avril : 70 le 4, 300 (dont 50 migratrices) le 10, min. 142 les 16 et 22, 113 migratrices le 22 en RBdS nord.
- mai : 106 le 2, 3 premiers pulli le 3, min. 108 ad. et 3 pulli le 13, 110 ad. et 14 pulli le 19,

89 ad. et 33 pulli le 26, 1 nid/4 oeufs et 1 couple/4 pulli le 28 en RBdS, 107 ad. (dont 36 en vol vers le nord-est) et 22 pulli (des pulli ayant déjà quitté le POM pour la RBdS) le 31.

juin : 180 ad. (dont 26 en vol vers le nord-est) et 32 pulli le 1er, 4 nids/4 oeufs 2 nids/3 oeufs 1 nid/1 oeuf ainsi qu'un pullus isolé le 8 en RBdS (consécutivement à l'arrivée de 10 couples ayant quitté le POM suite à un dérangement) ; 11 nids (2 avec 1 oeuf, 3 avec 3 oeufs et 6 avec 4 oeufs) le 14 en RBdS, 117 ad. et min. 53 pulli le 17, 15 en vol vers le nord (migrateurs tardifs) le 20, 135 ad. et 45 pulli le 22, 122 ad. et juv. volants ainsi que 26 pulli le 30 ; toujours le 30 mais en RBdS, min. 20 ad. et 3 nids/pulli et oeufs.

juillet : 41 ad. 4 juv. min. 24 pulli le 2, min. 128 ad. et juv. volants ainsi que 11 pulli le 3, 120 ad. et juv. volants ainsi qu'au moins 13 pulli le 20, derniers pulli (2) le 24, 130 ad. et juv. volants le 25.

août : la plupart des oiseaux désertent le POM. 90 le 3 en RBdS (4 ad. 18 juv. au POM), 42 le 17 en RBdS, 47 le 31 en RBdS (1 ad. 8 juv. le 25 au POM).

septembre : 57 le 2 en RBdS, 48 le 16 et 28 le 28.

octobre : 32 le 2, 67 le 17, 33 le 30.

novembre : 1 les 2 et 4, 7 le 12.

décembre : 1 le 2, notée le 15.

HA : 33 en vol vers le nord le 31 mars, 20 en vol vers le nord le 5 avril, 1 le 9, 2 le 25, 8 le 28, 1 les 13 et 22 mai, 1 le 30 juin, 1 le 20 décembre.

BdA : 8 le 5 avril, 2 le 15, 6 le 18 et 9 le 19.

6 (migrateurs) le 31 mars à Quend-Plage, 1 le 1er et 4 en vol vers le sud-sud-est le 27 décembre à Cayeux-sur-Mer (Le Hourdel).

PHALAROPE A BEC LARGE Phalaropus fulicarius

Noté en octobre : 1 le 2 au HA, 1 le 11 au POM, 1 le 17 en RBdS et 1 tué le 13 en BdS.

PHALAROPE A BEC ETROIT Phalaropus lobatus

1 les 23 août et 6 septembre au POM.

OEDICNEME CRIARD Burhinus oedicnemus

Première observation le 1er mai à Airaines où l'espèce est ensuite notée de façon régulière jusqu'à la fin août.

1 juv. non volant recueilli blessé le 10 juillet à Cocquerel.

1 individu les 13 et 14 août ainsi que les 27 septembre et 2 octobre au POM.

L'espèce est signalée aussi aux environs de Loeuilly et de Frémontiers.

GRAND LABBE Stercorarius skua


Encore peu observé cette année.

janvier : 1 cadavre datant de plus d'un mois trouvé le 18 sur le littoral.

avril : 2 le 22 en RBdS (P. RAEVEL).
août : 2 le 20 en RBdA (O. HERNANDEZ et T. RIGAUX), 1 le 21 en RBdS (F. MONTEL).

LABBE PARASITE Stercorarius parasiticus
Noté surtout lors du passage postnuptial en août et septembre.
avril : 19 en vol vers le nord en 3 heures le 22 en bord de mer en RBdS (P. RAEVEL).
août : 1 (phase sombre) le 19 en RBdS, 1 le 24 à Fort-Mahon, 1 en BdA et 1 en RBdS le 28, 1 le 29 à Fort-Mahon, 1 à Quend et 3 (1 en phase sombre et 2 en phase claire) en RBdS le 31.
septembre : 3 le 2 en RBdS, 1 le 5 à Ault (Bois de Cise), 1 à Cayeux-sur-Mer et 1 au HA le 6, 1 le 17 en RBdS.
octobre : 2 en phase claire parasitent des Laridés le 2 au large de Cayeux-sur-Mer.

GOELAND MARIN Larus marinus
Noté tout au long de l'année sur le littoral avec un minimum estival (mai, juin et juillet) et un maximum exceptionnel en décembre. C'est d'habitude plutôt en septembre-octobre qu'est noté ce maximum, mois pendant lesquels ont d'ailleurs étaient observés des groupes importants.
RBdS/POM (maxima mensuels)
janvier : 162 (dont 44 im.) le 24.
février : 72 le 17.
mars : 74 le 11.
avril : 42 (3 ad. 5 subad. 34 im.) le 21.
mai : 43 le 8.
juin : 1 im. du 2 au 13 au POM.
juillet : 2 subad. 1 im. le 26.
août : 700 le 18.
septembre : 500 le 2, 2200 (60 % d'adultes) le 4, (250 le 17, 400 le 27).
octobre : 1000 le 27.
novembre : 800 le 15, 500 le 30.
décembre : 126 le 11 (11 ad. 13 im. au POM, 98 en RBdS, 3 ad. 1 im. rentrant au dortoir à Saint-Valery-sur-Somme), 1150 le 18, 110 le 30.
Le maximum est noté en septembre.
Remarque : en mars, avril, mai, juin, ce sont en majorité des immatures qui sont observés. En plus des observations déjà citées, on peut en effet retenir les observations suivantes faites au POM.
mars : 2 ad. 6 im. le 5, 1 ad. 7 im. le 17, 1 ad. 1 im. le 22, 1 im. le 28 soit 15 im. observés en mars contre 4 ad.
avril : 9 im. le 6, 3 im. le 20, 2 im. le 22.
mai : 5 im. le 7.
RBdS/Fort-Mahon
janvier : 20 ad. et subad. le 18.
février : 30 le 15.
avril : 10 le 13.
août : 140 le 16, 350 le 20.
octobre : min. 450 le 19.
décembre : 20 le 20.




30 le 31 mars à Quend où l'espèce est présente en juillet.
115 le 23 novembre à Cayeux-sur-Mer.
HA : 3 le 6 janvier, 1 im. les 9 et 17 avril, 3 im. le 13 mai,
1 le 6 septembre, 1 ad. 1 im. le 26 octobre, 1 ad. 1 subad.
le 2 novembre, 3 subad. le 7 décembre et 1 ad. le 28.

GOELAND BRUN Larus fuscus

Lui aussi est présent sur le littoral toute l'année. Sa fréquence est maximale en avril où un important passage est noté et en août où un comptage d'effectifs exceptionnels a pu être effectué : 1175 le 19 en RBdS.

janvier : 70 le 1er en RBdS, 1 ad. 1 im. le 19 au POM et le 22 en RBdS, 3 dont 1 ad. graellsi le 31 à Saint-Valery-sur-Somme.



février : 1 les 4 et 6 au POM, 1 ad. fuscus le 15 à Saint-Valery-sur-Somme, 1 ad. 1 im. le 17 en RBdS.

mars : 5 rentrent au dortoir le 14 à Saint-Valery-sur-Somme ; le 31, 25 à Quend et 21 en vol vers le nord au HA.

avril : un passage très net est observé.
10 en vol vers le nord le 5 à Fort-Mahon ;
plusieurs dizaines de migrateurs le 5 au HA ;
4 le 9 en BdA, 7 en vol vers le nord le 15, 6 en vol vers le nord le 24 ;
passage important les 20, 21 et 22 en RBdS
le 20, moyenne horaire 80 individus (90 à 95 % d'adultes)
le 21, moyenne horaire 40 individus (80 % d'adultes tous fuscus sauf 3 graellsi)
le 22, moyenne horaire 52 individus

mai : 1 graellsi le 10 au HA, 4 ad. 2 subad. et min. 5 im. le 8 en RBdS/POM.

juin : 30 le 20 en RBdS.

juillet : noté à Quend, 1 im. le 20 en RBdS, 1 individu les 19 et 31 au POM.

août : 20 le 12 en RBdA, 10 en vol vers le sud le 21, 70 fuscus et 1 graellsi stationnent le même jour ;

20 ad. (15 fuscus et 5 graellsi) le 21 à Quend ; 15 le 18 et 1175 le 19 en RBdS.

septembre : 50 le 2 en RBdS/POM, 320 (70 % d'adultes surtout fuscus) le 4, 13 le 17.

octobre : 9 ad./subad. 2 im. le 19 au POM, 4 ad. le 26 au HA, 11 le 30 en RBdS (dont 3 ad. graellsi/intermedius et 1 subad. graellsi/intermedius rentrant au dortoir à Saint-Valery-sur-Somme).

novembre : 1 les 2, 9 et 14 au HA ; 13 le 16 en RBdS/POM. Le 23, 6 en vol vers le sud à Quend (4 ad. graellsi et graellsi/intermedius), min. 8 (dont 1 ad. graellsi et 1 ad. fuscus) à Cayeux-sur-Mer, 1 ad. fuscus en vol vers le sud-ouest à Woignarue, 1 ad. fuscus rentrant au dortoir à Saint-Valery-sur-Somme.

décembre : 3 ad. le 11 en RBdS, 6 ad. fuscus le 30 (dont 1 en vol vers le sud) à Quend-Plage/Fort-Mahon et 10 en RBdS, 1 ad. graellsi 1 im. le 31 à Quend-Plage/Fort-Mahon.

GOELAND ARGENTE Larus argentatus

Plus abondant Goéland sur notre littoral, le Goéland argenté effectue des mouvements quotidiens à l'intérieur des terres où il exploite essentiellement les décharges. Le retour de ces oiseaux au dortoir, situé en baie de Somme, peut être suivi à Saint-Valery-sur-Somme ou en d'autres localités situées sur leur passage.

Mouvements de rentrée au dortoir

janvier : 1200 individus sont notés à Abbeville (en vol vers l'ouest) le 31 alors que sur la décharge de Sains-en-Amiènois étaient dénombrés 2600 individus le 30 et 1500 le 31.

février : 1300 regagnent le dortoir à Saint-Valery-sur-Somme le 1er et 1500 le 2 à Amiens alors que 1500 oiseaux sont comptés le 6 à Sains-en-Amiènois.

mars : 285 le 14 et 201 le 30 à Saint-Valery-sur-Somme.

août : 306 le 18 à Saint-Valery-sur-Somme.

octobre : 1500 le 30 à Saint-Valery-sur-Somme.

novembre : 503 le 16 à Saint-Valery-sur-Somme alors que 500 individus sont observés le 13 sur la décharge de Sains-en-Amiènois.

décembre : 1500 le 11 et 4320 en 2 heures le 27 à Saint-Valery-sur-Somme.

L'intérieur des terres est donc fréquenté essentiellement en hiver mais quelques observations témoignent de l'existence d'une certaine fréquentation estivale : noté en juin à Airaines, Velennes, Surcamps et en juillet à Ailly-sur-Noye.

Sur le littoral, des quantités importantes de ces oiseaux peuvent être observées dans la journée avec un maximum classique en août et un minimum au début du printemps (fin mars et avril).

Maxima mensuels relevés en RBdS/POM


mars : 500 le 21.

avril : 585 le 16.


mai : 315 le 4 au POM (+ 90 % d'immatures), 1200 (dont 58 ad.) le 8.

juin : min. 2500 le 22.

juillet : min. 3500 le 20.



Effectifs du Goéland argenté rentrant au dortoir à Saint-Valery-sur-Somme.



Effectifs du Goéland argenté en baie de Somme et au Parc Ornithologique du Marquenterre.

août : min. 10200 le 18 (7000 en RBdS et 3200 au POM).
septembre : 2600 (1/3 d'adultes) le 4.
octobre : (570 le 17), 1100 le 30.
novembre : 1900 le 16.
décembre : 1770 le 11.

Maxima mensuels relevés en BdA
février : 300 le 1er, 400 le 15.
août : 1200 le 20.

GOELAND LEUCOPHEE Larus cachinnans

La plupart des Goélands argentés à pattes jaunes observés sur le littoral picard semblent appartenir à cette espèce (sous-espèce michaellis). Cependant, il serait bon que les observateurs relèvent différents caractères (taille, couleur du manteau comparée à celle des Goélands argentés à pattes roses et des Goélands cendrés, couleur du cercle orbital, longueur des pattes, présence ou non de rayures brunes à la tête...) afin de distinguer sûrement les Larus michaellis de la forme "omissus" de L. argentatus.
Cette année, des observations hivernales ont été réalisées : 2 ad. le 14 janvier en BdA et 1 le 25 à Quend-Plage, 30 le 1er février en BdA.
En dehors de cette période, on retiendra :

mai : 1 le 3 à Quend.
juillet : noté à Quend.
août : 25 le 12 en BdA, 15 le 16, 30 sur 300 Goélands "argentés" le 20 (alors que le nombre total de Goélands "argentés" observés s'élève à 1200 ; si l'on peut extrapoler les résultats, on aurait alors 120 L. cachinnans michaellis), 20 le 21 ; sur 89 Goélands "argentés", 44 à pattes jaunes le 21 à Quend ;
6 le 13 et 1 le 19 en RBdS.
septembre : 8 le 2 et 7 ad. le 4 en RBdS.
octobre : 1 le 18 à Quend, 2 le 27 en RBdS.
novembre : 1 le 23 à Fort-Mahon.

On pourra remarquer que la plupart des observations ont donc été faites de Quend à la baie d'Authie.

GOELAND BOURGMESTRE Larus hyperboreus


Cette espèce peu commune sur notre littoral y a fait l'objet de trois observations.

janvier : 1 subad. le 10 à Cayeux-sur-Mer (R. DEVISSE et P. TRIPLET).
avril : 2 en vol vers le nord-ouest le 21 en RBdS (1 ad. avec 1 im. 2ème ou 3ème hiver, P. RAEVEL).
décembre : 1 im. 1er hiver le 27 au Hourdel, commune de Cayeux-sur-Mer (P. TRIPLET et P. THIERY).

GOELAND CENDRE Larus canus

Très commun, voire abondant, sur le littoral, il est aussi noté à l'intérieur des terres pratiquement en toutes saisons.


Sur le littoral
janvier : 300 les 22 et 24 en RBdS/POM.
février : 890 le 17 en RBdS.
mars : 600 le 22 en RBdS.
avril : 300 le 19 au POM.


Effectifs du Goéland cendré
sur le littoral picard.
3500
3000
2500
2000
1500
1000
500
100
J
F
M
A
M
J
J
A
S
O
N
D

mai : 287 le 7 au POM.
juin : 1500 le 20 en RBdS.
juillet : min. 186 le 8 au POM.
août : 1100 le 17 en RBdS, 700 le 16 en RBdA.
septembre : 3500 (2/3 d'adultes) le 4 en RBdS, + 3000 le 10, 2600 le 17.
octobre : 2000 le 17 en RBdS/POM.
novembre : 1300 le 16 en RBdS.
décembre : 1100 le 11 en RBdS.

A Saint-Valery-sur-Somme sont notées les rentrées au dortoir des oiseaux s'étant nourris dans l'intérieur pendant la journée.

mars : 2740 le 14.
août : 203 le 18.
octobre : 458 le 30.
novembre : 462 le 16, 566 le 23.
décembre : 1000 le 11, 2340 en 2 heures le 27.



Effectifs du Goéland cendré rentrant au dortoir de Saint-Valery-sur-Somme.

A l'intérieur des terres

janvier : des individus isolés sont notés à Mouflers, Cramont, Ailly-le-Haut-Clocher et Airaines.
février : 50 le 25 à Tachy ; noté fréquemment dans le Ponthieu notamment à Neuilly-l'Hôpital (23 le 15) et à Machy (14 le 18).
mars : le 10, 30 à Saint-Riquier, 25 à Lamotte-Buleux et 100 à Sailly-Flibeaucourt.
avril : 1 le 20 à Long-le-Catelet.
mai : observé le 6 à Airaines.
juin : noté à Airaines.
novembre : à nouveau, assez grand nombre d'observations dans le Ponthieu.
décembre : 33 le 29 à Amiens (La Hotoie) ; d'autres observations concernent des individus isolés.

Nidification

Seule observation intéressante : 1 couple parade le 17 mars (F. SUEUR) au POM.

MOUETTE MELANOCEPHALE Larus melanocephalus
2 le 15 février en BdA (X. COMMECY et H. DUPUICH).

MOUETTE RIEUSE Larus ridibundus
Le littoral est partiellement déserté dans la journée. Les oiseaux s'en vont alors se nourrir essentiellement dans les champs, sur les décharges et les plans d'eau. Leur retour a été soigneusement suivi à Saint-Valery-sur-Somme :

janvier	: 1320 en 1 h 30 le 31.
février	: 12740 en 3 h 05 le 1er.
mars	: 8625 le 14, 2260 le 31.
août	: 5100 le 18.
octobre	: 23675 le 30.
novembre	: 18150 le 16, 34650 le 23.
décembre	: 7310 le 11, 4860 en 2 h le 27.

La distribution géographique précise de ces oiseaux durant la journée est difficile à appréhender mais ils semblent particulièrement abondants dans la Plaine maritime picarde, le Ponthieu, le Vimeu et les environs de l'axe naturel que constitue la vallée de la Somme.

Nidification

POM : 3 accouplements notés les 15 et 30 avril mais aucune nidification prouvée.

Rue : sur les lieux de la colonie habituelle, min. 430 ad. et 2 im. le 4 mai ; 265 couples le 13.

Amiens (Longpré) : 2 ad. le 22 avril dont 1 en position de couveur et 1 de garde ; encore présents le 30 ; le 20 mai, est découvert un nid, garni ?

Roye : 100 ad. le 29 avril (attaques et intimidations) ; 90 nids le 11 mai dont 3 visibles comportant respectivement 1 oeuf, 1 oeuf et 3 oeufs ; le 11 juin sont observés 4 x 3 pulli, 3 x 2 pulli et 2 x 1 pullus ; le 15 sont notés les premiers vols de jeunes alors qu'il y a encore des oeufs non éclos.

MOUETTE PYGMEE Larus minutus
Observée pratiquement toute l'année avec un maximum d'abondance en avril.

janvier	: 4 le 8 à Quend-Plage, 42 le 19 au Crotoy ; des oiseaux mazoutés sont observés (1 ad. et 2 im. le 14 en BdA, 1 le 6 au HA).
février	: 1 ad. trouvé mort le 1er en RBdS, 25 pêchent le 22 à Quend et Fort-Mahon, 17 ad. 1 im. le 25 en RBdS et au sud de Quend.
mars	: 1 im. le 8 au HA, 1 individu le 28 et 2 le 31.
avril	: 3 ad. 1 im. le 9 en BdA, 1 ad. 1 im. le 16 en RBdS, plus de 30 en vol vers le nord le 16 à Fort-Mahon, 15 en vol vers le nord le 17 à Fort-Mahon, 38 le 17 au HA, 225 le 19 au HA, 7 ad. en vol vers le nord le 22 en RBdS, 8 ad. 15 im. le 26 au HA, 5 ad. 1 im. en stationnement et 3 en vol vers le nord le 27 au HA, 50 le 28 au HA.
mai	: 1 le 2 en RBdS, 1 le 3 à Quend, 1 ad. 1 im. le 21 au POM ; 1 im. le 2 au HA, 5 ad. 1 im. le 3, 9 le 6, 3 le 13, 1 le 22, 14 im. le 27.

juin : 1 im. le 5 au HA, 3 le 6 au POM, 4 im. le 27 au HA et 3 im. le 30.
juillet : 8 (dont 1 ad.) le 8 et 2 im. le 29 au HA.
août : 1 ad. 2 im. le 16 en BdA.
octobre : 4 le 27 en RBdS, 12 le 30 à Cayeux-sur-Mer.
novembre : 50 le 14 en face de Cayeux-sur-Mer, 4 le 14 au HA.

MOUETTE DE SABINE Xema sabini
1 im. le 10 février au Bois de Cise, commune d'Ault (M. MONTADERT).

MOUETTE TRIDACTYLE Rissa tridactyla
Pour la deuxième année consécutive, pas d'observations en juillet alors qu'elle est notée d'habitude lors de ce mois.
janvier : 40 le 6 à Cayeux-sur-Mer (dont 10 au Hourdel), 1 le 8 à Quend-Plage, 18 trouvées mortes le 10 et 51 autres le 18 sur le littoral picard, 2 individus le 24 en RBdS.
février : 7 trouvées mortes le 1er sur le littoral picard, 1 individu en BdA et 2 im. en vol vers le sud à Cayeux-sur-Mer le 1er, 1 mazoutée le 15 au HA.
mars : 3 le 31 à Quend.
avril : 1 im. le 15 au HA, 1 im. les 15 et 16 en BdA, 2 ad. 31 im. en vol vers le nord le 22 en RBdS.
mai : 1 im. trouvé mort le 24 au HA.
août : 1 le 1er à Quend, 3 le 12 en RBdA, 3 le 21 à Quend, 1 le 22 au POM, 1 le 28 en BdS.
novembre : 1 im. le 15 en RBdS.
décembre : 1 le 25 en RBdS.

GUIFETTE NOIRE Chlidonias niger
Le passage postnuptial est mieux suivi que le prénuptial. Deux observations ont été effectuées début novembre, date tardive.
avril : 10 le 16 au HA, 8 le 17, 12 le 19 et 4 le 26 ; 1 le 29 au POM.
mai : 1 le 2 au HA, 11 le 10 et 3 le 13 ; 1 le 2 au POM, 17 le 7, 2 en vol vers le nord le 15 ; 2 le 20 à Cléry-sur-Somme.
juin : 1 le 26 au POM.
juillet : 2 le 23 et 1 le 26 à Quend, 2 au HA et 1 à Noyelles-sur-Mer/Boismont le 29.
août : 2 le 3 et le 31 à Quend, 2 juv. le 16 à Noyelles-sur-Mer/Boismont, 1 le 22 en BdS, 2 le 26 au HA ; 11 le 6 au POM, 1 le 20, 3 migrateurs le 28.
septembre : 1 le 2 sur les bassins de décantation de Grand-Laviers, 1 en vol vers le sud le 5 à Ault (Bois de Cise) ; 3 le 6 au HA, 34 le 16, 250 le 20 et 60 le 28 ; 2 le 14 à Boves, 1 le 27 au POM, 1 le 28 à Cléry-sur-Somme.
octobre : 5 le 10 au HA, 2 le 26, 2 le 30 et 20 le 2 ; 1 le 8 au POM, 3 du 13 au 21, 1 du 24 au 29 ; 3 le 17 et 1 le 18 à Noyelles-sur-Mer/Boismont.
novembre : 1 le 1er au POM, 4 le 2 au HA (dont 1 encore en grande partie en plumage nuptial).

GUIFETTE MOUSTAC Chlidonias hybrida
1 le 10 mai au HA (H. DUPUICH).

STERNE HANSEL Gelochelidon nilotica
1 im. le 17 septembre en RBdS (P. ROYER et P. TRIPLET).

STERNE PIERREGARIN Sterna hirundo
La prise de conscience progressive par les observateurs de la difficulté de distinguer sûrement cette espèce de la Sterne arctique Sterna paradisea a conduit à une diminution des données certaines communiquées.

avril : 18 le 16 en RBdS, 4 le 17 au HA, 10 le 21 en RBdS, 14 le 25 au HA.
mai : 16 le 1er à Quend, 3 le 5 à Rue (Larronville), 40 le 8 en RBdS et 2 le 30.
juin : 30 le 20 en RBdS, 2 le 25 au POM et 15 le 26.
juillet : de 1 à 3 individus du 12 au 27 à Quend et 10 le 29 ; min. 102 le 20 en RBdS/POM, 234 le 25 au POM, 1 le 29 au HA.
août : 150 le 12 en BdA ; min. 70 le 7 au POM, 32 le 16, 4 le 30 ; des juvéniles volants sont notés le 19 en RBdS.
septembre : 1 les 4 et 27 en RBdS/POM, 2 im. le 15 et 100 le 17 ; 100 le 3 en BdA.

STERNE ARCTIQUE Sterna paradisea
Les observations sont plus rares et limitées au passage postnuptial.

juillet : 1 le 12 et 2 le 29 à Quend.
août : 13 le 5 et min. 2 le 6 au POM ; 10 le 2 à Quend, 2 le 3 et 5 le 6, notée le 18 en RBdS.
septembre : 2 le 15 en RBdS.

STERNE NAINE Sterna albifrons
Les deux passages sont bien notés.
Passage prénuptial

avril : 4 le 21 en RBdS, 17 en migration (moyenne horaire : 6 individus) le 26 ;
1 le 7 en BdA/Fort-Mahon, 68 en vol vers le nord le 9 (par groupes de 6 à 10), 8 le 10, 10 le 13, 8 le 15, 160 en vol vers le nord le 16.
mai : 22 le 1er à Quend, 22 le 2 et 8 le 3 ;
30 le 2 et 6 le 8 en RBdS, 2 le 6 à Noyelles-sur-Mer/Boismont et 10 le 10 au HA.

Passage postnuptial

juillet : 3 le 3 et le 7 à Quend, 9 le 13 ;
2 le 2 au HA, 1 les 19 et 25 au POM.
août : 22 le 3 en RBdS/POM, 26 le 18, 3 le 19, 4 en vol vers le sud le 20 et 9 stationnant, 8 le 23 ; 5 en vol vers le sud le 26 à Fort-Mahon/BdA et 25 en vol vers le sud le 28.
septembre : 8 le 2 et 3 le 8 en RBdS, 2 le 6 au HA.
octobre : 1 le 4 en RBdS.

STERNE CAUGEK Sterna sandvicensis
Le début du passage prénuptial est noté le 12 mars et la dernière

observation est faite le 27 octobre ; ces deux observations concernent des oiseaux isolés.

janvier : 1 ad. trouvé mort (cadavre ancien) le 10 sur le littoral picard.

mars : 1 le 12 au HA, 2 le 21, 9 le 22 et 1 le 31 ; 4 en vol vers le nord le 26 à Cayeux-sur-Mer, 11 le 30 à Quend et 43 le 25 en RBdS.

avril : 7 le 4 en RBdS, 57 en vol vers le nord le 6, 40 les 11, 16 et 18, 48 le 21 et 37 en vol vers le nord le 22 (moyenne horaire : 12 individus) ; 2 le 5 en RBdA, 15 (dont 1 mazoutée) le 7, 220 le 9 (dont des migratrices), 25 le 15 ; 3 les 9 et 28 au HA ; notée le 19 et 2 le 26 au POM.

mai : 14 le 1er et 28 le 3 à Quend, 2 le 6 au HA, 14 le 8 en RBdS.


juin : 7 le 17 en RBdS/POM, 120 le 20, 150 le 21, min. 233 le 26 (POM) et 60 le 30 ; 6 le 11 et 4 le 22 au HA.

juillet : 10 le 12 à Quend, 4 le 26 et 2 le 29 au HA ; 2 le 6 au POM, 76 le 11, min. 35 le 24 ; 400 le 20 en RBdS.

août : plus de 50 sur la mer durant tout le mois à Quend ; 1500 le 3 en RBdS, min. 300 le 18, 240 le 31 ; 60 le 12 et 50 le 20 en RBdA ; autour du 20 à Fort-Mahon, il en passe des centaines par jour.

septembre : 250 le 2 en RBdS, 100 le 8, 68 le 17 et 2 le 27 ; 50 le 3 en RBdA et 60 le 5 à Ault (Bois de Cise).

octobre : 1 le 27 en RBdS.



PETIT PINGOUIN Alca torda
228 individus ont été trouvés morts sur le littoral picard entre le 1er janvier et le 15 février (avec 113 individus pour le seul 18 janvier). Le dégazage sauvage des pétroliers en mer est bien entendu responsable de cette hécatombe.
Notons une observation d'oiseaux vivants : 2 en migration vers le sud le 23 novembre à Quend-Plage.

GUILLEMOT DE TROIL Uria aalge
Comme pour l'espèce précédente, beaucoup d'oiseaux mazoutés au début de l'année : 675 individus trouvés morts du 1er janvier au 15 février.
Quelques observations d'oiseaux non mazoutés de plus.
1 le 22 mars à Quend-Plage, 8 le 5 avril et 1 le 6 en RBdS, 3 trouvés morts le 4 à Ault, 100 le 10 mai à Ault (Bois de Cise, H. DUPUICH) alors qu'un individu avait été trouvé mort le 5, 1 trouvé mourant le 21 août en BdS, 2 trouvés morts les 30 et 31 octobre, 4 le 15 novembre toujours en RBdS, 8 morts ou vivants mazoutés trouvés en décembre sur le littoral picard.

MERGULE NAIN Plautus alle
1 trouvé mort le 28 novembre en RBdS (P. ROYER).

PIGEON COLOMBIN Columba oenas
Seuls les mois d'hiver fournissent quelques chiffres importants en RBdS/POM : 9 le 17 février, 10 le 22 mars, 7 le 16 novembre et 5 le 18 décembre mais l'espèce y est observée toute l'année avec des parades et des chants d'avril à juillet et la migration dès le 28 août (1 individu en 2 heures).
Il est noté en de nombreux autres points du littoral et niche dans les falaises du sud du département.
Il est probablement régulièrement réparti à l'intérieur du département où il a été noté notamment à Amiens (nicheur), Argoeuves (nicheur), Corbie, en forêt de Crécy, à Thennes, Régnière-Ecluse, Sailly-Flibeaucourt, Saveuse et Saint-Gratien (nicheur).
La migration a été observée à Abbeville : 1 en 2 h le 5 octobre, 2 en 3 h le 19.

PIGEON RAMIER Columba palumbus
Nicheur abondant partout (encore 1 nid/2 pulli d'environ 10 jours le 4 août à Drucat).
Quelques rassemblements : plusieurs milliers le 26 janvier en forêt de Crécy, 300 le 29 à Beauval, 500 le 7 février à Famechon, 1150 le 8 à Croixrault, 300 le 14 mars à Saleux, encore 150 le 6 avril à Drucat (bois des Catiches) et 50 le 12 à Thennes, 300 le 6 octobre à Famechon, 500 le 18 novembre à Moreuil, 800 le 23 à Fouencamps et 700 le 27 décembre à Sains-en-Amiènois.
Migrations notées régulièrement du 15 août au 27 octobre : 251 en 1 h le 14 octobre à Abbeville...
Autres rassemblements notés : 100 le 19 décembre à Tilloy-les-Conty et 200 le 28 à Conty (Wailly).

TOURTERELLE DES BOIS Streptopelia turtur
1ères le 26 avril à Airaines, le 27 à Ham, le 29 à Boismont et le 1er mai au POM ; arrivée généralisée entre les 5 et 10 avec le 9 un très net passage (plusieurs centaines) à Abbeville. La migration est notée jusque début juin.
Encore 1 ad./2 pulli au nid le 8 août à Saint-Riquier.
Retour en août (1 migrateur par heure les 15 et 21 au POM) avec quelques rassemblements : 20 le 14 en RBdS et 30 le 29 au POM.
25 le 4 septembre en RBdS.
Dernières observations fin septembre : 1 le 19 à Quend (Quend-Plage), 1 le 23 à Abbeville, 1 le 26 à Quend (Froise), 1 le 27 au Crotoy et 1 le 30 à Amiens ; avec 2 observations très tardives les 2 et 11 octobre au POM.

TOURTERELLE TURQUE Streptopelia decaocto
Nicheuse commune toute l'année : 2 femelles couvent à Famechon le 28 janvier et 1 couve un gros jeune le 20 décembre...
Rassemblements : 100 en février à Airaines, 65 le 12 février et 47 le 21 décembre à Famechon, 93 le 28 août et 285 (dortoir) le 22 septembre à Abbeville.
Migrations vers le sud observées au POM (7 le 13 août, 12 le 30, 3 les 27 et 30 septembre).

COUCOU GRIS Cuculus canorus
Premiers : 1 chanteur le 30 mars à Saveuse puis le 3 avril à Boves, le 9 au HA, le 11 à Saint-Gratien ; le 12 au POM, à Famechon, Frémontiers et Velennes. Ensuite l'espèce est notée un peu partout dans le département.
5 chanteurs le 20 mai à Quend (Froise).
Encore des chanteurs le 2 juillet à Saint-Gratien.
1 juv. volant nourri par des Passereaux indéterminés (Rouge-gorges ?) le 28 juillet à Saint-Quentin-en-Tourmont.
1 en vol vers le sud le 31 juillet à Quend (Quend-Plage).
Derniers observés : 1 juv recueilli blessé le 20 août à Brutelles, 1 très tardif du 10 au 25 octobre au POM (F. MONTEL et F. SUEUR).

HIBOU MOYEN-DUC Asio otus
Signalé nicheur à Airaines (Bois Ferrant), Le Quesnoy, Riencourt, Métigny et au POM.
Observé également à Breilly (juillet), Fort-Mahon (août), Mouflers (mai), Thennes (février), Auchonvillers (4 en décembre) et Saveuse (janvier à mars et novembre).

HIBOU DES MARAIS Asio flammeus
Toujours un hivernage régulier sur la côte mais en très petit nombre (toujours des isolés observés) en janvier-février et retour début novembre.
Observé au printemps à Soues (1 le 24 mai en chasse) et Drucat (1 le 21 avril).
Passage en août ? : 1 le 3 à Abbeville, 1 du 7 au 10 au Crotoy.
1 le 17 octobre au HA.

CHOUETTE CHEVECHE Athene noctua
Nidification certaine ou probable (espèce observée ou entendue de février à mai) à Fleury (3 oeufs le 2 mai), Quend (Froise), Saint-Gratien, Candas, Cagny, Conty, Ignaucourt et Famechon.
Espèce notée en août à Abbeville, Saint-Quentin-en-Tourmont, Rue et Longpré-les-Corps-Saints.
1 en septembre à Saveuse et Drucat.

CHOUETTE HULOTTE Strix aluco
Nicheuse certaine à Amiens (jardins de la préfecture : 1 jeune non volant le 14 mars), Famechon (3 oeufs le 16 mars, 1 jeune le 20 avril) et Frohen-le-Grand (1 jeune le 2 mai).
Entendue ou vue à Amiens (3 autres endroits, entendue toute l'année), Abbeville, Beauval, Coisy, Cottenchy, en forêt de Crécy, au Crotoy, à Drucat, Epaumesnil, Frémontiers, Grivesnes (Ainval-Septoutre), Longpré-les-Corps-Saints, Liomer, Quend (Froise et Quend-Plage), Riencourt, Rue, Saint-Gratien (sédentaire), Saint-Quentin-en-Tourmont (y compris le POM où la Chouette hulotte est sédentaire), Saint-Valery-sur-Somme, Taisnil, Tilloy-les-Conty, Velennes et Conty (Wailly).

CHOUETTE EFFRAIE Tyto alba
Nicheuse certaine à Amiens et Cavillon (pas de prospections systématiques).
Observée à Abbeville, Airaines, Ailly-le-Haut-Clocher (1 en phase rousse), Blangy-sous-Poix, Camon (sédentaire), Cléry-sur-Somme, au Crotoy, à Famechon, Longpré-les-Corps-Saints, Daours, Flixecourt, Quend (Froise), Rue, Saveuse, Saint-Sauflieu, Velennes et Warloy-Baillon.

HUPPE FASCIEE Upupa epops
1 le 10 avril à Limeux, 1 le 14 à Port-le-Grand, 1 le 9 mai au POM.

MARTINET NOIR Apus apus
Premiers sur le littoral le 26 avril au POM et à l'intérieur des terres le 1er mai à La Chaussée-Tirancourt.
Présence généralisée dans le département les 6 et 7 mai, le 6 correspond au premier jour de temps assez chaud après plusieurs jours de froid.
Premières migrations notées vers le sud dès le 7 juillet au POM.
Encore 15 observations en septembre : 3 du 1er au 5, 2 du 6 au 10, 2 du 11 au 15, 4 du 16 au 20, 1 du 21 au 25 et 3 du 26 au 30.
Derniers en octobre à Amiens : 3 le 2 et 1 le 5.

ENGOULEVENT D'EUROPE Caprimulgus europaeus
2 le 9 juin à Quend (Froise), 1 mâle tué au fusil en ce lieu pendant ce mois (!) (P. ETIENNE).
1 le 22 août à Saint-Quentin-en-Tourmont (O. HERNANDEZ et T. RIGAUX).

MARTIN-PECHEUR Alcedo atthis
25 localités d'observation.

Nicheur certain à Famechon (2 sites, nourrissages observés les 2 mai et 12 juillet), Fossemanant (parades début juin, nourrissages le 22) et Amiens (Longpré, transport de poissons le 20 mai).
Observé à Amiens (2 autres endroits), Abbeville, Airaines, Boves (sédentaire), Brie, Bergicourt, Contre (sédentaire), Cléry-sur-Somme (sédentaire), L'Etoile, au HA, à Cayeux-sur-Mer (Le Hourdel), Fouencamps, Frise, Long-le-Catelet, Péronne, Poix, Noyelles-sur-Mer, Rue, en RBdS, à Thennes, Tilloy-les-Conty et Velennes.
Août et septembre semblent marquer l'époque de dispersion des jeunes et des migrateurs avec de nombreuses observations en bord de mer et l'apparition de l'espèce en des lieux où elle n'avait pas été observée au printemps (Abbeville, Bergicourt, Drucat, Péronne...).

TORCOL FOURMILIER Jynx torquilla
1 le 22 avril à Abbeville (F. MONTEL), 1 le 28 à Airaines (J.P. FERRE), 1 le 19 septembre à Quend (Quend-Plage, P. ETIENNE).

PIC VERT Picus viridis
Signalé en période de reproduction (mars à juin) à Boismont, Bergicourt, Contre, Conty (forêt de Wailly), Drucat, Frémontiers, Fontaine-sur-Somme, au POM (1 nid le 3 mai), Saint-Gratien, Tilloy-les-Conty et Velennes.
Ailleurs à Poix, Quend (Froise) et en RBdS (août).

PIC EPEICHE Dendrocopos major
Ce Pic est bien répandu dans les vallées : Amiens (Marais du Bout du Monde : 1 couple nourrit le 4 juin), Boves, Blangy-sous-Poix, Drucat, Fleury, Fouencamps, Famechon, Poix, Saint-Christ-Briost ; et dans les bois et forêts du sud-ouest d'Amiens : Epaumesnil, Etréjust, Frémontiers, Heucourt-Croquoison, Métigny, Selincourt et Conty (forêt de Wailly : 5 chanteurs/1,5 km le 18 mars, densité confirmée le 21)...
Observé aussi à Abbeville, Airaines, Boismont, en forêt de Crécy, à Dury, au Mesge, à Quend (Froise), au POM, à Saveuse, Saint-Valery-sur-Somme, Saint-Gratien, Tilloy-les-Conty et Thennes.

PIC EPEICHETTE Dendrocopos minor
Répartition mensuelle des données : 4 en janvier, 6 en février, 7 en mars, 1 en avril, 2 en mai, 1 en juin, aucune en juillet, 3 en août, 9 en septembre, 7 en octobre, 4 en novembre et 3 en décembre.
Nicheur certain ou probable à Amiens (Hortillonnages : 1 ad. nourrit le 15 mai ; Marais du Bout du Monde : 1 couple défend un territoire le 4 juin), Epaumesnil et Bouillancourt-en-Séry.

PIC NOIR Dryocopus martius
Installation à Conty (Wailly) début février mais les Hêtres porteurs de loges sont abattus à la fin de ce mois ; espèce non retrouvée ensuite. 1 loge ébauchée début mars à Famechon, pas de suites (J.C. ROBERT).

COCHEVIS HUPPE Galerida cristata
2 le 18 janvier à Fort-Mahon.
Abbeville : espèce notée toute l'année dans cette localité (Cité scolaire, Zone industrielle, Supermarché Rond Point) où elle se reproduit, 1 migrateur en 3 h le 19 octobre.
Amiens : 2 le 19 janvier et 4 le 2 février (Cité scolaire)
espèce notée de mars à mai (Cité administrative)
2 couples en avril (Cité scolaire)
1 le 28 avril (rue Alfred Catel)
1 le 5 juin (CSC Guynemer).
HA : 1 le 23 janvier, min. 6 le 29 mars, 1 les 5 avril et 23 novembre.
Quend : 2 les 24 janvier et 21 juin (Quend-Plage)
1 chanteur en novembre (Froise)
3 le 23 novembre et 2 le 31 décembre (Quend-Plage).
Airaines : espèce notée en janvier et février, 1 couple en mars, 3 jeunes à l'envol le 28 avril (J.P. FERRE), espèce notée en juin.
Montdidier : 2 couples le 2 février, espèce notée ensuite de mars à mai.
Cayeux-sur-Mer : 1 le 15 mars, 2 les 21 et 26, 1 le 28 décembre (Le Hourdel).
Velennes : 1 les 4 et 30 avril, 1 chanteur les 1er et 3 mai, un individu transporte des brindilles le 12, 1 individu le 16 juin.
1 chanteur le 12 avril à Thennes, espèce notée en avril et mai à Salouel (Ecole d'Infirmières du Nouvel Hôpital), 1 les 9 mai et 22 juin à Conty (Wailly puis localité même), 1 le 10 mai à Corbie.
2 le 19 décembre à Tilloy-les-Conty.

ALOUETTE LULU Lullula arborea
BdS : 1 le 25 mars, 2 en vol vers le nord en environ 3 h le 22 avril, 8 le 31 octobre, 2 le 16 novembre.
1 le 19 avril au HA (E. DELVOYE).

ALOUETTE DES CHAMPS Alauda arvensis
POM : 12 le 5 janvier, construction d'un nid le 13 avril, un accouplement le 19, 33 migratrices en 1 h le 11 décembre.
Plusieurs milliers en fuite vers le sud-ouest après des chutes de neige le 12 janvier entre Amiens et Flixecourt (X. COMMECY).
132 le 22 janvier dans un champ près du HA.
1er chant le 25 janvier à Tilloy-les-Conty.
Abbeville/Le Plessiel (plateau) : plus de 400 le 29 janvier, 154 le 4 mars, chanteurs les 6 avril et 17 septembre.
Abbeville : 2 migrateurs en 4 h le 29 septembre, migration en altitude toute la journée du 8 octobre, 1 migrateur en 1 h le 14, 27 migrateurs en 3 h le 27, 161 migrateurs en 3 h le 12 décembre.
Drucat : min. 10 le 29 janvier, 14 le 9 février, min. 60 le 4 mars, chants notés le 6 avril, 2 chanteurs le 4 août, 1 chanteur le 19, min. 30 individus le 1er octobre.
Airaines : bandes de 20 à 100 en février ; lorsque le sol est couvert de neige, les Alouettes des champs se déplacent du plateau vers la vallée (J.P. FERRE).
78 en vol vers le nord (moyenne horaire : 26 individus) le 22 avril en BdS.

8 en vol vers le sud le 23 novembre à Cayeux-sur-Mer (Le Hourdel), 500 à 700 le 13 décembre à Quend (Froise).

ALOUETTE HAUSSECOL Eremophila alpestris
3 le 20 janvier et 1 vers le 8 novembre à Woignarue.
Cayeux-sur-Mer : 24 ou 25 le 9 février, 5 le 14, 2 le 29 novembre (Le Hourdel) et 32 le 15 décembre (Brighton).
3 le 22 février et 2 le 31 décembre au Crotoy.
4 les 11 et 31 décembre en BdS.

HIRONDELLE DE RIVAGE Riparia riparia
1ères données printanières : 20 le 16 mars à Saint-Valery-sur-Somme et 50 le 17, 1 le 25 en BdS, 15 le 26 à Cayeux-sur-Mer et min. 6 au POM, 2 à Gamaches, 4 à Long-le-Catelet et 3 à Amiens (Ile Sainte-Aragonne) toujours le 26, 50 le 31 entre Noyelles-sur-Mer et Boismont.
38 en vol vers le nord (moyenne horaire : plus de 12 individus) le 22 avril en BdS.
Nidification : Abbeville, Amiens (Longpré), Argoeuves (2 couples présents le 27 mars, 25 à 30 individus le 6 avril, 70 à 80 le 14 avec début du creusage des terriers, 170 le 12 mai avec creusage des terriers, 90 couples nicheurs le 4 juin), Famechon (2 couples), Le Crotoy, Longpré-les-Corps-Saints, POM (10 commencent à fréquenter les terriers le 30 mars, min. 20 individus avec 10 terriers occupés les 2 et 5 avril).
Migration postnuptiale : 500 le 13 août en BdS, 1000 le 14, passage faible le 19 ;
200 le 14 août et 13 migrateurs le 17 au POM ;
400 le 27 août au Crotoy (Saint-Firmin).
Dernières mentions : 200 le 27 septembre à Noyelles-sur-Mer, 5 à la même date et 1 le 5 octobre au Crotoy, 6 le 4 octobre à Tilloy-les-Conty, 1 le 5 à Abbeville et 1 le 12 au POM.

HIRONDELLE RUSTIQUE Hirundo rustica
Arrivées printanières : le 6 mars à Domart-en-Ponthieu, 10 le 16 à Montdidier, espèce notée à cette même date à Boismont et à Noyelles-sur-Mer, 8 le 20 à Boves, 1 le 21 au HA, 1 le 26 à Gamaches et 1 au POM ainsi que 4 à Cayeux-sur-Mer, déjà des chanteurs dans le Marquenterre le 28, 2 le 29 à Airaines et 2 le 30 à Abbeville.
Cette espèce est seulement notée le 11 avril à Saint-Gratien.
Arrivées massives entre les 13 et 18 avril.
18 en vol vers le nord (moyenne horaire : environ 6 individus) le 22 avril en BdS.
400 le 25 avril au HA alors qu'elles n'étaient que 50 le 12.
Nicheuse commune (Amiens, Domart-en-Ponthieu, Poix, Quend, Rue, Saint-Quentin-en-Tourmont dont le POM...).
Migration amorcée dès mi-août : 2 migratrices le 17 au POM.
Rassemblements pré-migratoires : 400 le 27 août ainsi que 130 les 10 et 11 septembre à Saint-Quentin-en-Tourmont, 150 le 6 à Tilloy-les-Conty et 100 le 11 à Forest-Montiers.
Migration postnuptiale à Abbeville : 354 en 4 h le 29 septembre, 17 en 2 h le 5 octobre, 1 en 1 h les 13 et 14.
Léger mouvement de rétromigration le 11 octobre au POM.
Dernières données : 30 le 18 octobre entre Noyelles-sur-Mer et Boismont, 90 en vol vers le sud le 19 au Crotoy, migration

le 21 au POM, 3 le 25 à Boves, 1 le 29 au POM et au Crotoy, 5 le 5 novembre à Mareuil-Caubert, 1 le 13 au Crotoy, 1 le 14 à Rue, 1 ad. 1 juv. le 16 au POM, 1 en vol vers le sud-ouest le 23 à Abbeville mais il ne s'agit pas des dernières mentions puisqu'un individu a été observé le 2 décembre à Abbeville (P. ETIENNE et F. MONTEL).

HIRONDELLE DE FENETRE Delichon urbica

Premières : 3 le 11 avril à Tilloy-les-Conty, ensuite le 14 au Crotoy, le 15 à Famechon, le 16 à Abbeville, le 17 à Velennes, le 20 (10 individus) entre Long-le-Catelet et L'Etoile, le 23 à Airaines mais cette espèce est seulement notée à partir du 4 mai au POM et à Rue ainsi qu'à partir du 7 à Saint-Gratien.

Nicheuse commune (Abbeville, Amiens, un couple construit un nid au-dessus d'un vieux nid d'Hirondelle de cheminée le 7 juin à Famechon, 40 nids occupés à l'hôpital de Doullens, Domart-en-Ponthieu...).

Baisse de la population dans la région de Poix par rapport à 1980.

60 en migration en 4 h le 29 septembre à Abbeville.

Dernières mentions en octobre : passage le 5 et 4 en vol vers le sud le 18 au Crotoy, léger mouvement de rétromigration le 11 et migration le 21 au POM, 8 en migration en 1 h le 13 et 20 en migration en 3 h le 19 à Abbeville.

PIPIT ROUSSELINE Anthus campestris

1 le 12 avril au HA (A.P.O.).

PIPIT DES ARBRES Anthus trivialis

1 chanteur le 5 avril à Blangy-sous-Poix, quelques migrateurs le 12 au HA, 3 en vol vers l'ouest le 13 au Crotoy, 1 chanteur le 29 à Conty, 1 chanteur le 12 mai à Abbeville, 1 chanteur le 31 à Saint-Gratien où l'espèce est nicheuse probable.

Nidification notée à Poix : 1 nid le 24 mai, 1 juv. volant le 27 juin...

Migration en août au POM : 3 en vol vers le sud le 13, 1 en vol vers le sud-est le 16.

Dernières mentions : 2 le 12 septembre et 1 le 27 à Noyelles-sur-Mer, 3 migrateurs le 2 octobre au POM.

PIPIT A GORGE ROUSSE Anthus cervinus

1ère mention de cette espèce dans la Somme pour la deuxième moitié du XXème Siècle : 1 en plumage nuptial le 25 mars en BdS (G. FLOHART et P. RAEVEL).

PIPIT FARLOUSE Anthus pratensis

1ers chants notés le 3 mars à Rue (3 individus différents) où l'espèce se reproduit : 1 couple nourrit des pulli le 13 mai... Chant un peu plus tardif à l'intérieur : le 10 mars à Hornoy. 1 couple nourrit des pulli les 11 et 13 mai au POM.

Espèce suivie régulièrement dans la vallée de la Bouvaque par F. MONTEL

Abbeville : min. 5 le 8 janvier, 12 le 29, 2 le 9 février, min. 18 le 13, min. 12 le 4 mars, cantonnement noté le 22 avril, 3 le 28, 1 couple transporte de la nourriture les 1er et 5

juin, 2 chanteurs le 19, 5 individus le 7 juillet, 1 les 15 et 17, 2 le 6 août, migration nette de fin septembre jusqu'à mi-octobre (18 en 4 h le 30 septembre, 29 en 2 h le 5 octobre, 3 en 1 h le 8, 8 en 1 h le 13 et 21 en 3 h le 19), 1 les 21 et 28 octobre ainsi que le 4 novembre, 2 le 5 novembre, 3 le 12 et 31 le 21, 2 le 9 décembre, 1 les 15 et 16, min. 16 le 19 et min. 30 le 21.
Drucat : plus de 50 le 8 janvier, plus qu'un le 16, min. 14 le 22 octobre.

PIPIT SPIONCELLE Anthus spinoletta
* sous-espèce non précisée
Espèce notée en février à Airaines et le 12 avril au HA, 1 le 21 décembre en BdS, 1 les 6 novembre et 23 décembre à Quend.
* type A. sp. spinoletta
1 du 3 décembre 1980 au 20 mars 1981 (à cette date, l'oiseau est en plumage nuptial) et 1 du 20 novembre au 21 décembre à Abbeville.
* maritime A. sp. petrosus
1 le 31 janvier à Saint-Valery-sur-Somme, 1 les 21 mars et 14 novembre au HA, 15 le 28 décembre en BdS.

BERGERONNETTE PRINTANIERE Motacilla flava
* type M. f. flava
BdS : 1 le 4 avril, 1 mâle le 20, 6 le 19 août, 10 en vol vers le sud et 35 au dortoir le 25.
HA : 20 le 31 mars, 2 le 9 avril, 1 mâle 3 femelles le 17, 5 le 19, 20 le 28.
3 le 4 avril à Noyelles-sur-Mer et 1 le 6 au POM.
A l'intérieur, elle est notée un peu plus tardivement que sur sur le littoral lors de la remontée printanière : 1 mâle le 21 avril à Abbeville, 1 mâle les 24 et 27 à Amiens, 3 le 27 à Estrées-Mons et 1 le 6 mai à Frise.
1 couple nicheur alarme le 5 juin à Roye, 1 couple nourrit des jeunes volants le 13 à Famechon.
4 le 1er octobre à Drucat, 1 les 1er et 6 à Amiens ainsi qu'un individu le 3 au Crotoy.
* flavéole M. f. flavissima
3 mâles le 12 avril et 10 le 28 au HA, 2 le 14 à Port-le-Grand ; 1 mâle les 14, 21 et 28 à Abbeville ; 3 le 6 mai à Noyelles-sur-Mer, 1 mâle le 18 à Roye, 2 le 1er juin à Fossemanant, 2 avec 3 types le 18 à Quend (Froise).
1 mâle les 19 avril, 1er mai et 16 août au POM.
1 couple transporte de la nourriture le 27 mai au HA (J.P. DAUSSY, B. et F. MONTEL).

BERGERONNETTE DES RUISSEAUX Motacilla cinerea
Signalée de janvier à avril à Airaines, 1 du 1er au 31 janvier à Tilloy-les-Conty et 2 le 22 mars ainsi qu'un mâle le 1er avril, 3 le 4 janvier à Famechon.
Poix : 1 les 4 janvier, 1er et 25 février, 1er et 15 mars, 23 juin et 27 décembre.
Amiens : 1 les 5 et 19 janvier ainsi que les 3, 9 et 22 mars, 6 octobre et 27 décembre.
Abbeville (stationnement) : 3 les 8 et 29 janvier, 9 le 9 février, 3 le 13,
1 les 1er, 7 et 30 septembre et du 8 au 21 octobre, 2 le 27

octobre, 1 du 4 au 20 novembre, 2 les 25 novembre et 1er décembre, 3 les 2 et 9 décembre, 2 les 15 et 16, 5 le 19 et 4 le 21 ;
(migration) : 3 en 4 h le 28 septembre, 1 en 3 h le 19 octobre.
2 le 9 février à Drucat, 1 le 21 mars à Corbie, 2 le 21 avril en BdS, 2 le 30 à Velennes, 1 le 25 avril et 2 le 16 septembre à Noyelles-sur-Mer, 1 les 5 mai et 28 décembre à Bergicourt, 1 le 2 septembre à Grand-Laviers, 2 le 6 entre Le Crotoy et Saint-Quentin-en-Tourmont (Le Bout des Crocs), 6 le 29 à Bray-sur-Somme.
Tilloy-les-Conty : 1 le 8 septembre, 2 le 27, 1 du 18 octobre au 6 décembre.
1 du 1er au 25 octobre au POM, 1 le 17 entre Noyelles-sur-Mer et Boismont, 1 le 30 à Saint-Valery-sur-Somme.
En conclusion, cette espèce est surtout remarquée en migration et en hivernage (principalement septembre à avril).

BERGERONNETTE GRISE Motacilla alba
* type M. a. alba
POM : 1er chant le 17 mars, 1 accouplement le 10 avril, nourrissages de pulli le 6 août...
22 (dont 2 en vol vers le nord) le 25 mars en BdS.
HA : 10 le 31 mars, 20 le 17 avril, 1 le 27 décembre.
Nicheuse à Abbeville et Roye notamment.
Min. 15 le 2 septembre à Grand-Laviers (bassins de décantation).
Migration postnuptiale suivie à Abbeville : 3 en 4 h le 28 septembre, 3 en 2 h le 5 octobre, 1 en 1 h les 13 et 14, 2 en 3 h le 19.
* de Yarrel M. a. yarrelli
POM : 1 les 11 et 28 mars, 1 mâle le 4 avril, 1 femelle du 2 au 21 mai, 1 femelle transporte des matériaux le 25 juin.
1 le 26 mars et le 12 avril au HA, 1 le 26 mars à Cayeux-sur-Mer.
BdS : 2 le 15 mars, 3 le 25, 1 femelle le 21 avril, 1 les 20 et 28 décembre.
1 le 12 avril à Ault (Bois de Cise), 1 en avril à Quend (Froise) et 1 le 31 juillet (Quend-Plage).
Seule donnée à l'intérieur des terres : 1 le 11 novembre à Tilloy-les-Conty (B. COUVREUR).
* hybride M. a. alba x yarrelli
1 mâle du 8 mars au 30 août au POM.

PIE-GRIECHE GRISE Lanius excubitor
1 les 5 janvier et 11 novembre à Quend, 1 le 12 janvier à Loeuilly, 1 le 17 février à Neuilly-l'Hôpital, 1 le 17 mars à Bergicourt et 1 le 26 à Long-le-Catelet, 1 les 5 mai à Rue (Larronville) et 28 juillet, 1 le 28 octobre à Saint-Sauveur, 1 le 14 novembre à Braches et 1 à Courtemanche.

TROGLODYTE Troglodytes troglodytes
Nidification : transport de matériaux le 5 avril à Bergicourt, jeunes quittent un nid vers le 15 août à Amiens, notée à Rue, construction d'un nid le 24 mai à Poix...
Comportement : 21 se couchent dans un vieux nid d'Ecureuil entre 17 h 26 et 17 h 36 TU le 21 février à Blangy-sous-Poix (J.C. ROBERT).

ACCENTEUR MOUCHET Prunella modularis
1er chant le 26 janvier au POM.
Nicheur commun (HA,Rue...).

TRAQUET TARIER Saxicola rubetra
1 mâle le 21 avril au Crotoy (La Maye) est le 1er individu noté cette année.
1 mâle le 1er mai à Bergicourt, 1 mâle le 11 à Bray-sur-Somme, 1 mâle les 11 et 13 au POM.
Commun à partir du 17 août dans le secteur littoral selon G. FLOHART : 3 à Saint-Quentin-en-Tourmont...
1 mâle le 7 septembre à Famechon et 51 au Crotoy, 4 le 17 au Mesge et 2 en BdS, 1 mâle le 27 à Quend (Froise).
Dernières mentions : 1 les 5 et 17 octobre au POM, 1 le 29 octobre et 2 le 30 novembre au Crotoy.

TRAQUET PATRE Saxicola torquata
1 couple le 4 janvier à Famechon puis 1 mâle le 29 mars.
1 mâle 1 femelle hivernants le 1er février au HA, c'est probablement ces 2 individus qui furent revus le 15 mars.
1 le 15 février à Ault (Bois de Cise).
Retour à l'intérieur des terres : 1 mâle 1 femelle le 9 mars à Fouencamps.
1 couple du 15 mars au 28 avril à Airaines, 1 couple le 28 avril à Métigny... Peu de données sont significatives.
POM : 1 mâle 1 femelle le 17 mars (1ère mention de l'année en ce lieu), 1 mâle le 28, 1 les 5 et 15 avril et du 2 au 29 mai, 1 mâle le 30 juin, 1 les 11 et 18 octobre.
BdS : 4 im. le 17 juin nés très probablement dans les environs vu la date (de même pour 2 juv. notés le 5 au HA), 1 les 17 septembre et 30 octobre.
Nidification signalée à Abbeville, Airaines (jeunes à l'envol le 18 juin...).
La dernière mention à l'intérieur des terres est celle d'un mâle le 29 octobre à Saleux.
A la fin de l'année, l'hivernage est à nouveau constaté sur le littoral : 1 du 14 au 30 décembre au HA, 1 le 15 à Cayeux-sur-Mer (Le Hourdel), 1 le 20 à Saint-Valery-sur-Somme.

TRAQUET MOTTEUX Oenanthe oenanthe
HA : 1 mâle le 15 mars (1ère donnée pour cette année), 1 mâle chanteur le 5 avril, 4 mâles 2 femelles le 9, +15 (4/5 de mâles) le 12, 3 couples le 17, 5 couples le 28, 2 mâles 1 femelle le 2 mai, 3 couples le 15, 1 individu le 31, 1 ad. 1 im. le 16 septembre, 1 les 10 et 18 octobre.
La migration prénuptiale se déroule du 15 mars au 31 mai. La donnée du 17 juin en BdS concerne-t-elle un nicheur dans les dunes ? Le passage postnuptial est remarqué du 13 août au 18 octobre (1 les 10 et 18 octobre au POM, de même pour le HA).

ROUGEQUEUE NOIR Phoenicurus ochruros
Une seule mention d'hivernant : 1 mâle le 1er février à Cayeux-sur-Mer (Le Hourdel).
Les 1ers migrateurs sont notés dans la première quinzaine de mars : 1 du 5 mars au 28 avril à Airaines, 1 mâle le 11 mars à Velennes ; 1 chanteur le 14 à Saint-Gratien, 1 mâle à

Fienvillers et 1 chanteur à Saint-Valery-sur-Somme ; 1er chanteur le 15 à Famechon, 1 chanteur le 16 à Amiens et 1 chanteur à Beauval.
Chanteurs déjà fréquents dans le Marquenterre à partir du 24 mars (Quend, Rue, Saint-Quentin-en-Tourmont...).
Envol des premiers jeunes début juin : 1 mâle juv. le 9 à Poix.
Dernières mentions de migrateurs : 1 le 30 septembre à Abbeville, 1 le 28 octobre à Velennes, 1 mâle les 27 octobre et 2 novembre au POM.
Hivernage à nouveau noté à la fin de l'année : 1 le 19 décembre à Ault.

ROUGEQUEUE A FRONT BLANC Phoenicurus phoenicurus
1ère donnée de l'année : 1 mâle le 21 avril à Saint-Quentin-en-Tourmont.
1 le 2 mai à Noyelles-sur-Mer, 1 mâle chanteur le 3 en forêt de Crécy.
Amiens : 1 du 18 au 29 mai, apparemment supplanté ensuite par un Rougequeue noir (C. et R. DEVISSE).
1 mâle chanteur le 10 juin à Famechon.
POM : 1 mâle le 11 juillet, 1 du 14 août au 19 septembre et le 17 octobre.
1 le 26 juillet à Quend (Froise), 1 le 3 septembre à Rue et 1 le 6 au HA.

ROUGEGORGE Erithacus rubecula
Nidification à Thennes (1 nid le 17 mai...)...
Envol des 1ers jeunes mi-juin : 1 juv. le 14 à Poix.

ROSSIGNOL PHILOMELE Luscinia megarhynchos
1ers chanteurs le 3 avril à Boves, le 10 au POM et à Famechon, le 11 à Saint-Gratien puis le 14 à Velennes et au Crotoy.
POM : 1 chanteur le 10 avril, espèce nicheuse, 1 chanteur du 13 au 27 août.
Très forte densité de chanteurs (11-12) dans les dunes boisées et les étendues de buissons au nord de la BdS, Saint-Quentin-en-Tourmont le 20 avril.

GRIVE LITORNE Turdus pilaris
100 le 25 janvier à Velennes et 50 le 4 février, 30 le 26 février à Beauval et 20 à 25 à Famechon, 200 le 28 à Airaines, 80 le 25 à Camps-en-Amiènois et 260 le 26 à Frémontiers.
Dernières mentions pour l'hivernage 1980-81 : 50 le 3 mars à Bergicourt, 60 le 4 à Conty (Wailly), 50 le 9 à Velennes, 200 le 13 à Saveuse.
Donnée la plus tardive : 2 le 2 mai à Fleury (J.C. ROBERT) ; il faut rappeller que cette espèce se reproduit désormais dans l'Aisne.
min. 70 le 29 novembre et 87 le 6 décembre à Quend (Froise).
POM : 25 le 9 février, min. 10 le 19, 1 le 17 octobre, 6 migratrices le 18, 3 en vol vers le sud le 24 novembre, 453 migratrices en 1 h le 11 décembre.
2 le 28 octobre à La Chaussée-Tirancourt, 5 le 12 novembre à Cléry-sur-Somme, 300 le 7 décembre à Frémontiers, 130 le 27 au HA.

MERLE A PLASTRON Turdus torquatus
1 mâle le 17 avril au HA, 1 mâle le 7 mai à Villers-sur-Authie (marais de Colline).

MERLE NOIR Turdus merula
25 le 13 janvier à Amiens (Cité scolaire).
1ers chants le 25 janvier à Tilloy-les-Conty et le 8 février à Saint-Gratien.
Nidification : 1 mâle transporte de la nourriture (Lombrics) toute la journée vers un parc (nid dans un grand Saule) le 26 février (J.C. ROBERT), construction d'un nid le 6 mars et 3 pulli au nid le 29 mai à Amiens ;
1 nid/4 oeufs le 3 mai à Famechon ;
1 jeune volant le 7 mai à Fossemanant et 1 mâle couve un nid avec 2 oeufs et 3 pulli le 1er juin ;
nids/pulli le 14 juin à Poix ;
nidification signalée également au HA, à Rue, Saint-Quentin-en-Tourmont...

GRIVE MAUVIS Turdus iliacus
Dernières données pour l'hiver 1980-81 : 20 le 14 mars à Fienvillers, 1 le 15 à Rue, 5 le 20 à Poix et 1 le 22, espèce notée le 21 à Noyelles-sur-Mer et 2 le 26 à Amiens (Ile Sainte-Aragonne), 35 à 40 du 20 au 22 avril au Crotoy (La Maye).
POM : 1 migratrice le 30 août (D. FOSSE), il s'agit d'une date très précoce puisque jusqu'à présent cette espèce n'avait jamais été observée dans la Somme avant le 9 septembre, date déjà remarquable ;
3 migratrices le 12 octobre, 20 migratrices le 24, 45 migratrices en 1 h le 11 décembre.
1 le 18 octobre et 40 le 27 décembre au HA, 30 le 24 octobre à Boves, min. 34 le 8 novembre à Quend (Froise), min. 5 le 22 à Amiens (Cimetière de La Madeleine).

GRIVE MUSICIENNE Turdus philomelos
POM : 1er chant le 26 janvier, espèce nicheuse, 2 en vol vers le sud le 24 novembre, 47 migratrices en 1 h le 11 décembre.
1er chant le 31 janvier à Saint-Gratien où l'espèce chante toujours le 15 septembre.
Nidification : couvaison notée le 11 avril et 4 juv. s'envolent le 10 mai à Thennes, 1 nid/5 oeufs le 22 avril à Frémontiers, nidification notée à Saint-Quentin-en-Tourmont, 1 nid/5 jeunes prêts à l'envol le 11 juin à Conty (Wailly).
Migration constatée le 20 novembre à Amiens et Corbie.

GRIVE DRAINE Turdus viscivorus
1er chant le 21 janvier à Saint-Gratien.
Quelques couples cantonnés (mâles chanteurs, transports de matériaux) dans la dernière décade de mars dans le Marquenterre (Le Crotoy, POM, Quend...).
La plupart des données ne sont pas significatives si ce n'est celles de nidification (Abbeville, Ponthoile).
POM : 1er chant le 9 février, espèce notée régulièrement d'avril à juillet, 11 le 11 octobre, 5 dont 1 migratrice le 18.

BOUSCARLE DE CETTI Cettia cetti
1 chanteur le 15 mars à Boismont et 2 chanteurs le 26, 1 le 26 à Longpré-les-Corps-Saints, 1 chanteur le 31 à Velennes, 2 les 3 avril et 12 mai à Boves (espèce notée également les 17 mai et 24 octobre), 1 le 4 avril en BdS, 1 le 13 entre Boves et Longueau, 1 chanteur le 20 entre Long-le-Catelet et L'Etoile, 1 le 22 à Amiens (Longpré), 1 chanteur le 6 mai à Port-le-Grand (Petit-Port), 1 le 17 à Fouencamps, espèce notée vers le 5 avril et 1 chanteur le 13 mai à Rue.
Noyelles-sur-Mer : 1 chanteur les 10 mars et 9 avril, 2 les 25 et 28 avril, 1 les 13 et 27 septembre.
1 chanteur le 6 mai à Brie et 1 à 2 chanteurs à Cléry-sur-Somme, 1 chanteur le 19 à Amiens (Marais du Bout du Monde).
POM : 1 chanteur du 16 septembre au 20 octobre, 2 chanteurs le 21 octobre, 1 chanteur du 24 octobre au 4 novembre.
2 chanteurs le 9 novembre à Abbeville, 1 le 12 à Cléry-sur-Somme.
Cette espèce est bien répandue dans l'ensemble des zones humides du Marquenterre.

LOCUSTELLE LUSCINIOIDE Locustella luscinioides
Plusieurs chanteurs le 4 avril à Rue (marais de Rue), 1 chanteur le 5 à Noyelles-sur-Mer et 2 le 19, 1 chanteur le 7 mai à Villers-sur-Authie (marais de Colline) et 1 le 21 août au POM.

LOCUSTELLE TACHETEE Locustella naevia
POM : 1 chanteur les 25 mars et 11 avril, 2 chanteurs le 12 avril, 3 chanteurs le 21, 1 chanteur le 25 août.
1 le 3 avril à Boves, 1 le 14 au Crotoy, 1 chanteur le 20 à Famechon, 5 chanteurs le 21 au Crotoy (La Maye), 6 à 7 chanteurs le 26 à Noyelles-sur-Mer (Renclôture Elluin).
Commune en forêt de Crécy (clairières) selon G. FLOHART.

PHRAGMITE DES JONCS Acrocephalus schoenobaenus
Noyelles-sur-Mer : 1ère donnée avec 1 chanteur le 26 mars, 5 à 6 chanteurs le 19 avril, 2 le 16 septembre.
1 le 31 mars et 9 à 10 chanteurs le 9 avril au HA, espèce notée vers le 5 avril et 5 à 6 chanteurs le 22 à Rue.
Nicheur notamment au POM (12 à 13 chanteurs le 21 avril...) et à Quend.

ROUSSEROLLE VERDEROLLE Acrocephalus palustris
Rue : 1er chanteur le 22 avril, 1 chanteur les 4 et 5 juin, espèce nicheuse, 1 chanteur le 8 juillet.
2 le 14 mai à Villers-sur-Authie (marais de Colline), 2 chanteurs le 20 à Argoeuves.
POM : 1 chanteur du 31 mai au 23 juin, 1 les 23 et 24 août, 2 les 27 et 29.
Cette espèce a été relativement abondante cette année dans le Marquenterre : Villers-sur-Authie, Rue, POM, Favières, Le Crotoy ...
3 chanteurs le 1er juin à Fossemanant et 1 chanteur le 2 à Bergicourt.

ROUSSEROLLE EFFARVATTE Acrocephalus scirpaceus
1ères données : 1 chanteur le 26 mars à Noyelles-sur-Mer, ensuite

1 chanteur à Saint-Quentin-en-Tourmont (Le Bout des Crocs)le 28.
Arrivée plus tardive à l'intérieur : 1 le 9 avril à Boves.
Nidification constatée le 28 mai (nourrissages) à Noyelles-sur-Mer.
POM : 1 chanteur les 19 mai et 8 juin, 2 chanteurs le 14 juin, 1 chanteur du 22 juin au 31 juillet, 1 chanteur le 23 août, 1 du 9 au 17 septembre.
Dernières mentions : 1 chanteur le 6 septembre au HA, 1 du 9 au 19 au POM ;
1 le 30 à Abbeville (P. ETIENNE et F. MONTEL).

ROUSSEROLLE TURDOIDE Acrocephalus arundinaceus
1 chanteur le 11 mai à Amiens (marais du Bout du Monde), 1 chanteur le 17 à Hailles, 2 chanteurs le 5 juin et 1 chanteur le 11 au HA.

HYPOLAIS ICTERINE Hippolais icterina
1 chanteur, en migration, le 9 mai à Saint-Gratien ; 1 individu capturé le 27 au Crotoy, 1 chanteur le 5 juin à Roye, 1 chanteur les 29 juin et 4 juillet à Rue où l'espèce est nicheuse probable.

HYPOLAIS POLYGLOTTE Hippolais polyglotta
1ère donnée : 1 individu le 24 avril à Amiens (N. RANSON), il s'agit de la date la plus précoce connue pour cette espèce dans la Somme ; auparavant cette date était le 28 avril 1980.
1 chanteur le 5 mai au POM ; 6 (dont 4 chanteurs) le 13 juillet dans une clairière de la forêt de Crécy (G. FLOHART) ; 1 chanteur le 5 août à Méréaucourt, 1 le 17 à Abbeville.

FAUVETTE DES JARDINS Sylvia borin
1 chanteur le 28 avril à Noyelles-sur-Mer, chanteurs le 29 à Saint-Gratien et Conty (bois de Wailly), ensuite l'espèce est notée le 30 à Contre et Velennes.
Nicheuse à Rue où le dernier individu est noté le 2 septembre.

FAUVETTE A TETE NOIRE Sylvia atricapilla
1ères données : 1 chanteur le 9 mars à Amiens, 2 mâles le 22 à Velennes, 5 chanteurs le 26 à Boismont, 1 chanteur le 27 à Saint-Gratien ainsi qu'un chanteur à Rue suivi d'un chanteur le 30 à Beauval.
Ensuite retour massif des migratrices en avril : le 1er à Frémontiers, le 3 à Boves, le 6 à Tilloy-lès-Conty, le 7 à Airaines, le 11 à Poix (2 mâles) et le 12 à Thennes.
Baisse de la population dans la région de Poix par rapport à 1980.
Nidification (Rue...).
Dernières données de migratrices : min. 3 le 17 octobre au POM et 1 mâle le 31 à Amiens.
1 hivernante le 23 décembre à Blangy-sous-Poix, 1 mâle le 28 en bordure de la BdS.

FAUVETTE BABILLARDE Sylvia curruca
1er chanteur le 16 avril au Crotoy, 1 chanteur le 19 à Saint-Gratien, 1 chanteur le 28 à Conty, ensuite 1 chanteur le 29 à Wailly (commune de Conty) puis 1 chanteur le 30 à Etinehem.
1 le 9 juin à Poix.

POM : 1 chanteur les 18 et 20 avril, 2 chanteurs du 1er mai au 26 juin, 1 chanteur du 1er au 31 juillet, 1 le 29 août. 1 chanteur le 22 juin à Fossemanant, 1 chanteur le 5 juillet à Bernay-en-Ponthieu, 1 les 15 juillet et 3 août à Quend (Froise), 1 chanteur le 1er septembre à Abbeville.

FAUVETTE GRISETTE Sylvia communis
1ère mention de l'année le 20 avril au Crotoy (La Maye) où 6 chanteurs sont notés le 21.
POM : 2 chanteurs le 26 avril, 3 chanteurs le 1er mai, min. 5 chanteurs le 20 juin, 3 chanteurs le 13 juillet, 1 chanteur les 18 et 29, 1 le 30 août.
4 dont 1 construisant 1 nid le 27 avril à Roye, 1 chanteur le 28 à Ignaucourt.
Dernière mention : 1 le 1er octobre à Drucat.

CISTICOLE DES JONCS Cisticola juncidis
POM : 1 chanteur du 12 au 28 avril, 2 chanteurs du 29 avril au 16 mai, 1 chanteur du 17 au 22 mai ainsi que le 12 juin et du 20 juillet au 10 août, 2 chanteurs les 12 et 18 août, 3 chanteurs le 22, 1 chanteur du 23 août au 27 septembre, 1 le 12 octobre.
1 chanteur les 20 juillet et 18 août à Saint-Quentin-en-Tourmont, 1 le 3 août et 2 le 28 en bordure de la BdS, 1 chanteur le 26 au Crotoy.
Noyelles-sur-Mer : 6 chanteurs le 30 août, 1 les 13 et 27 septembre.

POUILLOT FITIS Phylloscopus trochilus
1ères données fin mars : 1 le 23 au POM, 4 chanteurs le 26 à Amiens (Ile Sainte-Aragonne), le 28 à Velennes et Famechon, 3 le 31 au HA.
Puis 1 chanteur le 5 avril à Bergicourt, 1 le 6 à Tilloy-les-Conty, 1 chanteur le 9 à Saint-Gratien.
Nidification (POM...).
Migration constatée le 25 août au POM.
Dernières mentions : 1 chanteur le 15 septembre à Saint-Gratien, 1 chanteur le 7 septembre et 2 individus le 3 octobre au Crotoy, min. 3 le 5 octobre et 1 le 12 au POM.

POUILLOT VELOCE Phylloscopus collybita
Hivernage noté à Poix : 1 les 18 janvier et 1er février.
1 hivernant (à moins qu'il ne s'agisse d'un migrateur précoce) le 22 février à Airaines.
Arrivée massive en mars : 3 chanteurs le 5 à Fossemanant, 1 du 5 au 13 au POM, 1 le 9 à Fouencamps, 1 chanteur les 11 et 15 à Frémontiers, 1 chanteur le 13 à Rue, 1 le 14 à Saint-Valery-sur-Somme, 1 chanteur le 15 à Saint-Gratien et 2 chanteurs à Boismont, 1 le 16 à Long-le-Catelet (puis 2 ou 3 chanteurs le 23), 1 chanteur le 21 à Molliens-Vidame, 1 le 22 à Tilloy-les-Conty et 1 à Poix ainsi que 1 au HA le 31.
Nidification (Rue, POM...).
Envol des 1ers jeunes fin juin : 2 juv. le 27 à Poix.
1 (migrateur tardif) le 6 novembre en BdS, 2 le 12 à Péronne.
Hivernage noté à Abbeville : 10 le 16 décembre.

ROITELET HUPPE Regulus regulus
Essentiellement hivernant (12 localités en janvier et février). 2 le 5 mars à Fossemanant, quelques chanteurs le 28 à Saint-Quentin-en-Tourmont et 1 individu le 19 avril à Velennes, 1 ad. 1 juv. le 16 juin à Namps-au-Val, min. 10 le 22 novembre à Amiens (La Madeleine), 40 le 31 décembre à Auchonvillers.

ROITELET TRIPLE-BANDEAU Regulus ignicapillus
1 chanteur le 28 mars à Saint-Quentin-en-Tourmont.
Autres données non significatives.

GOBEMOUCHE NOIR Ficedula hypoleuca
1 le 3 septembre à Rue, 1 les 13 septembre et 8 octobre au POM, 3 (dont 1 chanteur) le 13 septembre ainsi que 1 les 15 et 23 au Crotoy, 1 le 13 à Noyelles-sur-Mer, 1 les 19 et 26 à Quend (Froise et Quend-Plage).

GOBEMOUCHE GRIS Muscicapa striata
Nicheur à Airaines (jeunes le 29 juin...) et Beauquesne.
Signalé en période de reproduction à Blangy-sous-Poix, Boismont et au POM.

MESANGE A MOUSTACHES Panurus biarmicus
Noyelles-sur-Mer : 3 le 21 mars, 1 mâle chanteur le 26, 2 individus le 19 avril, 5 à 6 mâles le 28, 6 le 2 mai, +30 le 26 août, 2 le 16 septembre, 1 le 27.
Espèce notée le 4 avril à Rue et 1 mâle transporte de la nourriture le 30 mai.
HA : 2 couples nicheurs, 7 à 8 le 22 mai, 2 familles d'environ 10 individus pendant l'automne, espèce notée vers le 8 novembre.

MESANGE A LONGUE QUEUE Aegithalos caudatus
Nidification : nid en cours de construction le 21 mars à Frémontiers, 1 couple/7 juvéniles le 24 mai à Poix, notée au POM.

MESANGE NONNETTE Parus palustris
Espèce notée les 2 janvier et 31 décembre en forêt de Crécy, 2 le 22 janvier au POM, chanteurs le 25 à Saint-Gratien, 1 le 14 juin à Blangy-sous-Poix.

MESANGE BOREALE Parus atricapillus
Beaucoup plus commune que l'espèce précédente.

MESANGE HUPPEE Parus cristatus
Peu de données significatives : nicheuse au POM, 1 chanteur le 10 septembre au Crotoy...

MESANGE NOIRE Parus ater
2 le 1er janvier en forêt de Crécy.
Amiens : chanteurs notés les 11 février, 3 et 25 septembre ; min. 2 le 22 novembre (La Madeleine).
1 le 3 mars à Bergicourt, 1 trouvée morte le 9 à Velennes, 1 le 16 juin à Namps-au-Val, chanteurs le 6 septembre et 1 bande le 27 à Saint-Gratien.
POM : 1 le 6 septembre, min. 15 le 16, 26 migratrices le 27, 2 le 4 octobre, 4 le 11, 8 le 25, 4 le 6 novembre.

3 le 12 septembre à Noyelles-sur-Mer, 6 le 13 septembre et 1 le 8 novembre à Quend (Froise et Quend-Plage), migration le 27 octobre en BdS, 2 le 31 décembre à Auchonvillers.

MESANGE BLEUE Parus caeruleus
Nidification à Poix (construction d'un nid dans un nichoir le 19 avril, juv. volants le 14 juin...), Rue, Saint-Quentin-en-Tourmont (1 couple/pulli le 19 mai...)...
Migration le 27 octobre en BdS.

MESANGE CHARBONNIERE Parus major
1er chant le 8 janvier au POM.
Nidification à Dernancourt, Poix (construction d'un nid dans un nichoir le 19 avril...), Saveuse (1 nid dans un nichoir/10 oeufs le 23 mars, 10 pulli le 9 avril...)...
Migration le 27 octobre en BdS.

SITTELLE TORCHEPOT Sitta europaea
Espèce signalée en février et 1 couple le 2 avril à Heucourt-Croquoison.
Conty (bois de Wailly) : 2 chanteurs le 18 mars, 1 couple le 29 avril et 4 individus le 11 juin.
3 le 26 mars à Boismont, espèce commune en forêt de Crécy où 1 nid est en cours d'aménagement le 29 mars, 1 couple (accouplement) le 2 avril à Epaumesnil (J.P. FERRE), formation d'un couple le 6 à Tilloy-les-Conty, 1 individu le 6 mai à Frémontiers, 1 juv. le 23 juin à Blangy-sous-Poix.
1 le 21 août à Saint-Quentin-en-Tourmont ; dans le Marquenterre, cette espèce est toujours rare.
1 chanteur le 23 août à Saint-Gratien, c'est la première mention de cette espèce dans cette localité où des observations régulières sont effectuées depuis plus de 10 ans.

GRIMPEREAU DES JARDINS Certhia brachydactyla
Nicheur à Quend...
Autres données non significatives.

BRUANT PROYER Emberiza calandra
20 le 8 janvier à Airaines ; seulement quelques autres hivernants sont signalés : 1 le 2 février à Saveuse, 1 le 22 janvier et 2 le 17 février au Crotoy.
1er chant le 3 mars à Camon.
40 le 9 décembre à Abbeville.

BRUANT JAUNE Emberiza citrinella
1er chant le 3 mars à Rue.
Dortoir d'environ 100 individus le 21 mars à Noyelles-sur-Mer.
Nicheur commun (un nid avec 1er oeuf le 20 avril à Famechon, Quend, POM...).
1 en vol vers le sud-ouest le 25 août au POM.
Dortoir de 35 individus le 21 décembre à Famechon.

BRUANT ZIZI Emberiza cirlus
1 mâle le 3 janvier à Poix, 1er chant le 28 à Amiens (Cité scolaire).
1 femelle le 1er février à Fort-Mahon (H. DUPUICH, A. DUPUIS

et E. MERCIER), cette espèce est toujours rare sur le littoral de la Somme et l'hivernage n'y avait pas encore été constaté. Une nouvelle mention d'hivernage sur le littoral ensuite : 1 femelle le 20 décembre au HA (H. DUPUICH et G.E.P.O.P.).
1 chanteur le 24 mars à Dury, 1 chanteur le 10 avril à Quevauvillers, 1 chanteur le 12 juin à Famechon.
1 mâle le 26 février et 2 mâles le 23 décembre à Blangy-sous-Poix.

BRUANT DES ROSEAUX Emberiza schoeniclus
1er chant le 11 mars au POM, 30 le 31 mars et 20 le 17 avril au HA.
2 ad./1 nid/5 oeufs le 7 mai à Fossemanant et 1 nid/4 oeufs le 22 juin.
Toujours nicheur à Airaines sur le plateau à environ 1 km de toute eau (J.P. FERRE).
1 mâle 2 femelles dans un champ de Vesce Vicia sp. le 12 juillet à Thennes (P. ROYER).

BRUANT DES NEIGES Plectrophenax nivalis
Cayeux-sur-Mer : 1 le 10 janvier, 3 le 18 (Brighton), 1 mâle 2 femelles les 21 et 25 (Le Hourdel), 1 femelle le 15 décembre (Brighton).
HA : 13 le 18 janvier, 18 les 23 et 25, 1 mâle 2 femelles le 10 mars, 15 le 15, 2 mâles 2 femelles le 8 avril, 14 le 29 novembre, 3 le 20 décembre.
1 mâles 2 femelles le 15 février en BdA, 2 mâles 2 femelles le 23 novembre à Woignarue, 1 les 14 et 27 décembre ainsi que 5 le 28 en BdS.

BRUANT LAPON Calcarius lapponicus
1 femelle du 18 au 23 janvier au HA (X. COMMECY et P. TRIPLET).

PINSON DES ARBRES Fringilla coelebs
Nidification à Blangy-sous-Poix (nids dans Peupliers Populus sp. le 15 avril...)...
POM : 300 le 9 octobre, léger mouvement de rétromigration le 11, 16 migrateurs en 1 h le 11 décembre.
65 en vol vers le sud le 23 novembre à Fort-Mahon et 40 en vol vers le sud à Quend.

PINSON DU NORD Fringilla montifringilla
Espèce notée en janvier et février à Airaines, 30 le 25 janvier à Fouencamps, 1 le 28 à Cléry-sur-Somme, 4 le 8 février à Thennes, 1 le 12 mars à Frémontiers, 40 le 13 à Thieulloy-l'Abbaye, 1 le 26 à Roye, 3 le 20 avril à Famechon.
BdS : 4 en vol vers le nord-ouest le 25 mars, 20 le 20 décembre et 1 le 28.
2 (dont 1 migrateur) le 17 octobre et 1 le 3 novembre au POM, 1 mâle le 30 octobre à Quend, 80 le 7 décembre à Conty (Wailly) et 1 le 18 à Rue.

VERDIER D'EUROPE Carduelis chloris
200 le 8 février à Famechon, 1er chant le 21 mars à Rue, 20 à 25 couples cantonnés (mâles chantent et paradent) du 20 au 22 avril dans les dunes boisées de Saint-Quentin-en-Tourmont.

Nicheur à Roye et Rue...
+100 le 22 novembre à Amiens (La Madeleine).

CHARDONNERET Carduelis carduelis
9 en vol vers le nord-nord-ouest le 11 mars au POM.
Environ 10 couples cantonnés du 20 au 22 avril dans les dunes boisées de Saint-Quentin-en-Tourmont.
Nidification à Rue et Saint-Quentin-en-Tourmont (1 nid/4 pulli mi-mai...)...
70 le 6 septembre au HA.

TARIN DES AULNES Carduelis spinus
POM : 2 le 5 janvier, 15 le 11 octobre, 30 le 30, min. 40 le 1er novembre, 75 en vol vers le sud le 11 décembre.
2 le 11 février à Boves, 20 le 15 à Airaines, 5 le 18 mars à Fossemanant.
BdS : 5 en vol vers le nord le 22 avril, min. 500 migrateurs en 2 h le 27 octobre, 3 les 16 novembre et 12 décembre.
20 le 11 novembre à Tilloy-les-Conty, 120 le 12 à Cléry-sur-Somme et 30 à Péronne (Flamicourt), min. 3 le 2 décembre à Abbeville.

LINOTTE A BEC JAUNE Carduelis flavirostris
Cayeux-sur-Mer : min. 100 vers le 9 février, 200 le 29 novembre (Le Hourdel), 1 le 20 décembre (Le Hourdel).
BdS : 10 le 22 janvier, espèce notée vers le 9 février (bande mixte d'environ 100 Linottes), 2 le 17, 120 le 11 décembre.
Espèce notée le 16 octobre à Saint-Gratien (P. de THIEULLOY), il faut remarquer que celle-ci est rarement observée à l'intérieur des terres.
18 à 20 le 9 novembre au HA, espèce notée le 23 à Saint-Valery-sur-Somme.

LINOTTE MELODIEUSE Carduelis cannabina
Plusieurs centaines en migration le 5 avril au HA, 36 en vol vers le nord (moyenne horaire : 12 individus) le 22 en BdS.
POM : passages vers le nord le 11 avril, 1 mâle nourrit 1 juv. volant le 1er mai, +200 le 9 septembre, plusieurs centaines en migration le 12, min. 160 le 17.
Nidification à Fossemanant (1 nid/3 oeufs le 7 mai), au HA, à Saint-Quentin-en-Tourmont (25 à 30 couples dans les dunes boisées, chanteurs et couples paradant du 20 au 22 avril, premières constructions de nids le 21), Velennes (1 femelle/1 nid le 15 juin)...
Dortoir d'environ 300 le 24 août à Abbeville.

SIZERIN FLAMME Carduelis flammea
1 mâle le 21 avril au Crotoy (La Maye) et 1 mâle le 3 octobre, 1 le 31 décembre en forêt de Crécy.

SERIN CINI Carduelis serinus
1er chant le 16 mars à Amiens (Ile Sainte-Aragonne) et le 21 à Rue, 5 couples dans les dunes boisées de Saint-Quentin-en-Tourmont le 21 avril (3 mâles chanteurs sur environ 1,5 km).
Nidification signalée à Roye et Rue.
Envol des 1ers jeunes début juin : 1 juv. le 9 à Poix.

1 migrateur le 19 septembre au POM.
Un rassemblement automnal : 12 le 3 octobre au Crotoy.

BEC-CROISE DES SAPINS Loxia curvirostra
1 couple/2 juv. le 22 juin à Quend-Plage (M. CZAJKOWSKI, A. et G. DUHAMEL) ; d'après l'aspect des jeunes, il s'agit d'une reproduction locale ; 1er cas noté en Picardie.

BOUVREUIL PIVOINE Pyrrhula pyrrhula
Nidification (Rue...).
Sex-ratio : 15 mâles et 10 femelles le 19 décembre à Famechon.

GROS-BEC Coccothraustes coccothraustes
2 le 2 avril à Heucourt-Croquoison, 1 mâle le 29 à Conty (Wailly).

MOINEAU DOMESTIQUE Passer domesticus
Nidification : ponte du 1er oeuf dans un nid dans une habitation le 21 février à Famechon, construction de nids le 11 avril à Poix, 2 accouplements le 18 à Velennes et 2 individus transportent des matériaux le 23 ; nidification signalée également au HA, à Quend, Rue et Saint-Quentin-en-Tourmont (y compris le POM).
Un mâle mélanique le 13 mai au POM.

MOINEAU FRIQUET Passer montanus
25 le 15 janvier et 2 le 29 mars au POM, jusqu'à une centaine en février à Airaines, 50 le 12 mars à Velennes.
Nicheur à Rue, Thennes (couvaison notée le 12 avril, 1 nid/3 oeufs le 10 août...)...
A l'automne, 18 le 3 octobre au Crotoy.

ETOURNEAU SANSONNET Sturnus vulgaris
Quend (Quend-Plage) : dortoir toujours signalé dans les dunes (2000 le 3 janvier), 1 couple (mâle chanteur) le 5 janvier, 7 en vol vers le sud le 23 novembre.
POM : mouvements vers dortoir (de Quend-Plage ?)
plus de 150 le 7 janvier, min. 370 le 15, min. 500 le 23 ;
min. 70 le 4 avril, nicheur, 106 le 26 juin, min. 830 (dont 31 migrateurs) le 27 septembre, min. 1000 le 14 octobre, min. 400 le 19, 10 en vol vers le sud le 11 décembre.
10 000 le 31 janvier sur la décharge de Sains-en-Amiènois, 1 500 000 (dortoir) le 2 février à Dury, 1 000 000 (dortoir) le 15 à Hangest-sur-Somme et 600 000 le 15 mars.
HA : 500 le 8 février, 100 le 28, 800 le 10 mars, 300 les 23 et 31, 40 le 9 avril, 100 le 28.
1000 en vol vers le nord pendant 15 mn le 20 février à Velennes, 2000 en vol vers l'est-sud-est le 1er mars à Pont-de-Metz.
Amiens (Cité Scolaire) : 25 000 le 2 février en vol vers le dortoir de Dury ;
(Saint-Roch) : plusieurs milliers en vol dans la direction de Dury le 10 mars, il s'agit probablement de mouvements vers le même dortoir que les individus notés à Pont-de-Metz ;
(La Hotoie) : transport de nourriture le 23 avril ;
(Pont Cagnard) : dortoir de 35 000 le 30 décembre.
Dortoir de 4000 à 5000 du 20 au 22 avril au Crotoy (La Maye)

Nidification : Poix (constructions de nids le 11 avril), POM, Quend...
20 en vol vers le sud le 23 novembre à Cayeux-sur-Mer (Le Hourdel) et 7 en vol vers le sud-ouest à Woignarue, 2000 (mouvements vers un dortoir) le 11 décembre à Saint-Valery-sur-Somme.

LORIOT D'EUROPE Oriolus oriolus
Premières données : 1 chanteur le 7 mai au POM, 2 mâles chanteurs le 8 à Famechon et 1 près de Rue, 2 ou 3 le 11 à Biaches et 1 à Curlu.
Dernière mention : 1 chanteur le 17 août à Abbeville.

GEAI DES CHENES Garrulus glandarius
1 jeune non volant le 3 juillet au POM.
Petit mouvement noté à l'automne : 1 migrateur le 19 septembre au POM, 1 en vol vers le sud le 21 à Abbeville et 1 autre à Ailly-le-Haut-Clocher, 3 en vol vers le sud le 23 dans cette dernière localité, 3 en vol vers le sud-ouest le 3 octobre à Hornoy.

PIE BAVARDE Pica pica
20 ensemble le 7 février à Chaussoy-Epagny (Epagny), plusieurs couples dès février à Airaines, 16 le 12 à Heucourt-Croquoison, Nidification signalée à Corbie, Dury (1 couple construit 1 nid le 22 mars), Etinehem (2 couples construisent 2 nids dans une peupleraie le 30 avril)...
min. 16 le 2 décembre à Abbeville, min. 9 le 5 à Quend (Quend-Plage).
Comportement : 1 ad. posé sur le dos d'un Mouton lui nettoie les oreilles le 8 novembre à Blangy-sous-Poix (J.C. ROBERT) ; ce comportement de déparasitage des moutons (laine ou oreilles) par la Pie bavarde et l'Etourneau sansonnet est assez fréquemment observé au POM (F. SUEUR).

CHOUCAS DES TOURS Corvus monedula
20 le 8 janvier au POM, min. 100 le 29 à Rue, 20 en février à Airaines, 30 le 5 mars à Fossemanant, 20 couples nicheurs le 18 à Dury (Hôpital Pinel), 15 couples cantonnés le 20 à Doullens, 22 individus en vol vers le sud-est le 21 septembre à Blangy-sous-Poix, 40 le 25 octobre à Boves, 619 en vol vers le sud-ouest le 8 novembre et 59 migrateurs le 13 décembre à Quend (Froise), 240 le 14 décembre en BdS, 35 le 18 novembre à Moreuil (église) et 12 le 22 à Poix (église).

CORBEAU FREUX Corvus frugilegus
min. 75 le 29 janvier à Rue, 100 le 30 janvier et 120 le 10 février à Velennes ; min. 230 le 15 février à Neuilly-l'Hôpital, 40 à Lamotte-Buleux, 190 à Sailly-Flibeaucourt et min. 80 à Gapennes ; 150 le 20 à Abbeville.
Entre Beauval et Amiens : 540 le 16 février, 223 le 5 mars et 10 le 16.
100 à 120 en février à Airaines et 200 le 1er mars à Méricourt-sur-Somme.
HA : 30 le 6 mai, 123 le 13, 30 le 22, 6 le 5 juin.
Colonies : Airaines (46 nids pour seulement 6 en 1980), Bergicourt (21 nids), Blangy-sous-Poix, Croixrault (17 nids), Famechon

(6 nids), Frémontiers (25 à 30 nids le 12 mars, 34 nids ensuite), Hornoy (23 nids), Lamaronde (20 nids), Omiècourt (48 nids, plusieurs grands juv. peu volants sont branchés près des nids le 11 mai), Poix (41 nids en 2 colonies de 24 et 17 nids)...
250 individus le 19 juin à Fienvillers, 150 le 24 juillet à Saint-Riquier, 100 le 2 octobre à Yzeux.

CORNEILLE NOIRE Corvus corone
* type C. c. corone
Nicheuse commune.
* mantelée C. c. cornix
POM : +70 le 1er janvier, 45 le 19 février, 5 le 25, 15 le 4 mars, 2 le 19, 6 le 24, 1 les 4 avril et 30 octobre, 3 le 12 novembre, 20 le 1er décembre et 11 le 18.
1 le 18 janvier au HA, 10 le 24 janvier et 13 le 30 décembre à Quend (Quend-Plage).
BdS : 11 le 27 octobre, 60 le 14 décembre, 50 le 28.
1 le 30 octobre à Saint-Valery-sur-Somme, 1 du 18 au 30 décembre à Saint-Quentin-en-Tourmont.
A l'intérieur des terres, 1 le 8 février à Famechon.

****

DONNEES COMPLEMENTAIRES

GRAND BUTOR Botaurus stellaris
Noté en période de nidification à Villers-sur-Authie (marais de Colline).

CHEVALIER ARLEQUIN Tringa erythropus
2 le 4 avril à Noyelles-sur-Mer, 3 le 2 octobre au POM.

OEDICNEME CRIARD Burhinus oedicnemus
1 le 11 avril à Saint-Aubin-Montenoy, 1 couple le 25 à Long-le-Catelet, 3 le 8 août au Hamel.

GOELAND ARGENTE Larus argentatus
Nidification :
- La nidification dans les falaises du sud du littoral n'a pas été suivie pour la deuxième année consécutive. Il serait souhaitable de recenser les effectifs de la colonie à nouveau.
- Au POM, 2 ad. construisent un nid le 26 avril et sont toujours présents le 29 mais aucune reproduction ne semble avoir eu lieu.
- Au HA, 2 couples semblent cantonnés le 31 mars et 2 ad. le paraissent encore en mai, aucun indice sérieux de nidification par la suite.