

PREDATION D'UN FAUCON EMERILLON Falco columbarius

ORIENTEE VERS LE ROUGE-GORGE Erithacus rubecula

par Olivier Hernandez, Thierry Rigaux et François Sueur

Le 29 octobre 1982 en baie d'Authie (Somme), nous notons un Faucon émerillon (mâle immature) qui capture un Passereau migrateur juste au moment où celui-ci quitte le dessus de la mer. Quelques temps après, nous découvrons deux gardes-mangers de ce Rapace constitués par deux morceaux de plastique servant probablement de points de repère au Faucon et contenant respectivement un et deux Rougegorges. Seul l'un d'entre-eux était partiellement plumé et dépecé (notamment tête séparée du corps), le Faucon émerillon venait de l'abandonner pour attaquer un Rougegorge volant péniblement au ras de la plage. Il le capture sans difficultés, ce dernier n'ayant même pas fait un écart, et va se poser sur une petite butte de sable.

Ce même jour, nous avons noté en migration pendant 5h30 : 2 Pigeons colombrins Columba oenas, 90 Alouettes des champs Alauda arvensis, 9 Pipits farlouses Anthus pratensis, 3 Bergeronnettes grises Motacilla alba, 1 Rougegorge Erithacus rubecula (capturé ensuite par le Faucon émerillon), 7 Merles noirs Turdus merula, 3 Grives litorne T. pilaris, 4 musiciennes T. philomelos et 69 mauvis T. iliacus, 1 Pouillot véloce Phylloscopus collybita, 1 Roitelet huppé Regulus regulus, 10 Bruants des roseaux Emberiza schoeniclus, 11 Pinsons des arbres Fringilla coelebs, 1 Linotte mélodieuse Carduelis cannabina et 128 Etourneaux sansonnets Sturnus vulgaris. L'activité prédatrice de ce Faucon émerillon semble donc orientée vers le Rougegorge, migrateur peu rapide volant au ras du sol après la traversée de la Manche tout comme le Pouillot véloce et le Roitelet huppé. Toutefois ce même jour, il a peut-être capturé un Etourneau sansonnet à moins que ce dernier ait été victime d'un des deux Hiboux des marais Asio flammeus observés, cependant cette dernière espèce est une médiocre prédatrice d'oiseaux. Un Merle noir affaibli avec de nombreuses rémiges absentes à l'aile droite a probablement été attaqué par le Faucon émerillon qui n'est pas parvenu à le maîtriser.

Il faut remarquer que des oiseaux migrants non attaqués aujourd'hui par le Faucon émerillon figurent cependant dans le régime alimentaire de cette espèce (GLUTZ VON BLOTZHEIM et coll. 1971, CRAMP et SIMMONS 1980) : Alouette des champs, Pipit farlouse, Grive litorne, musicienne et mauvis, Roitelet huppé, Bruant des roseaux et Pinson des arbres tandis que le Rougegorge n'est pas mentionné. Jérôme MOUTON (comm. pers.) a d'ailleurs constaté en baie de Somme la capture ou l'attaque d'Alouettes des champs (au moins 2 cas), de Grives mauvis (2 cas) et de Linottes mélodieuses (3 cas).

REFERENCES

- CRAMP S. et SIMMONS K.E.L. (1980) Handbook of the Birds of Europe, the Middle East and North Africa. Volume II - Oxford, London, New-York (Oxford University Press), 695 p.
- GLUTZ VON BLOTZHEIM U.N., BAUER K.M. et BEZZEL E. (1971) Handbuch der Vögel Mitteleuropas. Band 4. Falconiformes - Frankfurt am Main (Akademische Verlagsgesellschaft), 943 p.

