

Observation estivale d'un Aigle criard (*Aquila clanga*)

par Y. CARON

Le 20 août 1984 en baie de Somme au lieu-dit la Voie de Rue, le temps est beau et la marée basse. De nombreux Limicoles et Laridés ainsi que quelques Tadornes de Belon se nourrissent sur les vasières. Vers 10 h 30, tous les oiseaux s'envolent en essaims plus ou moins compacts. L'auteur de cette panique générale est un Rapace sombre de taille inhabituelle, les ailes larges marquées de quelques taches blanchâtres, un croissant clair à la base de la queue très courte et carrée. Mes jumelles 10 x 50 me permettent de le détailler à bonne distance (moins de 100 mètres) pendant qu'il effectue quelques cercles en vol plané avant de poursuivre sa route en direction sud-sud-ouest. La consultation de quelques ouvrages (PETERSON et coll. 1971, GEROUDET 1965) me permet de conclure à un Aigle criard (*Aquila clanga*) immature. Probablement en erratisme, ce superbe Rapace s'était offert un survol de notre région avant de poursuivre sa route.

REFERENCES

- Géroutet P. (1965) Les Rapaces diurnes et nocturnes d'Europe - Neuchâtel (Delachaux et Niestlé), 426 p.
 Peterson R., Mountfort G. et Hollom P.A.D. (1971) Guide des Oiseaux d'Europe - Neuchâtel (Delachaux et Niestlé), 447 p.

NDLR : Pour montrer l'importance de cette observation, rappelons qu'au XX siècle, seulement trois autres données sont connues en Picardie (toutes en Baie de Somme.

2 en phase vulvescente le 25 Novembre 1982 et 1 les 30 Novembre et 1 Décembre de la même année (J. Mouton : Observation d'Aigles criards Aquila clanga en baie de Somme. L'AVOCETTE 7(3-4) p. 206 à 209)

Cet Aigle semble avoir été plus régulier tout en restant rare au XIX siècle (Marcotte 1860 in Combecy et Sueur 1983, Avifaune de la Baie de Somme et de la plaine maritime picarde Amiens(GEPOP), 235 p.)

En France, en dehors de la Camargue où l'Aigle criard est un hivernant régulier avec 1 ou 2 oiseaux chaque année), seulement 26 données sont connues pour le XX siècle ; essentiellement dans la moitié Est du pays. La plupart des observations sont automnales (plus de 50% entre Octobre et Décembre) et quelques rares données de printemps. (P. Dubois et P. Yésou 1986, Inventaire des espèces d'oiseaux occasionnelles en France - Paris, SFF 203p.)

1 seule autre observation en été est connue : 1 du 28 Juillet au 13 Août 1979 en Charentes. Cette observation de fin Août semble donc fort en avance sur le calendrier de migration de cette espèce.