

NOTE SUR LE REGIME ALIMENTAIRE DU GOELAND  
LEUCOPHEE *Larus cachinnans* SUR LE LITTORAL

PICARD

par François SUEUR

Il y a quelques années nous avons apporté quelques renseignements sur le régime alimentaire du Goéland leucophée *Larus cachinnans* sur le littoral picard (SUEUR 1987) en mentionnant la capture de 38 proies déterminées appartenant à 3 espèces : *Lanice* *Lanice conchilega* (Annélide Polychète) 6 (16 %) ; Crabe vert ou enragé *Carcinus maenas* (Crustacé Décapode) 30 (79 %) et Flet *Platichthys flesus* (Poisson) 2 (5 %). Avant cette publication, seul le Crabe vert était connu dans le régime alimentaire du Goéland leucophée (GLUTZ VON BLOTZHEIM & BAUER 1982). Depuis, nous avons réalisé quelques observations sur le littoral sableux à Fort-Mahon et à Quend apportant des précisions sur le régime de cette espèce de juillet (1986) à octobre (1990).

*L. conchilega* domine en fréquence tout au long de la période d'étude mais ne représente qu'une faible biomasse, de juillet à septembre tout au moins. Le Crabe vert présente une importance certaine de juillet à septembre tandis que la part des Poissons, notamment Flet et Raie *Raja* sp., n'est conséquente qu'en juillet et août. Les Lamellibranches, Coque *Cerastoderma edule* et Moule *Mytilus edulis* semblent voir leur rôle décroître au cours de cette période.

Les genres *Cardium* (au sens de *Cerastoderma* ?) et *Mytilus* sont signalées dans la diète du Goéland leucophée mais pas *Raja* (GLUTZ VON BLOTZHEIM & BAUER 1982).

La connaissance du régime alimentaire de cet oiseau peut encore être améliorée selon trois axes :

- augmentation du nombre de proies déterminées,
- expression des résultats en biomasses grâce à la connaissance de celles des items consommés.
- étude tout au long de la période de présence de l'oiseau sur le littoral picard, soit de mai à février (SUEUR & COMMECY 1990. E. MERCIER comm. pers.).

## REMERCIEMENTS

Nous tenons à remercier Messieurs Xavier COMMECY et Eric MERCIER pour leur contribution aux observations.

	J/A	S	O
n	15	80	39
Epave	-	1,2	-
<i>L. conchilega</i>	33,3	50,0	92,2
<i>C. maenas</i>	26,6	40,0	2,6
<i>V. atalanta</i>	-	-	2,6
<i>C. edule</i>	6,7	3,8	2,6
<i>M. edulis</i>	13,3	3,8	-
Poisson	6,7	-	-
<i>Raja sp.</i>	6,7	-	-
<i>P. flesus</i>	6,7	1,2	-

Régime alimentaire du Goéland leucophée sur le littoral picard (en pourcentage de proies)

## BIBLIOGRAPHIE

- Glutz von Blotzheim U.N. & Bauer K.M. (1982) *Hanbuch der Vögel Mitteleuropas. Band 8/1. Charadriiformes (3. Teil)* - Wiesbaden (Akademische Verlagsgesellschaft). 699 p.
- Sueur F. (1987) Premières données sur le régime alimentaire du Goéland leucophée, *Larus cachinnans* sur le littoral picard (Somme, France) - *Nos Oiseaux* 39(1)37.
- Sueur F. & Combecy X. (1990) *Guide des oiseaux de la baie de Somme* - EDF, DRAE Picardie, GEPOP, 192 p.