

NOTE SUR LA NIDIFICATION PROBABLE DE LA BARGE

A QUEUE NOIRE *Limosa limosa* EN PICARDIE

par Philippe CARRUETTE

La Barge à queue noire *Limosa limosa* est une nicheuse rare en France (38 à 51 couples, DUBOIS et MAHEO 1986) et particulièrement menacée. Elle figure d'ailleurs dans le "Livre Rouge..." (de BEAUFORT et coll. 1983).

En Picardie, elle est notée aux deux passages principalement de mi-mars à fin avril et de juillet à septembre ainsi qu'en petit nombre en estivage (SUEUR et COMMECY 1990).

En 1976, un couple a peut-être niché dans le Marquenterre (chants et vols nuptiaux). Les couples les plus proches de notre région se reproduisent en Seine-Maritime (baie de Seine).

En 1990, deux Barges à queue noire sont notées en permanence sur le Parc Ornithologique du Marquenterre du 28 avril au 5 septembre, une seule est observée jusque début novembre. Un individu porte le plumage nuptial alors que l'autre présente le plumage d'hiver légèrement roussâtre à la poitrine (subadulte ? L'espèce niche généralement à 2 ans). Le 2 mai, un chanteur parade et défend un territoire sur une prairie pâturée par des Chevaux. Le 15, il survole le Parc en vol nuptial. Entre les 15 mai et 29 juin, un seul oiseau est noté puis à nouveau 2 le 30 juin. Il est néanmoins peu probable qu'il y ait eu une reproduction réussie.

Le 24 juin 1990, dans les prairies humides de Noyelles-Boismont, un adulte en plumage nuptial parfait défend son territoire. Il nous survole en émettant des "kieu kieu" longs et bruyants sur deux syllabes rappelant le Vanneau huppé *Vanellus vanellus*. Il s'élève rapidement puis vole de manière ralentie et mesurée, la tête inclinée. Le site très favorable est constitué de canaux bordés de *Phragmites australis*, de mares de huttes à faible niveau d'eau, de pâturages humides et de petites parcelles labourées au sol sablonneux. Sur ce dernier secteur à la même date, un couple d'Huîtriers pies *Haematopus ostralegus* est cantonné et un couple d'Avocettes *Recurvirostra avosetta* défend ses poussins. Six Combattants *Philomachus pugnax* (3 mâles porteurs de couronnes nuptiales et 3 femelles) sont également présents.

La Barge à queue noire étant fidèle à son lieu de nidification, il serait intéressant en 1991 de prospecter ce secteur fin mai ou début juin en évitant absolument tout dérangement afin de prouver la nidification de cet oiseau rare et menacé en France.

REMERCIEMENTS

Je tiens à remercier Monsieur J.B. Mouronval et les animateurs-nature du Parc Ornithologique du Marquenterre pour leur participation aux observations.

BIBLIOGRAPHIE

- de Beaufort F. (1983) *Livre Rouge des espèces menacées en France, tome 1 : vertébrés* - Paris (Secrétariat Faune Flore), 231 p.
- Dubois P.J. et Mahéo R. (1986) *Limicoles nicheurs de France* - Marennes (Ministère Environnement, LPO, BIROE), 291 p.
- Sueur F. et Commecy X. (1990) *Guide des oiseaux de la baie de Somme* - EDF, DRAE Picardie, GEPOP, 192 p.