COMPLEMENTS A L'AVIFAUNE DU MARLE D'AULT

par F. Sueur

Cette courte note constitue une addition au rapport "Contribution à la connaissance de l'avifaune du Mâble d'Ault (Somme) ". Elle regroupe des données anciennes, des omissions lors de la rédaction du rapport et des observations réalisées ou publiées depuis.

LISTE SYSTEMATIQUE

Grèbe jougris, Pétrel tempête, Fou de Bassan, Cormoran huppé, Héron bihoreau, Cygne de Bewick, Oie d'Egypte, espèces signalées par Duchaussoy (1913).

Mette rousse, signalons une autre observation de cette espèce : 1 mâle le 29 avril 1976 (Kérautret, 1977).

Fulmar, Milan noir, Rapace à duvet, Harle bièvre, Bruant zizi, Balbuzard pêcheur, espèces signalées par Duchaussoy (1913).

Faucon pèlerin, signalé par Duchaussoy (1913), il faut noter qu'à cette époque il nichait encore dans les falaises littorales du sud du département.

Faucon hobereau et émerillon, Marouette de Baillon, Plusieurs Sterne et guignard, Bécassine double et sourde, Chevalier stagnatile culblanc et sylvain, Bécasseau maubèche, minute, de Temminck et sanderling, espèces signalées par Duchaussoy (1913).

Bécasseau falcinelle, espèce signalée par Marcotte (1880) et Duchaussoy (1913).

Echasse blanche, Phalarope à bec étroit, Cédicnème criard, Grand Labbe, Labbe pomarin, espèces signalées par Duchaussoy (1913).

Labbe parasite, 1 mâle adulte du 29 septembre 1895 figure dans la collection Van Kempen (1912).

Goéland bourgmestre et Mouette mélanocéphale, ces 2 espèces sont signalées par Duchaussoy (1913).

Mouette pygmée, le rapport ne mentionnait qu'une observation de 3 individus le 25 avril 1976 ; cette espèce était déjà signalée par Duchaussoy (1913) , 2 autres observations récentes celles-là : 4⅘ le 29 avril 1976 (Kérautret, 1977) et 1 adulte le 24 avril 1977 (P. Royer, F. et M. Sueur).

Mouette tridactyle, Sterne hansel, caspienne et naine, Pingouin torda, Mergule nain, Guillemot de Troil et à miroir, espèces signalées par Duchaussoy (1913).

Troglodyte et Accenteur mouchet, espèces omises lors de la rédaction du rapport, toutes deux fréquentant les zones de buissons.

Locustelle tachetée, Phragmite aquatique, Rousserolle turdoide, Bruant prover et fou, espèces signalées par Duchaussoy (1913).

NOTES BREVES SUR L'EVOLUTION DE L'AVIFAUNE

A la lecture du rapport et de cette courte note on remarque la richesse ornithologique du Hâble d'Ault, toutefois depuis plusieurs mois on observe une certaine diminution des stationnements de Plongeons (effectifs maxima observés : Boyer et Sueur, 1977 ; observations non publiées)

- Fuligule milouin : janvier 600 en 1975, 40 en 76, 36 en 77
  décembre 150 en 1975, 32 en 76
- Fuligule morillon : février 20 en 1975, 6 en 77
  décembre 110 en 1975, 2 en 76
- Foulque macroule : janvier 400 en 1975, 230 en 77
  février 360 en 1975, 400 en 77
  novembre 400 en 1975, 265 en 76
  décembre 380 en 1975, 370 en 76

La météorologie ne peut être la cause de ces différences d'effectifs, en effet les hivers 1974-75 et 1975-76, notamment les mois de décembre, furent doux tandis que l'hiver 1976-77 fut plus froid : décembre étant "en 7e position parmi les mois de décembre les plus froids depuis 30 ans" et janvier "assez froid" (Bull. Clim. Somme n°110 et 115). Comparativement les stationnements d'Anatidés notamment auraient du être plus importants durant l'hiver 1976-77 que pendant les hivers précédents plus doux par arrivée de populations hivernant habituellement plus au nord ; il n'en a rien été bien au contraire. Remarquons toutefois que pour la Foulque macroule, la diminution des effectifs n'est guère sensible en janvier et novembre, le coup plus marquée en décembre (environ 42 % en moins) mais il y a une progression en février (un tiers en plus). Il faut aussi noter que les stationnements de cette espèce ont beaucoup diminué sur le grand étang tandis qu'ils ont progressé sur une gravière abandonnée et dépassent parfois ceux du grand étang comme le 16 janvier 1977 : 225 contre 110. C'est donc au niveau de ce dernier qu'il faut rechercher les causes de diminution des effectifs de Plongeons.

L'exploitation d'une gravière à proximité est peut-être responsable à moins qu'il y ait eu une modification de la flore et de la microfaune du Hâble (par infiltration d'eau de mer par exemple), une étude précise serait nécessaire. A noter que le 24 avril 1977, nous avons remarqué la présence de 3 Plongeons sur cette gravière désormais abandonnée, la fréquentation prolongée de celle ci risque de diminuer l'intérêt ornithologique du grand étang.

En conclusion, des mesures pour la protection du Hâble d'Ault s'avèrent nécessaires :

- contrôle de l'implantation des gravières
- interdiction de la voile dans cette zone, la proximité de la mer ne rendant pas utile la fréquentation de ce site pour ces activités.

BIBLIOGRAPHIE

Anonyme (1977) - Contribution à la connaissance de l'avifaune du Hâble d'Ault (Somme) - Sect. Orn. GEPOP, Rapport n°1, 1977, 9 p.

Bulletin Climatologique. Département de la Somme. Décembre 1976 (n°110) et Janvier 1977 (n°112).

Ouchaussoy H. (1913) - Contribution à l'étude des oiseaux en Picardie - Bull. Soc. Lin. N. Fr. 21 (411) 320-324.

Kérautret L. (1977) - Centrale ornithologique régionale. Synthèse des observations du printemps et de la saison de nidification 1976 (mars à juin 1976) - Le Héron (1) 7-41.

Marcotte F. (1860) - Les animaux vertébrés de l'arrondissement d'Abbeville - Mém. Soc. Emp. Emul. Abb., in 8°, 256p. (oiseaux 39-150).

Reyer P. et Sueur F. (1977) - Centrale Ornithologique GMPOP. Synthèse des observations 1975. L'Avocette 1 (1) 1-15.

Van Kempen Ch. (1912) - Contribution à l'étude des oiseaux du nord de la France - Bull. Soc. Lin. N. Fr. 21 (409) 10-42, (406) 55-83.