## CENTRALE ORNITHOLOGIQUE G.E.P.O.P.

# SYNTHESE DES OBSERVATIONS 1976

**##\*\*\*** 

Depuis 1973, les synthéses ne font que s'accroitre en velume et en informations ornithologiques variées. D'énormes progrès ont été réalisés depuis la création de la Centrale (relevés quantitatifs fréquents particulièrement pour les Anatidés et les Limicoles, recensements d'espèces nicheuses pour certains secteurs...); cependant notre grande faiblesse provient de l'absence d'ornithologues dans une grande partie de la Somme, es du peu de données nous parvenant, malgré leur accroissement spectaculaire cette année, de l'Aisne et de 1ºOise. Les zones activement prospectées sont la vallée de la Somme d'Amiens à Péronne, le secteur de Boves, le littoral particulièrement la Baie de Somme, le Marquenterre et le Hâble d'Ault, les secteurs les plus extrêmes (falaises au sud et Paie d'Authie au nord) étant quelque peu délaissés par les observateurs.

Au point le vue climatelogique, cette année a été marquée

par une forte sécheresse estivale.

Parmi les faits ornithologiques marquants, signalons seulement la ridification du Héron pourpré, du Busard Saint-Martin et l'olservation dans l'Oise de la Fauvette pitchou.

### P. Royer et F. Sueur

Observateurs : L. Allouche, F. et G. Baudry, G. Bocourt, S. Boutinot, E. Chacron, E. Conty, J.F. Cornuet (G.O.P.), E. Corrado, L.N. Darras, J. Debergue, J.F. Dejenghe (G.O.P.), C. Delahoche, R. Delcourt, P. Dordain, G. Dubois, M. Duclercq, G. Duhamel, Y. Flament, E. Feurcy, J. Hédin (P.O.M.), G. Hernandez, A. Jouve, L. Kérautret (G.O.N.), G. Landos, V. Lefebvre (G.O.N.), G. Lemiel, A.J. Loiseau (A.P.O.), M. Mannecart (P.O.M.), P. Maréchal, D. Masson, J. Mouton (G.O.N.), G. Neveu, P. Pigeon, E. et N. Ranson, Y. Ridel (P.O.M.), T. Rigaux, C. Riols (C.O.C.A.), P. Royer, F. et M. Sueur, P. Thiery, P. de Thieulloy.

Abréviations : BA = Baie d'AUthie 80 BS = Baie de Somme 80 HA = Hâble d'Ault 80

PON = Parc Ornithologique du Marquenterre 80

M. = maleF. = femelle ad. = adulte subad. = subadulte

Abréviations : im. = immature juv. = juvénile pull. = pullus, pulli (poussin)

Lorsque le département n'est pas mentionné après la localité, il s'agit de la Somme.

Plongeon arctique (Gavia arctica)
1 les 11 et 17 avril au HA, 1im, recueilli le 19 déc. à
Cayeux-sur-Mer; 1 les 16, 24 et 30 au PCM.

Plongeon catmarin (Gavia stellata)

BS-POM: 1 les 18 et 25 janvier, les 1er et 23 février, les

27 et 30 mars, les 22 et 29 déc.

1 le 15 février à Saint-Valery-sur-Somme.

HA: 1 les 25 et 26 mars, le 17 evril.

2 ls 19 déc. à Cayeux-sur-Mer.

Grèbe huppé (Podiceps cristatus)
6 le 20 maro à Quend-Plage, 7 le 3 avril au MA.
Nidification: localité, nombre de couples (moyenne de pulli
/couple)

Bray-sur-Somme 4 à 6 (2.5)
Cappy\* 1 (0)
Cléry-sur-Somme min. 7
Corbie\* 2 (3)

Corbie\* 2 (3) Le Hamei 2 (2,5) Vaux-sur-Somme\* 1 (1)

\*nouvelles localités de nidification
Signalé aussi en période de nidification à Amlens(hertillonnages), Boves, Brie, HA-80 et Saint-Boetien-02.
Cléry-sur-Somme: 11 le 29 mars, 18 le 16 mai, 30 le 27 juillet,
20 le 1er août, 35 le 8 sept., 58 le 26, 42
le 10 oct., 30 le 24, 15 le 14 nov., 10 le
27.

Bray-sur-Seeme: 12 le 8 sept., 5 le 17 oct. BS: 3 le 3 oct., 12 le 17 nov., 28 le 19, 3 le 2 déc.

Grèbe jougris (Podiceps griseigena)
Littoral: 2 treuvés morts le 19 déc., 1 recueilli quelques
jours auparavent.
BS: 1 les 2, 14 et 16 déc.

Grèbe esclavon (Podiceps auritus)

1 le 3 janvier au POM, 2 le 10 déc. en BA, 1 le 30 à Bernayen-Ponthieu.

Grèbe à cou noir (Podiceps nigricollis)

BS-POM : 2 le 21 février; 1 le 22; 1 les 19 et 21 nov.
2 juv. 1e 10 cct. à Vermand-02.

Grèbe castagneux (Podiceps ruficollis)
Nicheur commun.

BS-POM: 9 le 22 février. 8 le 27 mars et le 2 avril, 2 ad.
/1 nid le 2 juin, ler ceuf pondu le 2 su 30 1 lec
29 acût et 3 sept., 3 le 18 sept., 4 le 3 oct., 9
le 31, 26 le 17 nov., 15 le 27, 18 le 2 déc., 21 le
7, 18 le 14, 12 le 16, 6 le 22.
10 les 8 et 9 mai à Saint-Boetien-O2.
8 le 27 nov. à Brie.

Fou de Bassan (Sula bassana)

lad. 3im. le 18 sept. à Quend-Plage, Jad. 3im. le 2 oct. en

BA, 4ad. 1im. Le 3 en BS.

Grand Cormoran (Phalacrocorar carbo)

HA: 1 les 25 et 31 mars, 1 le 3 avril.

Quend-Plage: 2 le 2 avril, 3 le 3, 1 le 12.

BS-POM: 1 le 7 mai, 2 le 26 août, 1 les 27 et 28, 1 le 3

sept., 10 le 10, 7 le 3 oct., 4 le 24, 1 in. le

7 dé..

2 le 28 août à Cayeum-sur-Mer.

2 le 28 août a Cayeur-sur-mer. Cléry-sur-Som e : 1 le 17 oct. et le 24, 2 le 14 nov., 1 le 21 (aussi 2 le 28 mars).

2 ad. le 11 due. au Hourdel.

: 37

Héren cendré (Ardea einerea)

Ceionie de Beismont: 24 couples.

Signalé assez régulièrement le long de le Somme (cartes
50.000e: Ami ns. Albert et Péronne) en juin. le nidification
à l'intérieur du département de la Somme l'est pas Connuc.

BS-PCM (max. mensuels): 35 en janvier, 4 en février, 15 en
mars, 9 en avril, 4 en mai, 12 en août, 50 le 3 sept.,
45 le 3 oct., 18 les EXXIEMENTERNIEUX 17 nov. et 29 déc.
Cléry-sur-Somme: 10 le 1er août, 6 le 8 sept., 10 le 17 oct.,
15 le 25, 1 les 27 nov. et 28 déc.

Héron pourpré (Frdea purpurez)

1 couple/1 nil/4 oeufs au Hamel, pas d'éclosson semble-t-il.

Aigrette garzet e (Egretta garzetta)

POM: 1 le 27 mai, 1 les 2 et 3 juin, 3 le 8 soût, 2 le 26,
1 du 27 au 29, 1 les 3 et 18 sept.

Blongies nain ( gobrychus minutus)

Boves: lière observation le 7 mai, 1M.1F. le 23 juin, 2

couples au marais communal le 7 août.

HA: 1F./im. le 4 juillet.

Bray-sur-Semm: 2M. le 10 juillet. 1M. le 1er août.

Corbie : 2M. le 9 juillet, 1M./2 juv. non valants le 30,

1M. le 11 août.

Grand Buter (Botaurus stellaris)

1 le 30 mars à Noyelles-sur-Mer.
3 chanteurs le 11 avril dans la zone de marais comprise entre
Boves et Fouchcamps (Le Paraclet), 2 le 23 mai à Fouencamps.
1 chanteur le 31 mai à Friso.

Cigogne blanche (Ciconia ciconia)

1 du 19 au 21 mai à Lignières-Châtelain. 6 le 9 juin à
Fienvillers, 2 les 5 et 6 août à Doulleus (Presse locale),
1 le 7 août au POM, & 1e 29 sept. à Fresneville (Fresse locale), 1 le 6 oct. à Daours.

Cigogne noire (Ciconia nigra)
1 ad. le 29 août à Noyelles-sur-Mer.

Spatule blanche (Platalea leucorodia)

POM: 1 à 6 fin mars-début avril, 3 le 2 juin, 1 le 3, 7 le
19 août, 1 subad. le 29, 3 le 3 sept., 12 le 10, 6 le
15, 3 le 17, 1 subad. le 18, 1ad.1im. les 25 et 26,
1 juv. du 19 au 23 oct., 2 juv. du 24 oct. au 31 dec.
1 subad. le 28 août au HA, 1 tiré fin août à Boismont.

Cvgne tuberculs (Cygnus eler)

The 5 février au POM.

HA (max. mensuels): 5 en mars, 6 en avril, 26 en mai, 16 en juillet, 4 en août, 9 en sept., 25 en cct. et nov., 24 en déc.

Erie: 10 le 2 mai, 1 le 8 sept., 4 le 27 nov., 2 le 19 déc. Cléry-sur-Somme: 6 le 8 sept., 4 ad. le 17 oct., 8 le 24, 11 le 27 nov., 4 le 28 déc.

Nidification signalée dans quelques localités : Dompierrosur-AUthie (Presse locale), Dreuil-les-Amiens, HA (2 ad./4 pulli : 3 blancs et ; gris le 4 juillet, plus que 3 juv. les 16 et 17 sept.) et Péronne.

Cygno de Bowick (Cygnus bewickii) 1 le 5 février au POM.

<u>Oie des moissons</u> (Anser fabalis)

BS-POM: +100 début février, 200 le 24, 2 le 30 mars, 5 le 21 nov., 15 les 26 et 27, 20 le 3 déc., 30 le 17, 10 le 31.

24 le 21 nov. à Rue. A l'intérieur, 1 le 14 déc. au Hamel.

Oie cendrée (Anser anser)

BS-POM: les individus "sauvages" et semi-domestiques
cantonnés dans le POM ayant quitté la région en fév.
les observations suivantes concernent donc des
ciseaux réellement sauvages.
26 le 20 mars, 2 le 28, 25 le 18 avril, 15 le 27
mai, 115 le 17 nov., 7 le 24, 1 du 27 au 29, 1 les
14 et 22 déc., 2 le 24, 1 le 29.

1 le 3 avril au HA, 45 le 26 oct. à Amiens, 150 le 26 et 220 le 31 à Corbie, 87 le 27 à Boves, 20 le 1er nov. à Quend-Plage. Des passages sont notés les 14 et 15 nov. à Corbie et Hangest-sur-Somme, le 15 à Amiens. 3 le 15 déc. à Bray-sur-Somme, 70 le 18 à Quend-PLAge.

Bernache nonnette (Branta leucopsis)
2 le ler février et du 14 mars au 14 avril au POM.

. 1

Bernache cravant (Branta bernicla) - All - ventre sombre (B. b. bernicla)

et 26 oct., 6 le 17 nov., 4 le 21, 13 les 24 et 29, 13 les 2 et 7 déc., 2 le 18, 1 le 22.

Le 7 mai en BS, i courtise 1 Tadorne F. dont le M. cherche à chasser la Bernache (G. Duhamel, A. Jouve). Mayaud (Alauda 1956, 24:53-61) ne cite qu'une donnée pour la France concernant cette sous-espèce: i le 18 février 1879 au Crotcy (Coll. Marmottan n°8 et non pas n°10 comme l'indique Mayaud). Actuellement cette sous-espèce est considérée comme assez régulière dans notre pays.

Tadorne de Belcu (Tadorna tadorna)

BS-POM: 1500 le 22 février, 1300 le 14 mars, 1200 le 21,
220 le 30, 250 le 18 avril, +100 MMI aD. le 27
mai, 65 ad. le 2 juin, +70 le 4 juillet, 62 le
26 août (surtout jeunes de l'année: migration de
mue des ad.), 16 (1 seul ad.) le 28, 30 le 30, 3
ad. et 20 juv. le 3 sept., 60 le 18, 125 le 25,
200 le 27, 450 le 3 oct., 1200 les 17 et 19 nov.,
1000 le 24, 900 le 29 nov. et le 7 déc., 1100 les
14 et 16 déc., 1500 le 29.

nidification: environ 120 couples, premiers pull. notés le 27 mai, 3 à 15 par couvée.

Cléry-sur-Somme: 23 le 4 janvier, 6 de fin février à fin mars, 10 le 27 nov., 11 le 28 déc.

Péronne: 5 le 11 nov., 6 le 28, 11 le 12 déc. 2 en voi le 31 janvier à Saveuse.

Canard colvert (Anas platyrhynches)

BS-POM: 116 Le 27 août, 150 le 3 sept., 200 le 10, 60 les

17 et 18, 250 le 3 oct.; 200 les 24, 26 et 29 nov.,

260 le 2 déc., 280 le 7, 300 les 16 et 29.

150 le 4 juillet au HA. Cléry-sur-Somme: 23 le 1er août, 200 le 8 sept., 350 le 16 cct., 100 le 24, 215 le 28 déc. 200 le 19 déc. à Bihécourt-02.

Sarcelle d'hiver (Anas crecca)

BS-POM: 50 le 3 janvier, +1000 début février, 143 le 14

mars, 48 le 14 avril, 32 le 27 août, 100 le 3 sept.,

70 le 17, 200 le 3 oct., 125 le 24, 400 les 17 et

19 nov., 350 les 24 et 29, 1000 le 2 déc., 450 le

7, 300 le 14, 250 le 16, 220 le 29.

HA: 32 le 22 mars, 3 le 17 avril, 24 le 30 acût, 25 le 16 sept.

75 le 26 mars à Boisment et 3M.3F. à Boves. Cléry-sur-Somme: 7 le 25 août, 1 le 24 oct., 6 le 28 déc. Plusieurs centaines en novembre à Péronne, encore nombreuses en déc. Canard chipeau (Anas strepera)

BS-POM: 2 le 25 janvier, 9 le 14 mars, 10 le 24, 9 le 27,
4 le 30, 3 les 9 et 10 avril, 2 le 3 oct., 4 le
17 nov., 1F. le 26, 10 le 7 déc., 12 le 29.

HA: 1M. le 21 mars, 11M.11F. le 22, 20 le 3 avril, 16 le
17, 4 le 4 juillet, 1M. le 2 nov.

4M. SF. le 5 nov. à Corbie, IF. le 1er déc. à Quend,

Canard siffleur (Anas penelope)

BS-POM: 150 le 14 mars, 8 le 2 avril, 3M.3F. le 27 mai,
4 les 26 et 27 août, 6 les 3, 17 et 18 sept.,
60 le 3 oct., 50 le 24, 180 le 17 nev., 150 le
19. 125 le 26, 75 le 27, 200 le 29, 170 le 2
déc., 50 le 29, 40 le 30.

HA: 4 le 17 avril et le 17 sept., 1 le 17 oct. 1M.1F. le 4 avril à Reneuil-O2.

Canard pilet (Anas acuta)

BS-POM: 10 le 3 janvier, passage important début février,
674 le 14 mars, 90 le 27, 30 le 30, 3 le 2 avril,
1N.1F. le 14, 1N. le 16 mai (3 couples auraient
niché), 75 les 25 et 26 sept., 120 le 3 oct., 50
le 24, 180 le 17 nov., 150 la 19, 120 le 24, 200
le 29, 160 le 2 déc., 180 le 7, 200 les 14 et 29.

HA: 3M.3F. le 21 mars, 15 le 22, 36 le 26, 10 le 3 avril,
1M.1F. le 27 mai.
2 le 28 mars à Cléry-sur-Somme, 10 le 31 oct. à Vermand-O2,
2 le 11 nov. à Péronne.

Sarcelle d'été (Anas querquedula)

HA: 2M. le 22 mars, 1M.1F. le 29, & les 3 et 17 avril.

POM: 1M.1F. le 28 mars, ! le 27 mal.

1 le 26 mars à Boismont, 1M. les 8 et 9 mai à Saint-Boetien02, 1M. le 19 août à Corble.

Canard southet (Anas clypeata)

BS-POM: 3 le 25 janvier, 55 le 14 mars, 4M.IF. le 28, 16

le 4 avril, 11M.7F. le 11, 10 le 18, 3M.2pull. le

27 mai, 5 fin août, 7 le 10 sept., 8 le 3 oct.,

28 le 17 nov., 18 le 19, 12 les 24 et 29, 42 le

16 déc., 24 le 29.

HA: 1M. le 21 mars, 38 le 22, 50 le 25, 3N. le 27 mai, 1F. le 30 août.

Péronne: 3 couples en mars, 1M. 1e 25 avril. 3M.4F. en nov. 10 le 26 mars à Boismont, 1M.1F. le 28 mai à Corbie, 9 le 8 sept. à Cléry-sur-Somme.

Nette rousse (Netta rufina) 3F. le 30 déc. au POM.

Fuligule milouin (Aythya ferina)

POM: 1F. les 3 et 18 janvier, 27 le 24 nev., 5 le 29, 34 le
16 déc., 16 le 29.

HA: 40 le 24 janvier, 51 le 22 mars, 16 les 17 avril et 27
mai, 1M. le 28 août, 4 le 30, 21 le 2 nov., 40 le 21,

49 le 28 nov., 52 le 11 déc., 12 le 19.

1 le 2 mai à Brie, 2M.5F./im. le 23 août et 2M. le 9 déc.

à Corbie, 1 le 23 déc. à Saint-Valery-sur-Somme.

Cléry-sur-Somme: 23 le 29 février, 200 le 14 mars, 10 le

8 sept., 40 le 17 oct., 50 les 24 et 31,

58 le 27 nov., 1 le 20 déc.

Fultgule miloudnan (Aythya marila)

1M.1F. les 5, 18, 25 janvier et ler février au POM, 2M,
1F. le 16 des.

Fuligule morillon (Aythya Puligula)

HA : 6 le 24 janvier, 11 le 21 mars, 2 les 3 et 17 Evril,
5 le 25 nov., 2 le 11 déc.

POM : 1M.1F. les 24 et 28 mars, 2 le 2 Evril, 2M. le 27

mai, 1M. le 17 sept. et le 26 nov., 2 le 29 déc.

Sailly-Laurette : 1M.1F. le 16 avril, 1M. le 30 déc.

Cléry-sur-Senme : 2M.1F. le 10 juillet, 5 le 27 nov.

Bider à duvet (Someteria mollissima)
BS: 12 le ; sept., 24 le 27, 4 le ; oct., 2M. le 2 déc.,
4 le ; i...
2M. le 27 no., à Quend-Plage.

Macreuse noire (Melanitta nigra)

Quend-Plage: +100 le 24 janvier, +30 le 22 février, +50
les 20 et 26 mars, 800 le 10 avril, 300 le
12, 50 le 16, 20 le 28 mai, 30 le 31 oct.,
+20 le 27 nav.

A l'intérier c, 6 le 21 nov. à Cléry-sur-Semme.

Macreuse brung (Melanitta fusca)

26 le 25 jan vier à Cayeux-sur-Mer, tère le 19 sept. à QuendPlage, 57 le 16 dés. en BS.

(nombreuses données nen significatives).

Harelde de Mic lelen (Clangula hyemalis) 2M.1F. le 10 déc. en BA.

Garrot à ceil iter (Bucephala clangula)

BS-POM : 1F. les 3 et 4 février, 3F. le 5, 1F. le 24 mars,

1F. les ter et 2 avril, 1F./im. le 19 nov., 1F.

les 2 et 14 dés.

Harle piette (Mergus albellus)
POM : 1F. 1:3 3 et 4 février, 2F. 1: 24 déc., 1M.3F. 1: 30.

Harle bièvre (Mergus merganser)
POM : 1F. 16 4 février, 1M. 1s 9 avril.

Harle huppé (Fergus serrator)

ES-POM: 1 10 25 janvier 5M. F. le 27 mars, 14 le 30, 3M.

2F. le 1er avril, 1M. le 2, 3 le 25 sept., 9 le

17 nov., 4 le 24, 5 le 14 déc.

1 le 3 avril à Quend-Plage, 1M. les 17 avril et 28 nov. su IIA.

Buse variable (Buteo buteo)

Localités d'observation dans l'Alone : Daint-Boerian

" " L'Oise : forêt de Compiègne

" " La Borne : 25, Boves, Combie,

Fouencamps, Frémontiers, La Chaussés-Tirancourt. PG:

(à le 16 déc...), Monchaux, Quend-Biags, Rue, Saint
Quentin-en-Teurmont, Saveuse et Valouncé.

Susa pattue (Buteo lagorus) 1 du 22 nov. au 17 déc. dans le Marquencerre (peut-être une 20 is 17 déc.).

Cotte espèce disorbre n'a évé signalée qu'un 5 localités : Porêt de Compiègne-60. PS. Le Hamel. FON et Ruo.

Milan roval (Milvus salivus)
3 fin Solit an FOM.

Milan Note (Milvus migrans)

7 Jes 3 et 9 mai à Saint-Section-CD.

Mondrée aptvers (Permis aptverse) 1 le 6 juin in forêt de Comprègne-60.

Busard des rossaux (Circus aeruginosus)

EA : TF: le 32 mars, 1 le 25 avril.

2M. IF. les 8 et 9 mad à Saint-Rostian-02. TF./im.le 7 août à Fousnomps/Baves.

Cléry-sur-Soune : 2 le 29 février, iF.im. le lev noût, 3 le 22, iF.im. le 3 vepv.. 2 le 3 cet., iF. le

17./dm. le 17 sept. à Noyelles-aur-Mer, 1 im. les 18 et 27 dans le Marquenterre, 1M. le 31 oct. à Versond-02. Midification : 1 couple dans le Marquenterre, m/dification échose à la suite de la mort du M.

Enserd Saint-Markin (Circus eyemons)

IP./im. le 25 janvier au Crotov, I le 30 à Saint-Gratien.

IP./im. le 21 mans à Boismont, IM.IP. le 23 à Versourt, I le 28 à Cléry-sur-Somma.

BS-FOM: IP./im. le 27 mars et du 17 nov. au 29 déc.

Quend: IP./im. les ler et 3 avril, IM. le 9.

1 le 19 avril en forêt de Compiègne-50, I le ler mai à Boves. IM.IP. les 8 et 9 mai à Saint-Boetien-02. IM.2F./im. le 15 actit à Buire-Courcelles. IF./im. le 10 déc. en BA.

IM. le 15 à Cappy, IP./im. fin déc. à Velennes.

Nidification d'un couple en forêt de Crécy (Delcourt R. 1977, L'Avocette 1(1)15-18).

Balbugard pëcheur (Pandion balidetus)

BS-POM : 1 du 10 au 30 août, 2 le 3 sept., 1 les 10 et 25,

1 le 3 oct.

Heilly : 1 le 19 sept., 2 le 21.

2 le 3 oct. à Ciéry-sur-Somme, 1 le 10 à Vermand-C2.

Faucon hobereau (Palco subbutes) istacmers econsumess [Paucon hobereau Paucon mobereau Pomness and respective of states of sta

Faucon émerillon (Falco columbarius)

BS-POM: 1F./im. 1e 24 oct., 1es 17 et 21 nov., 2M.1F. 1e 29 nov. et 1e 17 déc., 1F. 1e 29 déc.

Faucon crécerelle (Falco tinnunculus)

Seul rapace répandu dans notre région: 37 localités d'observation dans la Somme, 2 dans l'Aisne (Saint-Boetien et Mormand)

et vermand).

Max. observés en août: 10 à 15 sur l'aérodrome d'Abbeville,

11 entre le Hourdel et Saint-Valery-sur-Somme 16 30.

一年、日本に成する日本語の日本の日本の大きのは

Dans le secteur de Corbie en oct., 1F./im. occupe une zone de 90 ha environ dont 46 de marais, 36,5 de laris et cultures et 7,5 de bois.

Caille des blés (Coturnix coturnix)

Dernière: le 19 sept. à Corbie.

Grue cendrée (Grus grus)

2 le 19 avril à Herbécourt (Presse locale), 6 le 7 oct. à
Vermand-02.

Râle de genêts (Crex crex)
| chanteur 1: 13 mai à Fouencamps.

Foulgue macroule (Fulica atra)

Erie: 70 le 8 sept., 310 le 27 nov., 300 le 19 déc.

Cléry-sur-Somme: 80-90 le 10 juillet, 100 le fer Loût,

500 le 8 sept., 600 le 17 oct., 500 le 27 nov.,

645 le 28 déc.

80 le 28 déc. à Feuillères. 80 le 30 à Bernay-en-Ponthieu.

80 le 28 déc. à Feuillères. 80 le 30 à Bernay-en-Ponthieu.

HA: 150 le 22 mars. 90 le 3 avril. 150 le 27 mai et le 4

HA: 150 le 22 mars. 90 le 3 avril. 150 le 27 mai et le 4

juillet, 400 les 28 et 30 août, 400 le 16 sept., 250

les 17 sept. et 24 oct., 365 le 2 nov., 180 le 21,

les 17 sept. et 24 oct., 365 le 2 nov., 180 le 21,

250 les 23 et 29, 230 le 11 déc., 370 le 19.

Nidification: 2ad./6 pull. le 20 avril à Boves (date précoce)

2ad./6 pull. d'environ 1 semaine le S sept. à

Cléry-sur-Somme (date tardive).

Outarde canepetière (Otis tetran)
1 le 4 avril à Reneuil-02.

Huîtrier-pie (Maematopus ostralegus)
BS-POM: 2000 le 3 janvier; +800 le 25, 5000 les 21 et 22
février, 3400 le 14 mars, 800 les 21 et 30, 300
février, 3400 le 14 mars, 800 les 21 et 30, 300
les 4 et 14 avril, 450 le 18, 300 le 16 mai, 10
les 4 et 14 avril, 600 le 27, 900 le 28, 600
le 27, 450 le 26 août, 600 le 27, 900 le 28, 600
le 29, 500 le 30, 1600 le 2 sept., 750 le 10,

3500 le 26, 1800 le 27, 1900 le 3 por . 2000 le 29. 24 nov., 3000 le 27, 3200 le 7 déc., 2000 le 29. nidification a min. 5 couples. 60 le 2 oct. em BA, 140 le 10 déc.

Vanneau huppé (Vanellus vannellus)

Nidification: Min. 30 couples dans le Marquenterre (1 à 4 pulli/couvés), 1 couple le 2 juin à Rue et 1 ad./1 pullus au Crotey, 3 ou 4 couples au HA (juillet).

Max. observés: 200 le 2 oct. à Gueschart, 250 le 3 à Rue, 400 le 10 à Cléry-sur-Somme, 250 le 13 à Bussy-les-Daours /Vecquemont/Lamotte-Breblère, +200 le 17 à Montdidier, 250 le 3 déc. à Rue, 1200 le 16 en BS, 285 le 19 au Heurdel, 310 le 22 en BS, 300 le 28 à Cappy, 600 le 29 et 210 le 30 en BS.

Des décomptes réguliers le long d'un parcours fixe (Corbie, Hamelet, Vaire-sous-Corbie, Le Hamel, Sailiy-Laurette, Sailly-le-Seo, Vaux-sur-Somme, Corbie) donnent un aperçu de l'abondance de cette espèce dans notre réglan au cours des 5 derniers mois de l'année (voir Figure 1). Lors du dernier décompte effectué pendant une période de gel ininterrompue et après les chutes de neige du 28 déc., aucun individu n'a pu être observé : à l'intérieur, départ de cette espèce vers des régions plus méridionales comme le prouve notamment l'observation d'un vol de 300 vers le sud le 28 déc. à Cappy

Pluvier doré (Pluvialis apricaria)

BS-POM: 1 le 27 août, 9 le 29, 4 le 10 sept., 550 vers le sud 1e 16 déc. (en 6h), 240 vers le sud 1e 29 (en 5h), 35 le 30 déc.

7 le 19 sept. à Abbeville.

Rue: en voi vers le sud, 14 le 12 déc., 31 le 15, 60 le 16, 48 le 17, 35 le 31.

Pluvier argenté (Pluvialis squatarola)
Quend-Plage: 1 le 16 avril, 2 le 17.
BS-POM: 14 le 7 mai, 12 le 27, 8 le 4 juillet, 6 le 26
août, 45 le 27, 120 le 29, 100 les 3 et 26 sept.,
300 le 27, 100 le 3 oct., +200 le 24, 40 le 17
nov., 15 le 24, 110 le 2 déc., 160 le 7, 100 le
29.

Grand Gravelot (Tharadrius hiaticula)

BS-POM: 2500 le 14 mars, 1000 le 28, 600 le 30, 30 le 4

avril, 6 le 17, 40 le 16 mai, 24 le 27, 4 le 3

juin, 6 le 4 juillet, +800 le 29 acût, 300 le 3

sept., +1000 le 26, 30 le 3 oct., 4 le 24.


midification: 1 couple.

HA: 2 le 25 mars, 5 le 27 mai, 1 le 24 oct. 150 le 2 oct. en BA.

Petit Gravelot (Charadrius dubius)

lers: le ler avril au POM, 1 le 4 à Reneuil-02.

HA: 8 le 27 mai, 2ad./1 pullus le 4 juillet.



Pig. - Abondance du Vanneau huppé

2 ad./1 mid/3 oeufs le 3 juin au POM, 2 le 3 sept. en BS.

Gravelot à collier interrospu (Charadrius alexandrinus)

ler : le 25 mars au HA.

PS-POM: 10 le 14 avril, 3ad. 1ad./1 pull. 1ad./1 juv. le 2 juin, min. 4 couples le 3, 15 le 4 juillet, +32 le 26 août, 27 le 3 sept., 1 le 18.

Tourneplerre (Arenaria interpres)

HA: 2 les for et 11 avril, 3 le 25, 1 le 28 août.

BS-POM: 15 le 16 mai, 1 les 28 et 29 août, 1 le 3 sept.,

2 le 37.

1 le 7er nov. à Quend-Plage.

Bécassine des marais (Gallinago gallinago)

BS-POM: 30 le 26 mars, 5 le 14 avril, 2 le 29 août, 5 le 3
sept., 3 le 27, 1 les 19 nov., 2 et 16 déc., 7 le
29 déc.

Rue: 1 le 36 nov., 5 le 17, 8 le 25, 12 le 27, 23 le 17 déc. Boves/Fouencamps: 3 le 30 mars, 4 le 2 avril, 1 les ser et 2 mai, 3 le 23 sept., 20 le 10 oct., 4 le 31, 5 le 12 déc.

Bécassine sourde (Lymnocryptes minimus)
2 le 26 mars à Boismont, 7 le 29 nov, en BS.

Bécasse des bols (Scolopax rusticole)

8 tuées début novembre au Hamel, 4 tuées le 5 déc. dans le bois de Francières.

12 le 14 déc. dans les dunes du Marquenterre (J. Mouton: "probablement assez nombreuses dans ces dunes puisque les chasseurs en tuent plusieurs presque quotidiennement!").

Courlis cendré (Numenius arquata)

BS-POM: 300 le 22 février, 1200 le 14 mars, 1100 le 30,
500 le 14 avril, 600 le 18, 60 le 27 mai, 620 le
27 août, 800 le 28, 550 le 30, 650 le 3 sept.,
380 le 10, 500 le 27, 550 le 3 oct., 400 le 24,
600 les 17 et 19 nov., 1200 les 24 et 27, 700 le
29 nov. et le 2 déc., 1200 le 7 déc., 1450 le 29,
nidification probable: 2 chanteurs dans les dunes de
Quend-Plage le 22 février, 3"couples" dans des
prés du Marquenterre le 14 avril.

28 le 2 oct. en BA, 34 le 10 déc. 1 le 14 nov. à Fouencamps.

Courlis corlieu (Numenius phaeopus)

BS-POM: 1 le 21 mars, 7 le 11 avril, 10 le 16 mai, 400 le 4 juillet, 10 le 26 août, 32 le 3 sept., 1 les 17 et 26.

14 le 16 avril à Quend-Plage, 3 en vol vers le sud le 6 déc. à Rue.

Barge à queue noire (Limosa limosa)

1 le 20 mars à Bolsmont, 8 le 29 à Péronne,
BS-POM: 2 (1 chanteur) le 21 mars, 2 le 27, 3 le 14 avril,

1 les 16 et 27 mai, 1 le 4 juillet. 2 le 27 août. 4 le 3 sept., 15 le 26, 1 les 2 et 7 dés. 1 le 27 mai à Meneuil-02.

Barge rousse (Namosa Lapponica)

BS-POM: 1 lo 23 février et le 23 mars. 2 le 26 mars. 2 le 9 mars. 2 le 26 mars. 2 le 9 mars. 4 le 16. 57 le 27 août. 75 le 29. 50 le 3 sept., 40 le 10. 100 le 26. 8 le 3 cet., 2 le 24. 1 le 17 mov., 40 le 29. 24 le 7 déc., 35 le 29. 4 le 25 avril au Hourdel.

Chevalier aricquin (Trings erythropus)

1 le 13 avr. 3 à Reneuik-02. 3 le 17 au BA, 1 has 3 et 27
sept. en BS at ou POM, 1 le 21 oct. à Cléry-sur-Somme.

Chevalier aboveur (Trings rebularia)

1 le 4 avri & Rensull-OR, 1 le 2 mai à Fouendamps.

BS-POM : 5 | : 25 août. 2 le 26. 3 le 30. 5 les 3 ao 27

se; :, 12 le 3 oct.

Chevalier cullilanc (Tringa ochropus)

1 le 1er ma: à Boves.

Fouencamps : le 1er mai, 3 les 4 et 7 août.

1 le 3 oct. at POM, 1 le 10 à Vermand-02, 1 le 17 mov. à Daours.

Chevalier sylvin (Tringa glavedia)

Chevalier guigneute (Tranga hypoteucos)

1 le 21 févirier au POM.

Dernières dounées à l'intérieur : 1 les 10 et 31 out. à Vermand-02.

1 hivernant le 29 déc. en BS.

Bécasseau maubèche (Calidris canurus)

1 le 21 mars à Quend-Plage.

BS-POM: 7 le 16 mai, 4 le 27 août, 8 du 28 au 30, 28 le 3 april, 25 le 3 octa, 28 le 17 nov., 26 le 29, 11 le 7 déc., 12 le 29.

Bécasseau minute (Calidris minuta)

BS=POM : 2 : a 5 janvier, 6 le 4 juillet, 5 le 29 sout,

10 le 3 sept., 2 le 18.

1 le 2 oct. en BA.

Bécasseau variable (Calidris alpina)

BS-POM: 750 le 22 février, 3500 le 15 mars, 2500 le 29,

20 le 14 avril, 50 le 29 août, 200 le 3 sept.,

120 le 3 oct., 700 le 24, 1200 le 17 nov., 700

le 19, 400 le 24, 100 le 29, 5500 le 7 déc.

HA : 6 le 26 mars, 43 le 3 avril, 60 le 11.

50 le 29 mars à Quend-Plage.

BA : 40 le 2 oct., 450 le 10 déc.

Bécasseau cocomit (Calidris ferruginea)

BS-POM: 1 le 28 août, 5 le 29, 12 le 30, 4 le 3 sept.

2 le 19 sept. à Quend-Plage.

Bécasseau sanderling (Calidris alba)

BS-POM: 10 le 30 mars, 20 le 28 août, 60 le 3 sept.. 5 le

10, 2 le 3 oct., 1 les 17, 19 et 29 nov.

BA: 4 le 2 cct., 32 le 10 déc.

Combattant (Philomachus pugnax)

HA: 32 le 3 avril, 60 le 11, 15 le 17, 10 le 23, 4 le 16

sept.

Renouil-02: 1M.IF. le 4 avril, 1M.4F. le 13.

8 le 18 sept. au POM, 2 le 24 nov. en BS.

Echasse blanche (Himantopus himantopus)

1 le 3 juin au PCH.

Avocette (Recurvirostra avosetta)

ES-POM: 3 1s 14 mars, 6 1s 21, 9 1s 30, 47 1s 12 avril,
12 ls 29 août, 11 1s 3 sept., 37 1s 27, 1 lss 3

oct. et 21 nov.

nidification: 6 couples (parades) le 14 avril, 11 couples
/nids le 9 mai, ensuite 23 nids dont 22
furent détruits par des Geélands argentés
lors d'une grande marée, 26 couples au
total, 18 couples le 3 juin (4 avec pulli :
1, 1, 2 et 4 ; 12 avec nids, 2 cherchant à
s'installer). Au total 20 couvées donnèrent
51 pulli à l'éclosion (Ass. Marq. Nat. 1977)
moyenne 2,55 pull./couvée.

4 le 27 mai au HA. A l'intérieur, 8 le 2 mai à Fouencamps et ; à Reneuil-02.

Phalarope à bes étroit (Phalaropus lobatus)

1 le 27 sept. dans le Narquenterre.

Oedicnème criard (Burhinus oedicnemus)
Noté à Querrieu le 3 oct. et les jours suivants.

Grand Labbe (Stercorarius skua)
1 im. le 27 sept. en BS, 1 le 3 oct. à Vermand-02.

Labbe pomarin (Stercorarius pomarinus)

POM: 1 le 18 juillet (Ass. Marq. Nat. 1977), 1 vers la
mi-août.

Labbe parasite (Stercorarius parasiticus)

Ccéland marin (Larus marinus)

A l'intérieur, 1 le 4 avril à Reneuil-02. BS : 2 im. le 4 juillet, 200 le 27 août, 350 le 10 sept., 180 les 17 et 18, 150 le 21 nov., 230 le 7 déc., 40 le 22.

Goéland argent! (Larus argentatus)
BS: 1000 le 3 sept., 1200 le 3 cet.
A l'intérieur, présent à l'automne sur le plateau jusqu'à
Gueschart.

Goéland sendré (Larus eanus)

BS-POM: 10 le 4 avril, 50 le 3 juin, +200 la 4 juillet,

70 le 28 août, 1000 les 3 sept. et 3 oct.

A l'intérieur, présent à l'automne sur le plateau jusqu'à
Gueschert.

Mouette rieuse (Larus ridibundus)

2000 le 25 mars à Boismont, 1000 le 14 avril et 1500 le 3
oct. en BS.

Nidification : environ 30 couples en mai près de Scissons-02. 15 à 20 couples (5 juv./5 couvées) le 10 juillet à Cléry-pur-Somme

Sous-estimation pour cette dernière colonie vu la date vardive : nombreux ad. déjà dispersés dans toute la région. 1974 : 30 couples (Bull. GEPOF 1976 n°7) 1975 : pas de midification (Bad. ceuloment la 8 juin).

A Saint-Vale y-our-Somme, venant de la vallée, (600 (en th) regagnent le dorteir on Bais le 11 déc.

Mouette pygmée (Larus minutus) 3 le 25 avrai au BA, 1 le 30 doût à Cayeun-sud-Rer, 1 ed. 1e 11 déc. a. Hourdel, 1 us. le 16 en BS.

Cuifette noire (Chlidomies niger)

HA: 6 le 16 sept., 72 le 17.

2 le 27 sept. en ES.

Guifette leuco tère (Childonias leucopterus) i le 14 sept. à Hameiet.

Guifette moustic (Childonias hybrida)

Sterne pierregarin (Sterna hirundo)

HA : 1 le 27 avril, 2 le 28 août, & le 16 sept.

ES : 150 le 3 sept.

(nombreuses fonnées concernant des ST. pieregarins/arctiques).

Sterne naine (Sterne albifrons)

BS-POM: 20 1e 14 avril, 1 le 27 mai, 1 le 28 août, 3 le 29, 2 le 30, 4 le 3 sept.

Sterme causek (Sterma sandvicensis)

BS: 2 le 30 mars, 5 le 94 avril, 20 le 18, 30 le 7 mai,

S la 4 juillet, 200 le 26 août, 120 le 3 sept., 50

le 10, 30 le 27, 16 le 3 oct.

HA: 1 le 17 avril, 37 le 16 sept., 24 le 17.

B le 18 sept. à Quend-Plage.

Facareux moine (Fratercule arctica)
1 le 7 déc. en BS (ajeutons une donnée inédite : 1 trouvé mont sur le littoral le 9 déc. 1973).

Figer colombin (Columba cenas)
Signalé dans la Somme : Amiens. Ault. Corbie. Dacure,
Marquenterra (53 le ? déc...) et Saint-Gratien (chanteurs en déc.)
Dans l'AISNE : Saint-Boetism (mai).

Tourierelle des bois (Streptopelia turtur) Vères: le lor mai à Boves, Cottemply et Sains-en-Amiénois. Dernière: le 10 oct. à Riencourt.

Tourterelle turque (Streptopelia decaccio)

Corbie: 20 couples micheurs. Bande de 50 à 55 du 20 au 26 août, 50 le 1er sept., 44 le 0, 40 le 12, 12 le 19, 19 les 28 et 29 nov. et le 9 déc.

Sailly-Laurette: 3 couples micheurs. Dortoir de 14 le 15 nov.

Dortoir de 16-12 du 14 au 17 sept. à Sailly-Plibeaucourt.

Coucou gris (Orculus canorus)

lers: le 4 avril à Boves, Fouencamps, McAliens-Dreuil-SO,
forêt de Compiègne-60 et Reneuil-C2.

Dornier: le lor sept. à Corbie.

Hibou woven-duc (Asio otus)

POM : 3 du 1% au 2% ware, 7 le 1% avril et le 3 sept.

1 le 18 nov. à Corbie, présent en déc. à Sailly-Laurette (pelotes).

Hibou des marais (Asio flammeus)

1 le 7 mars à Cléry-sur-Somme, 1 le 3 avril au Mourdel,
1 le 12 à Abbeville, 1 les 21 nov. et 22 déc. dans le
Marquenterre.

Chouette chevêcle (Athene noctua)

Localités d'observation dans la Somme : Bolemont, Fouencamps,

Le crotoy, Marquenterre et Sailly-Flibeaucourt.

Chouette hulotte (STrix aluco)
1 chanteur le 23 mars dans le Marquenterre, ? chanteur les
8 et 9 mai à Saint-Boetien-02, 2 chanteurs le 14 août à

Velennes, 1 chanteur le 26 à Corbie, 1 autre à Vaux-sur-Somme, 1 chanteur le 17 sept. Su Crotoy, 3 chanteurs sur-50 ha en automne à Rue. 1502 (Signalée aussi à Molliens-Dreuil, Quend, Sailly-Fliboaucourt, Saint-Quentin-en-Tourmont, Saint-Valery-sur-Somme et Saveuse.

Chouette effraie (Tyto alba) of the Localités d'observation dans la Somme : Amiens, Camon, Conty, Corbie, Noyelles-sur-Mer, Rue, Sailly-Flibeaucourt et Velennes.

Dans L'Aisne : Pierrepont.

Engoulevent d'Europe (Caprimulgus europaeus)

1 le 3 juin dans le Marquenterre.

Martinet noir (Apus apus)

lers: le 2 mai à Fouencamps, Boves et Brie.

Derniers: le 21 sept. à Saint-Gratien.

Huppe fasciée (Upupa epops)
1 le 19 avril près de Moreuil, 1 le 25 à Saint-Fuscien.

Pic cendré (Picus canus)

1 le 25 mars en forêt de Compiègne-60.

Pic mar (Dendrocopos medius)
1 les 24 et 25 mars, 1 le 21 sept. en forêt de Compiègne-60.

Pic épeichette (Dendrocopos minor)

Localités d'observation dans la Somme : Amiens, Bonnay, Corbie,
Eclusier-Vaux, forêt de Crécy, Le Hamel, Quend, Rue (sept.
à déc.), Baint-Quentin-en-Tourmont, Saint-Valery-sur-Somme
et Vairc-sous-Corbie.

Dans l'Oise : forêt de Complègne.

Torcol fourmilier (Jynx torquilla)
1 le 22 sept. à Amiens.

Alouette lulu (Lullula arborea)
8 le 15 déc. dans le Marquenterre.

Alouette des champs (Alauda arvensis)
Nicheuse très commune. Migration importante le 24 oct. en
BS. Pendant une période de gel ininterrompue et après les
chutes de neige du 28 déc., des bandes importantes sont
observées le 30 : +150 au Hamel, +100 à Sailly-Laurette...

Alouette haussecol (Bremophila alpestris)
BS: 1 le 22 l'évrier, 4 le 4 avril, 13 le 9, 24 le 10.

Hirondelle de rivage (Riparia riparia)
lères : 5 le 3 avril à Vercourt.
Dernière : le 5 oct. à Daours.

Hirondelle de cheminée (Hirundo rustica)
lère le 3 mars à Boves, dernière le 3 oct. à Thennes.

Hirondelle de fenêtre (Delichon urbica) lères : le 3 mai à Amiens. Dernières : le 10 oct. à Fouencamps.

Pipit des arbres (Anthus trivialis) der : le 12 avril à Corbie.

Pinit sploncelle (Anthus spinoletts) . gour-espèce non précasée

ES: 5 le 2 déc., 1 les 14 et 29.

type (A. sp. spinoletta)
1 le 9 avril en BS, 2 lo 9 nov. st 1 le 17 à Daours. 1 le 21 à Noyelles-sur-Her, 1 le 1er déc. à Corbie, 1 le 9 à Daours, i le 10 en EA, 2 le 15 à Fouencamps.

maritime (A. sp. petrosus) ES-POM: 1 les 23 et 30 mars, 1 le 14 avril, 1 le 3 oct., 2 le 24, 3 le 19 nov., 1 le 29. 7 le 10 déc. en BA.

Pargeronnette printanière (Motacilla flava) Nicheuse assez commune. Dortoir d'environ 500 à la mi-sept. à Ponthoile-Romaine, 50 le 16 au HA.

Pie-grièche grise (Lanius excubitor) 1 le for mai à Fouencamps, 2 ad. le 16 juin et 2 ad./3 juv le 19 & Boves. 1 le 10 sept. à Corbie, 1 le 8 oct. à Vaux-sur-Somme, 2 le 5 oct. et 1 les 9 nov. et 9 déc. à Baours, 1 les ler et 3 déc. à Rue.

Fraquet tarier (Saxicola rubetra) fer : le ler avril dans le Marquenterre. Passage postnuptial noté du 20 août au 4 oct. (max. : 17 le 25 août à Corbie).

Traquet pâtre (Saxicola torquata) Fas d'observations en janvier-février dens la zone littorale. Observations en nov. et déc. dans la some littorale (hivernage régulier) :

- Rue : 1M. le 17 nov. - 1P. des 18 et 29, 1F. les 3 et 11 déc., 1M. les 30 et 31

- Le Crotoy: IM. le 7 dec. 4 10 22

- 1M. le 10 déc. à Quend et 1M.2F. en BA, 2 le 22 dans le

Marquenterre, 1F. le 26-à Vron. A l'intérieur : 1M. les 14 et 18 nov. à Fouencamps, 1M. le 15 nov. et le 3 déc. au Namel, 2M. le 15 déc. à Daours, 17. le 22 à Sailly-le-Sec.

Traquet motteux (Oenanthe oenanthe) ler : M. le 28 mars au IIA. Dernier: le 24 oet au IIA.

Rougequeue noir (Phoenicurus ochruros) ler : 1M. le 21 mars à Saveuse ; dernier le 23 oct. a Saint-Gratien.

Housequene a Trong blane Phoenicurus connecusis).

Ter: le 26 avril à Aziens
Dérniers: 3 le 8 oct. à Corbie, 2 à Vaux-sur-Somme

Rossignol philomèle (Luscinia megarhynchos)

ler : le 12 avril à Picquigny.

Grive litorne (Turdus pilaris)

lères: le 31 oct. à Corbie.

Fin 76, les effectifs sont moins importants que les années précédentes (max. 600 le 22 nov. dans le Marquenterre).

Merle à plastron (Turdus torquatus)

Grive mauvis (Turdus iliacus)
lères: le 3 oct. à Amiens et en BS.

Locustelle luscinioide (Locustella luscinicides)
Signalée en mai à Blangy-Tronville, Boves, Frise-SO, et
Saint-Boetien-O2.

Locustelle tachetée (Locustella naevia)
1ère : le 26 mars au POM.

Phragmite des Jones (Acrocephalus achoemobachus)
lers: le 11 avril à Boves et Fouencamps.

Rousserolle verderolle (Acrosephalus palustris)
Signalée en 3 localités : Fouencamps, Le Hamel et Noyellessur-Mer.

Rousserolle effarvatte (Acrocephalus scirpacous)

lères: le 5 avril à Amiens.

Dernière: le 23 sept. à l'euencamps.

Rousserolle turdoide (Acrocephalus arundinaceus)
lòre: le 8 mai à Sailly-Le-Sec.

Fauvette des jardins (Sylvia borin) lère : le 15 avril à Corbie.

Fauvette à tête noire (Sylvia atricapilla) ière : le 30 mars à Fouencamps. ir. le 7 nov. et 3 le 5 déc. à Amiens.

Fauvette babillarde (Sylvia curruca)
1 ère : le 4 mai à Saint-Gratien.

Fauvette grisette (Sylvia communis)
lère: le ler avril à Cayeux-sur-Mer.
Dernière: le 23 sept. à Boves.

Fauvette pitchou (Sylvia undata)

1 le 24 mars en forêt de Compiègne-60. La Seine constitue
l'extrême limite nord de midification de cette espèce.

Pouillot fitis (Phylloscopus trochilus) ier : le 2 avril à Fouencamps.

Pouillot véloce (Phylloscopus collybita)

1er : le 3 mars à Reneuil-02. Nov. : 1 le 12 à Corbie, 1 le 23 à Sailly-Laurette, 1 les 25 et 26 à Saint-Gratien.

Déc. : 2 le 9 à Daours.

Pouillet siffleur (Phylloscopus sibilatrix) 1 chanteur le 19 avril en forêt de Complègne-60.

Roitelet triple-bandeau (Regulus igmicapillus) 1 le 13 mai au POM. Cette espèce n'est pas signalée par "l'Atlas des Oiseaux Nicheurs de France" comme ayant été observée en période de midification sur la carte de Rue.

Gobemouche noir (Ficedula hypoleuca) 1 chanteur le 19 avril en forêt de Compiègne-60. Migration postnuptiale notée du 25 zoût au 18 sept.

Gobemouche gris (Muscicapa striata) Des jeunes sont encore nourris par les parents le 5 sept. à Saint-Gratien. Dernier : le 14 sept. à Corbie. Signalé en 2 autres localités : Bray-sur-Somme et Le Hamel.

Mésange à moustaches (Panurus biarmicus) Nicheuse pour la 2e année consécutive à Noyolles-sur-Mer.

Bruant zizi (Emberiza cirlus) 1 le 2 mai à Brie, signalé les 8 et 9 à Saint-Eoetien-02, 2 le 10 à Amiens. Corbie: 1M.1F. le 10 oct., 1M. 2F./im. le 31, 1M. du 9 nov. au 3 déc. D'après "l'Atlas..." : "... La plupart de ces oiseaux quittent

en hiver les provinces au nord de Lyon et rejoignent leurs congénéres plus méridionaux qui sont relativement sédentaires

Bruant des roseaux (Emberiza schoeniclus) Nicheur commun. 50 les 9 et 17 nov. à Daours, 70 le 26, 40 le 9 déc.

Bruant des neiges (Plectrophenax nivalis) HA: 10 début février, 30 les 13 et 28 nov., 20 le 19 déc. BS: 7 le 17 nov., 12 le 19, 8 le 24.

Pinson du Nord (Fringilla montifringilla) Derniers : 1M. 3F. leed 2 avril à Sailly-le-Sec.

Tarin des aulnes (Carduelis spinus) 10 le 4 janvier à Amiens. 1er : les 23 et 24 sept. à Amiens. 5 le 16 nov. à Corbie.

Linotte à bec jaune (Carduelis flavirostris)

2 le 3 janvier en BS, 6 le 17 nov., 2 le 19.
1 le 20 nov. à Rue, 10 le 10 déc. en BA, 3 le 11 au Hourdel.

Sizerin flammé (Carduelis flammea)
Signalé le 31 oct. à Vermand-02, 2 le ler déc. à Quend.

Serin cini (Carduelis serinus)

ler : le 21 février à Saint-Gratien.

Derniers (à l'intérleur) : 2 le 3 oct. à Amiens

Hivernage sur le littoral : 1 le 11 déc. à Saint-Valery
sur-Somme.

Bec-croisé des sapins (Loxia curvirostra).

Gros-bec (Coccothraustes coccothraustes)
1 le 24 mars et le 19 avril en forêt de Compiègne-60.

Moineau friquet (Passer montanus)

50 le 29 février à Boves.
Daours: 100 le 9 nov., 300-400 le 17, 120 le 26, 400 les
9 et 15 déc.

Btourneau sansonnet (Sturnus vulgaris)
1500 le 10 oct. à Riencourt.

Loriot d'Europe (Oriolus oriolus) ler : le 8 mai à Sailly-Laurette. Dernier : le 23 août au Hamel.

Corneille mantelée (Corvus corone cornix)

BS-POM: 50 les 25 janvier et 22 février, 40 le 27 mars,

1 le 4 avril (dernière), 1 le 22 oct. (lère), 60

à 80 pendant la 2e quinzaine de nov., 110 le 2

déc., 160 le 7, 150 le 29.

A l'intérieur, 1 le 7 février à Saveuse, 1 le 9 déc. à

Saint-Fuscien.

安安安安安

CORRIGENDA (Synthèse 1975 - L'Avocette I(1) 1-15)

Héron cendré (Ardez cinerea)

La présence d'une colonie dans l'Oise demanderait à être

confirmée.

Faucon kobez (Falco vespertinus)

La commune de Baillon ne se trouve pas dans l'Oise mais

dans le Val d'Oise.

and the state of an establishments.