

## BIBLIOGRAPHIE :

- COCU G. (1936) : La hutte de Thézy (près d'Amiens). Bull. Soc. Lin. Nord de la France, 26. p. 24-37.
- COMMECY X. et MERCIER E. (1980) : Evolution du statut de la pie grièche grise *Lanius excubitor* dans la Région de Boves 1973-1979. *L'AVOCETTE* 1980, 4 (1-2) p. 38 - 41.
- COMMECY X. (1988) : Intérêt ornithologique de la réserve Naturelle de l'étang saint Ladre de Boves (Somme). Doc. multicop. G.E.P.O.P. - D.R.A.E.
- COMMECY X., FLOHART G., GAVORY L. et SUEUR F. (1990) : Synthèse des observations ornithologiques de 1988 en Picardie. *L'AVOCETTE* 1990-14 (3-4) p. 92 à 135.
- COMMECY X. (1991) : Hivernage et reproduction des rapaces diurnes dans le Sud-Est amiénois, Somme. *L'AVOCETTE* 1991 -15 (2-3-4) P. 41 à 52.
- NEVEU G. et ROYER P. (1988) L'avifaune de la confluence des vallées de l'Avre et de la Noye. 2ème période 1977-1988. *L'AVOCETTE* 1988-12 (3) p. 97 à 165.
- NEVEU G. et ROYER P. (1991) : Nidification du Hibou des marais *Asio flammeus* dans la vallée de la Noye (80) en 1991. Statut de l'espèce. *L'AVOCETTE* 1991-15 (2-3-4) P. 53 à 56.
- NEVEU G. et ROYER P. (1994) : La nidification du Héron cendré *Ardea cinerea* dans le département de la Somme : historique et installation d'une colonie dans la vallée de la Noye. *L'AVOCETTE* 1994 -18 (1-2) p. 5 à 10.
- ROYER P. (1991) : Note sur la nidification hivernale du Grèbe huppé *Podiceps cristatus* dans la vallée de l'Avre. *L'AVOCETTE* 1991-15 (2-3-4) p. 29 à 39.
- ROYER P. (1992) : Un comportement particulier chez la Bergeronnette des ruisseaux *Motacilla cinerea*. *L'AVOCETTE* 1992 -16 (1-2) p. 7 à 9.
- RIGAUX T. (1990) : Stationnements hivernaux d'oiseaux d'eau. Compte rendu du recensement B.I.R.O.E. organisé à la mi-Janvier 1990 en Picardie. *L'AVOCETTE* 1990-14 (2) p. 81 à 89.

## KLEPTOPARASITISME DU FAUCON CRECERELLE *FALCO TINNUNCULUS* ENVERS UN HIBOU DES MARAIS *ASIO FLAMMEUS*

Par Y. LECOMTE

Le 4 Avril 195, à 18h10, près des gravières de Moru-Pontpoint, en compagnie de mon épouse et de mon fils, nous avons été les spectateurs d'une scène étonnante. De retour des gravières, nous apercevons un "gros rapace nocturne" en chasse. Le temps de nous arrêter, nous cherchons l'oiseau que nous avons rapidement identifié comme étant un Hibou des marais.

Après une attaque infructueuse il se perche puis plonge au sol et capture un rongeur que nous n'avons pas déterminé. Se posant sur un pieu pour le manger, il est alors attaqué par un faucon crécerelle qui fond sur lui, les serres en avant et qui lui prend la proie. Le hibou réagit rapidement envers le voleur, le poursuit et l'attaque en vol... serres en avant. Le Faucon crécerelle en fut déséquilibré mais il reprit son vol et alla consommer son larcin qu'il avait su conserver dans un Saule pleureur *Salix babylonica* proche. Le Hibou, lui, changea de secteur de chasse!

Observer un Hibou des marais est déjà peu courant. de plus, volé!

Ce phénomène de vol de proie entre 2 oiseaux d'espèces différentes, appelé kleptoparasitisme, est assez fréquent. Dans *L'AVOCETTE*, F. SUEUR (1991) a déjà signalé de tels comportements mettant en jeu d'autres espèces (Limicoles et Laridés). GEROUDET (1984), ne signale pas ce phénomène pour les rapaces cités ici.

## BIBLIOGRAPHIE :

- GEROUDT P. (1984) : Les Rapaces diurnes et nocturnes d'Europe. Neuchâtel (Delachaux et Niestlé). 426p.
- SUEUR F. (1991) : Kleptoparasitisme du Goéland cendré *Larus canus* et de la Mouette rieuse *Larus ridibundus* vis à vis du Vanneau huppé *Vanellus vanellus* et du Pluvier doré *Pluvialis apricaria*. *L'AVOCETTE* 15 (2-3-4) p. 95-97.