

SYNTHESE DES OBSERVATIONS ORNITHOLOGIQUES DE 2000 EN PICARDIE

Par Picardie-Nature

INTRODUCTION

Nous avons promis de raccourcir les délais entre la fin des relevés de terrain et la publication de cette synthèse des observations de l'année 2000. Nous le souhaitons car nous croyons à l'intérêt de cette publication, tant pour les informations qu'elle fournit à la communauté scientifique ou citoyenne que par l'aspect stimulant qu'elle procure au groupe : pouvoir replacer son observation au sein de toutes celles qui ont été relevées. Malgré cette volonté, la succession d'étapes à réaliser pour arriver au produit fini (les pages que vous avez entre les mains) est telle que cela prend toujours autant de temps et que le retard de parution est grand. Nous allons nous efforcer de réduire ce délai. Vœux pieux ?

Dans la continuité des précédentes synthèses, les informations présentées sont synthétiques ! Les personnes intéressées par un travail particulier sur telle ou telle espèce peuvent retrouver les précisions en interrogeant notre base de données où sont enregistrées toutes les observations transmises avec leur intégralité de détails (selon les modalités définies par l'association).

Les chiffres de la synthèse

En cette année 2000, **106** observateurs ont fourni 23519 informations originales sur 282 espèces (les observations banales sur les espèces ubiquistes ne sont pas reprises). Cette année, le département de l'Aisne est le parent pauvre (2195 citations issues de 149 communes – soit 18%), un observateur régulier n'ayant pas fourni ses informations. L'Oise et la Somme se tiennent avec respectivement 10869 et 10455 citations, mieux réparties dans l'Oise (377 communes visitées – soit 53%) que dans la Somme (277 communes – soit 34%).

Les citations se répartissent mensuellement ainsi :

mois	Janv.	Fev.	Mars	Avr.	Mars	Juin
Nb. citations	1490	1916	2159	2381	1880	1647
mois	Juil.	Août	Sespt.	Oct.	Nov.	Dec.
Nb. citations	1856	2470	1947	2049	1942	1781

Les journées les plus riches en nombre d'espèces observées sont, par ordre décroissant : les 25/06 et 05/08 (95 espèces), 25/04 et 01/05 (94 espèces), 05/03 (93 espèces), 25/03 (87 espèces)..... soit en périodes de migration pré-nuptiale et de nidification. Bonne lecture et nous vous laissons le plaisir de retrouver les informations sur les espèces ou sites qui vous intéressent particulièrement ou les données

d'espèces remarquables si c'est votre plaisir. Cette synthèse a toutes ces ambitions.

ABREVIATIONS UTILISEES


Localités :

BdA : Baie d'Authie (80)
 Bdd : Bassins de décantation
 BddAsL : Bassins de décantation d'Aulnois-sous-Laon (02)
 BddC : Bassins de décantation de Chevières (60)
 BddGL : Bassins de décantation de Grand-Laviers (80)
 BdlQF : Bassins de lagunage de Quend – Fort-Mahon (80)
 BdS : Baie de Somme (80)
 BVS : Basse Vallée de la Somme (80)
 DPM : Domaine Public Maritime (80)
 FD : Forêt Domaniale
 FDC : Forêt Domaniale de Compiègne (60)
 HA : Hable d'Ault (80)
 LSM : gravières de Longueil-Sainte-Marie (60)
 MDBM : Marais du Bout du Monde (Amiens - 80)
 MP : gravières de Moru-Pontpoint (60)
 MVO : Moyenne Vallée de l'Oise (de Noyon-60 à La Fère-02)
 MVS : Moyenne Vallée de la Somme (80)
 PEA : Plan d'Eau de l'Ailette (02)
 PMP : Plaine Maritime Picarde (80)
 POM : Parc Ornithologique du Marquenterre (80)
 RNBdS : Réserve Naturelle de la Baie de Somme (80)
 RNMI : Réserve Naturelle des Marais d'Isle (Saint-Quentin - 02)
 VH : gravières de Verneuil-en-Halatte (60)


Divers :

ad. : adulte avr. : avril* cht. : chanteur
 cple(s) : couple(s) déc. : décembre*
 F : femelle F/im. : femelle ou immature
 (E) : en vol vers l'est fév. : février*
 im. : immature ind. : individu janv. : janvier*
 juil. : juillet* J : juvénile M : mâle
 max. : maximum min. : minimum
 (N) : en vol vers le Nord nov. : novembre*
 (O) : en vol vers l'ouest obs. : observation
 oct. : octobre* P : pullus ou pulli
 parc. : parcelle plrs : plusieurs
 (S) : en vol vers le sud sept. : septembre*
 * quand l'abréviation ou le nom d'un mois sont immédiatement suivis d'un chiffre, la combinaison alphanumérique (ex. : janv.1) désigne la décade associée au numéro (première décade de janvier dans l'exemple). Les effectifs par mois ou par décade sont mentionnés de la façon suivante : 25/fév. ou 25/fév.1


Répartition des inventaires en janvier 2000




Répartition des inventaires en février 2000




Répartition des inventaires en mars 2000




Répartition des inventaires en avril 2000




Répartition des inventaires en mai 2000




Répartition des inventaires en juin 2000




Répartition des inventaires en juillet 2000




Répartition des inventaires en août 2000



Répartition des inventaires en septembre 2000



Répartition des inventaires en octobre 2000



Répartition des inventaires en novembre 2000



Répartition des inventaires en décembre 2000



LISTE ET COORDONNEES DES REDACTEURS

Introduction	Xavier Commecy
Bilan météorologique	Xavier Commecy
Des Plongeurs aux Flamants	Xavier Commecy
Les Canards	Xavier Commecy
Les Rapaces	Emmanuel Fournier
Des Perdrix à la Grue cendrée	Xavier Commecy
De l'Huïtrier pie aux Vanneaux	Xavier Commecy
Des Bécasseaux à la Bécasse des bois	Hermann Isebrandt
Des Barges aux Phalaropes	Frédéric Blin
Des Labbes aux Pics	Hermann Isebrandt
Des Alouettes aux Bruants	Pascal Malignat

Coordonnées des rédacteurs

Frédéric Blin : 118 rue Jean Jaurès - 80000 AMIENS – f.blin@club-internet.fr

Xavier Commecy : 4 place GODAILLER DECAIX - 80800 GENTELLES xavier.commecy@wanadoo.fr

Emmanuel Fournier : 7 allée de Mongins apt 210 80000 AMIENS manu.fournier@voila.fr

Hermann Isebrandt : 138 rue cabanes – résidence le flor 42- 30000 NIMES

Pascal Malignat : 15 Rue de la carrière. 60300 SENLIS

LISTE DES OBSERVATEURS

Liste des observateurs ayant transmis leur rapport d'observations (données brutes) :

ALIPRE Michael	FOURNIER Emmanuel	MOREAU Philippe
ARBOUCH Hélène	FRANCOIS Rémi	MORENIAUX Joël
BARADEZ Rémi	GAVORY Laurent	NANSOT Thierry
BARAILLER Jean-Luc	GERNET Jean-Marie	NOEL Frédéric
BARANDE Serge	GIOVANNI Philippe	PASSEPONT Dany
BARRAULT Frantz	GODREAU G.	PHILIPPE Giovanni
BARON Nathalie	GUENETEAU Stéphane	PICHENOT Julian
BAS Yves	GUERVILLE Mickael	PINCHON Jean-Claude
BAUDRY Gérard & Francine	GUYOMARD Frédéric	POIRIER Gérard
BAVEREL Didier	GUYOT Claude	PORTECOP Jean-Marie
BAWEDIN Vincent	HELLUIN Gilles	RANCE Philippe
BECKER Jean-Claude	HERVE Christophe	RENAUD Jean-Michel
BIGORNE Jean-Luc	JABOUILLE	RICHARD Michel
BLIN Frédéric	JUKOWSKY Marie Christine	RIGAUX Thierry
BONNEL Jean-Philippe	LACOURT Claude	ROUGE Alain
BOUCHINET Frédéric	LANGLET Yves	ROYER Pierre
BOUSSEMART Aurore	LARZILLIERE Laurent	SAINT-MARC Jean-Luc
BOUTINOT Nelly	LAURENT Denis	SCUOTTO Carlos
BOUTINOT Serge	LE KERVERN Arnaud	SEIGNEZ Bertrand
CAILLOT Pierre	LE SCOUARNEC Yannick	SENECAL Didier
CARON Stéphane	LECOMTE Yves	SENGEZ Pierre & Marc
CARRUETTE Philippe	LEFUR Philippe	SPINELLI Franck
CHARLIER Jean-Pierre	LEGAY P.	TANGUY Jean-Luc
CHEVECHE Philippe	LEGRIS Sébastien	THIEBEAUX Alexandre
COHEZ André	LELEU Daniel	THIERY Sylvain
COHEZ Damien	LENNE Patrice et Jocelyne	TRIPLET Patrick
COMMECY Xavier	LESIEUR Marcel	TUNE Bruno
CORBEAU Yves	LITOUX Jacques	VIOLET Florent
COUVREUR Bernard	LOPEZ Michel	VOTTE Jérôme
DANCOINE Charles	LOUVET Cédric	VOTTE Martial
DAUMAL Thibaud	LYS Patrice	WALBECQUE Catherine
DE LESTANVILLE Henry	MAILLIER Sébastien	WILLIAM Alain
DECORY Patrick	MAITROT	
DEFERNAND	MALIGNAT Pascal	
DEHONDT François	MARQUE Jean Bernard	
DELOISON Gérard	MATHOT William	
FAGARD Jean-Paul	MONTEL Francis	

BIBLIOGRAPHIE

- CARRUETTE P. (2000) : L'avifaune du Parc en 2000. *Bull. ann. du parc ornithologique du Marquenterre*. 31-55.
- DUORDEAU F. (2001) : Observation d'une Fauvette grisette *Sylvia communis* en hivers dans la Somme. *Avifaune Picarde* (11) 31-32.
- GAVORY L.. (2002) : Première mention du Vanneau à queue blanche *Vanellus leucurus* en Picardie et troisième française. *L'Avocette* 26 (2-3) 67.
- SUEUR F (2000) : Actes ornithologiques 2000 de la réserve Authie-Somme. *Avifaune picarde* 9 : 51-57.
- SUEUR F., CARRUETTE P., TRIPLET P., & VIOLET F., (2001) – Actes ornithologiques 2000 de la Réserve Naturelle de la Baie de Somme. *Avifaune picarde* 11 : 1-29.
- TRIPLET P., SUEUR F., ROBERT J.-C., URBAN M. & VIOLET F. (2000) - Chronique ornithologique du Hâble d'Ault (Somme) : année 2000. *Avifaune picarde* 11 : 33-50.
- VIOLET F. (2000, recensement 2000 des oiseaux nicheurs des falaises picardes. *Avifaune picarde*, 67-7.
- AVOCETTE -2002 – 26 (4) : Synthèse des observations ornithologiques de 2000 en Picardie

SYNTHESE PAR ESPECE

PLONGEON CATMARIN *Gavia stellata*

(34 données)

Aisne : 1 les 14 et 16 avril à Epieds (A. BOUSSEMARY).

Somme : Toutes les obs. en PMP Les plus tardifs sont vus le 29/03 et le retour noté le 22/10.

Peu de gros rassemblements, max. : 16 le 20/02 au H.A., 14 le 9/01 en RNBdS, mais 50 Plongeurs sp. le 23/01 en mer au large de Cayeux-sur-mer, probablement surtout des P. catmarins (X. COMMECY).

7 trouvés morts sur les plages ; 4 ramassages sur les côtes ont été organisés cette année.

PLONGEON ARCTIQUE *Gavia arctica*

(7 données)

Toutes les obs. en PMP. Max. de 6 le 27/02 en mer de Ault à Cayeux-sur-mer (X. COMMECY), 2 le 19/03 à Ault (F. DEHONDT), le dernier de la saison.

Retour le 24/09, 1 en BdA (F. SUEUR, 2001).

6 trouvés morts sur les plages.

PLONGEON IMBRIN *Gavia immer*

(3 données)

1 au PEA (02) du 03/01 au 09/01 (D. BAVEREL).

GREBE CASTAGNEUX *Tachybaptus ruficollis*

(502 données)

Nidification :

Aisne : certaine ou probable de 9 sites pour 41 c. repérés (RNMI, 25 c, Maizy, 6 c...).

Pour 8 familles, 20 p. Moyenne : 2.5 p./c.

1 site de nidification possible pour 1 c.

Oise : certaine ou probable de 14 sites pour 37 c. repérés (BddC, 15 c. ; PM, 9 c...). Pour 2 familles, 4 et 3p.

3 sites supplémentaires de nidification possible pour autant de c.

Somme : certaine ou probable de 16 sites pour 38 c. repérés (POM, 14 c.; Bussy-les-Daours, 3 c...).

Pour 14 familles, 32p., moyenne : 2.2 p./c.

4 sites de nidification possible pour autant de c.

Migrations et hivernage :

Nombre de sites avec plus de 10 oiseaux observés, chaque site compté une fois par mois.

	janv.	fév.	mars	avr.	mai	juin
2	1	1				
60	1		1	2		
80	6		1	1		
	juil.	août	sept.	oct.	nov.	déc.
2		2	1	1		1
60		3	3	1	1	1
80		8	6	3	2	1

Max. : Aisne, 24 le 20/08 à Origny-Sainte-Benoîte.

Oise : A MP, 33 à 39 en août (reproducteurs locaux), 56 mi-sept., lente régression ensuite (max. par décade ; oct. 37/39/26. ; nov. 32/18/24 ;

dec. 22/23/12. Hivernage faible comme il l'était en janv. (11) et fév. (6).

Somme : Pour le POM voir SUEUR (2001). Pour la vallée de la Bresle voir NOËL (2003), mais de nouvelles données (G. HELLUIN) montent les max. à 202 en sept., 246 en oct., 338 en nov., 310 en déc. pour l'ensemble de la zone. Ceci fait de la basse vallée de la Bresle un site d'importance nationale pour cette espèce.

GREBE HUPPE *Podiceps cristatus*

(681 données)

Nidification : Aisne : certaine ou probable de 11 sites pour 61 c. repérés (RNMI, 25 c. ; Viry-Noureuil, 15 c., Bucy-le-long, 5c., Vailly-sur-Aisne, 5c ...).

Pour 7 familles, 14 p. Moyenne : 2 p./c.

2 sites supplémentaires de nidification possible pour autant de c.

Oise : certaine ou probable de 17 sites pour 22 c. repérés.

Pour 10 familles, 28 p. Moyenne : 2.8 p./c.

7 sites supplémentaires de nidification possible pour autant de c.

Somme : certaine ou probable de 29 sites pour 97 c. repérés. 7 sites supplémentaires de nidification possible pour autant de c.

Vallée de la Somme : 16 sites (+ 3), 60 c. (+3) (Bray-sur-Somme, 9 c. ; Frise, 9 c. ; Fontaine-sur-Somme, 8 c. ; Camon, 5c. ; Cappy, 4 c. ...) ; autres vallées du département : 10 sites (+4) pour 23 c (+1) (Boves, 7c. en 2 sites ; Basse vallée de la Bresle, 9c. en 4 sites)...

PMP : 3 sites pour 14 c.

Pour 34 familles, 93 p. Moyenne de 2.7 p./c.

Migrations et hivernage :

Aisne : PEA (Chamouille), 31 le 31/01 ; 85 le 21/02 ; 115 le 24/03 ; 80 le 26/09 et le 23/10 ; 90 le 27/11 ; 120 le 28/12. Rassemblements remarquables.

Oise : C'est sur les gravières de MP que sont notés les plus gros rassemblements : 33 le 20/01 ; 16 le 11/02 ; 12 le 2/03 ; 32 le 21/08 ; 48 le 19/09 ; 73 le 24/10 ; 82 le 8/11 ; 68 le 19/12.

Ailleurs, 67 le 29/01 à VH ; 33 le 04/02 à Beauvais ; 28 le 23/02 à Bailleul-sur-Thérain...

Somme : Pas de gros rassemblement observé en mer, quelques uns remarquables en vallées : basse vallée de la Bresle, 144 le 15/09 ; 130 le 15/10 ; 176 le 15/11 ; 152 le 15/12. Moyenne vallée de la Somme : 75 le 12/01 de Bray-sur-Somme à Péronne....

4 trouvés morts sur les plages.

GREBE JOUGRIS *Podiceps grisegena*

(10 données)

Oise : 1 J. à MP les 08 et 09/11 (F. BOUCHINET, P. SENGEZ et J.J. FAGARD)

Somme : Tous en PMP. POM. : 1 le 09/01 ; H.A. : 5 le 20/02 (Y. BAS), 2 le 21/03 (X. COMMECY)

POM : 1 le 01/09 (SUEUR 2001) ; Le Crotoy (marais) : 1 J. le 22/09 (P. DECORY) ; H.A. : 2 le 14/10 (X. COMMECY).

3 trouvés morts sur les plages.

GREBE ESCLAVON *Podiceps auritus*

(24 données)

Aisne : 4 le 29/01 à Berny-rivière (J. VOTTE) ; 1 le 25/02 à Courtemont-Varennnes (A. BOUSSEMARTE) ; 1 le 18/11 à Beautor (X. COMMECY).

Oise : 1 à Beauvais les 9 et 10/03 (F. BOUCHINET) ; 1 à MP du 08/11 au 05/12 (W. MATHOT et al.), pas d'obs. entre le 19/11 et le 04/12).

Somme : Tous en PMP. H.A. : 1 du 01/01 au 14/01 (P. DECORY et al.) ; 2 le 09/05 (SUEUR 2001) ; 1 du 11/11 au 03/12. POM : 1 les 14 et 15/01 ; 1 le 12/12. St-Valery-sur-Somme : 1 le 23/02 (T. DAUMAL).

GREBE A COU NOIR *Podiceps nigricollis*

(75 données)

Aisne : Lislet (Bdd de Montcornet) 1 le 08/05 ; 4 le 24/06 et 1 le 20/08 aux Bdd d'Origny-St-Benoîte (F. NOËL et H. ARBOUCH). Ces obs. en Bdd doivent faire penser à des reproducteurs possibles.

Oise : Bdd Bresles, 1 le 02/07 ; BddC, 4 le 18/05, 6 le 21/05, 1 J. le 16/07 ; Houdancourt : 2 à 4 du 31/03 au 30/07 et même 12 le 07/04 ; MP : 1 les 14 et 15/07 ; 2 le 08/11, 1 du 19 au 25/11 (petite année pour ce site) ; Bdd Vauciennes, 2 en mai, 4 en juin, 3 en juillet, 4 en août, 2 en 09, 1 le 01/10 ; VH, 1 le 22/07. Même s'il n'y a pas de certitudes de nidification rapportées, là encore ces données doivent faire penser à des reproducteurs possibles pour plusieurs sites.

Somme : Hors PMP : 2 c. paraded à Roye et 1 le 31/07 à Thennes (X. COMMECY)

PMP : HA : observé du 01/01 au 10/06 et jusqu'à 6 à la mi-mars (traces de passage) puis du 26/08 au 19/12 (max. 2). BdlQFM max. mens. 2/janv. ; 8/mars ; 18/04 ; 14/05 ; 15/07 ; 19/08 ; 18/09 ; 20/10 et 11 ; 12/12 (T. RIGAUX). Ailleurs, obs. isolées d'oiseaux à l'unité en mars (1) ; avr. (2) ; sept. (1).

FULMAR BOREAL *Fulmarus glacialis*

(3 données)

En dehors des falaises, site de nidification, 1 le 21/02 en RNBdS (trace du passage à cette époque).

5 trouvés morts sur les plages.

FOU DE BASSAN *Morus bassanus*

(13 données)

Peu noté cette année mis à part 317 (dont seulement 64 ad.) le 26/08 au large de Cayeux -sur-mer (X. COMMECY), 32 le 16/04, 10 le 05/11....

8 trouvés morts sur les plages.

PELICAN BLANC *Pelicanus onocrotalus*

(4 données)

1 oiseau échappé du Parc de Bagatelle (62) a égayé les visites de nombreux observateurs au HA entre le 10/09 et le 22/10. Puis il fut capturé.

GRAND CORMORAN *Phalacrocorax carbo* (235 données)

Aisne : Suivi du dortoir du PEA (max. mens.) ; 63/janv. ; 75/fev. ; 45/mars ; 2 le 04/avr. ; 4 le 26/juin ; 15/juil. ; 18/août ; 17/sept. ; 50/oct. ; 115/nov. ;

210/dec. (D. BAVEREL). Ce suivi montre clairement le statut de l'espèce dans ce département intérieur.

Autre dortoir : 200 le 21/02 à Tergnier.

Oise : Suivi à MP (max. mens.) : 176/01 ; 62/02 ; 24/03 ; 80/09 ; 100/10 ; 65/11 ; 209/12.

Autres grands groupes (hors vols migratoires) : 280 le 29/11 et 240 le 06/12 à Pont-St-Maxence (A. LE KERVERN) ; 250 à Gouvieux le 03/10 (J.M. GERNET) ; 100 le 12/03 à VH. ; et le 23/09 à L.S.M..

Migrateurs actifs en février (1 fois) ; sept. (4 fois pour 90 + 70 + 68 + 52) ; oct. (3 fois pour 22 + 22 + 6) ; nov. (4 fois pour 180 + 17 + 7 + 7) ;

Somme : **Nidification**, 2 colonies ; une proche du littoral : Arry, 219 nids le 13/05 (T. RIGAUX) ; une en haute vallée de la Somme, Péronne : 125 nids le 11/02.

Dortoirs : Ault (falaises) : 23 le 06/08 ; Arry : 1010 le 28/07, 990 le 27/08 (T. RIGAUX) ; Régnières-Ecluse : 205 le 23/01 ; Péronne : 124 le 12/01.

Sur le littoral, suivi des stationnements. Attention des oiseaux peuvent circuler entre ces différents sites, on ne peut les additionner directement.

	janv.	fév.	mars	avril	mai	juin
POM-RNBdS	65	62	84	174	193	153
BdA	15	19	7	104	105	106
H.A.	33	22	45	203	238	183
	juil.	août	sept.	oct.	nov.	déc.
POM-RNBdS	410	1188	1132	350	105	58
BdA	215	270	125	25	11	
H.A.	350	221	178	51	75	49

Migrateurs actifs hors PMP : en février (1 fois pour 6) ; mars (2 fois pour 35 + 45) ; avril (1 fois pour 13) ; sept. (5 fois pour 90 + 70 + 68 + 52 + 32) ; oct. (4 fois pour 22 + 22 + 10 + 6) ; nov. (5 fois pour 180 + 23 + 17 + 7 + 7).

Les périodes de passage sont bien marquées.

5 trouvés morts sur les plages.

BUTOR ETOILE *Botaurus stellaris*

(28 données)

Uniquement en PMP, la réduction des effectifs dans les vallées picardes est donc drastique.

Basse vallée de la Somme, 1 chanteur en avril et mai à Boismont ; 1 autre le 01/04 à Port-le-Grand.

H.A. : hivernant en janv. ; chanteur en mai, juin ; 1 à 2 régulièrement observés d'août à déc.

POM. : 1 début déc. Villers-sur-Authie : 1 en fév., mars, oct.

BLONGIOS NAIN *Ixobrychus minutus*

(33 données)

Aisne : 1 régulier à Liesse-notre-Dame ; 2 le 17/08 à la R.N. de Saint-Quentin.

Oise : 1 chanteur à Sacy-le Grand le 04/06 ; 1 les 1 et 2/08 en bordure d'un étang en F. de Compiègne.

Somme : Amiens - Camon, 2 à 3 couples dans les Hortillonages ; Belloy-sur-Somme : 1 c. ; Boves : 2c. / mini 2X1J. en 1 site et 1 c. dans un autre site ; Cottency : 1c./mini 1 J. (1 bagué le 22/07) ; Mareuil-Caubert : 1 ; Moreuil : 1c. ; POM : 1 J. à la mi-juillet.

Dates extrêmes de présence : 21/04 - 17/09.

BIHOREAU GRIS *Nycticorax nycticorax*

(38 données)

Oise : 1 le 02/10 à Pontpoint (F. BOUCHINET)

Somme : Tous en PMP. Villers-sur-Authie, 1 le 15/05 ; Basse vallée de la Somme, 2 le 03/04 ; HA : 2 J. le 22/08 ; Rue, 1 cht. le 29/04 ; POM : 1 hivernant en janv. ; 1 à 2 en mars-avril ; 5 en mai ; 1 à 2 de juin à fin sept., 4 du 24 au 28/09.

HERON GARDE BŒUF *Bubulcus ibis*

(77 données)

Tous du littoral, autour du POM, des individus se dispersant dans la journée à la recherche de nourriture (Rue, Le Crotoy - max. 35, plusieurs obs. de plus de 20...)

POM (max. mensuels) : 50/janv. ; 40/fev. ; 40/mars (arrivée à la colonie en milieu de mois) ; 20/avr. ; 18/mai ; **Nidification**, 2 c. 2X3p. Envol en juin ; 68/août ; 93/sept. ; 74/oct. ; 74/nov. ; 61/dec..

AIGRETTE GARZETTE *Egretta garzetta*

(115 données)

Oise : 1 le 04/06 à Vauciennes ; 1 le 30/07 à Houdancourt ; 1 du 14/08 au 23/09 à L.S.M.

Somme : **Nidification** : 25 nids au POM (d'après F. SUEUR 2001) ; 17 nids à Boismont (V. BAWEDIN et X. COMMECY).

L'essentiel (tous?) des oiseaux se regroupent en fin de journée au POM où les valeurs atteintes en fin d'été sont considérables, de même qu'en début d'hiver :

POM (max. mensuels) : 286/janv. ; 253/fev. ; 234/mars (arrivée à la colonie en milieu de mois) ; 50/avr. ; 13/mai ; 73/juin ; 152/juil. ; 898/août ; 775/sept. ; 645/oct. ; 645/nov. ; 514/dec..

Dans la journée on rencontre des groupes de ces oiseaux, au Crotoy (max. 16 en sept), en BdA (plusieurs dizaines en juin, août, sept., les autres mois en plus petit nombre), St-Valery-sur-Somme (max. 6 en août). Au HA la présence est régulière toute l'année mais en petit nombre : moins de 10 sauf 11 le 11/03.

2 trouvées mortes sur les plages (1 plombée!).

GRANDE AIGRETTE *Egretta alba*

(81 données)

Aisne : 1 au PEA du 31/01 au 15/02, 1 le 18/10 (D. BAVEREL et al.) ; 1 à Epieds le 01/04 (A. BOUSSEMARY);

Oise : 1 le 16/09 à Houdancourt (P. MALIGNAT).

Somme : Toutes en PMP où elle est présente toute l'année.

POM (max. mensuels) : 20/janv. ; 21/fev. ; 6/mars ; 1/avr. ; 2/0mai ; 2/juin ; 2/juil. ; 11/août ; 14/sept. ; 16/oct. ; 26/nov. ; 23/dec..

Se dispersent à partir de ce centre en BdA (1 les 19/06 et 20/12) ; BdlQF (2 le 23/08, 1 le 4/11) ; N/M : 3 le 02/01 ; Rue ; 5 le 23/12....

HERON CENDRE *Ardea cinerea*

(510 données)

Aisne : **Nidification** : Fontenoy, 24 nids (J. VOTTE) ; R.N. Saint-Quentin, 25 nids.

Plus gros **rassemblements** (hors sites de nidification) : PEA : 13 le 04/07 ; 12 les 03/08 et 04/09 ; 10 les 16/08 et 29/08....

Oise : max. : 12 les 23/10 et 17/11 ; 11 les 17/12 et 19/12 ; 10 le 12/03 en différents sites. Peu abondant donc et surtout présent en hiver.

Somme : **Nidification** : Boismont, 214 nids ; 71 nids à Fouencamps ; 17 nids à Glisy ; 51 nids à Péronne ; 67 nids au POM ; 30 à 33 nids à Hangest-sur-Somme.

Nombreuses observations de plusieurs dizaines d'individus

HERON POURPRE *Ardea purpurea*

(4 données)

Aisne : 1 à Luzoir le 07/05 (F. NOËL et H. ARBOUCH).

Oise : 1 à Houdancourt le 25/07 (F. BOUCHINET)

Somme : 1 au POM les 25/07 et 25/08.

Peu d'observation cette année.

CIGOGNE NOIRE *Ciconia nigra*

(19 données)

Oise : 1 le 15/08 à Cinqueux (P. MATHOT)

Somme : Toutes en PMP. 1 obs. en mai ; 1 en juin ; 4 en juillet ; 8 en août (max. 3 le 30/08) ; 4 en sept., dernière le 23/09.

CIGOGNE BLANCHE *Ciconia ciconia*

(58 données)

Aisne : 10 données ; 3 du 13/04 au 13/05, 7 du 11/08 au 03/09 Max. : 86 le 11/08 à Landouzy-le-ville (P. Moreau) ; 17 le 17/08 à RNMI. 1 tuée par électrocution - bague aux Pays-bas le 12/08 à Plomion).

Oise : 15 données ; 2 du 02/04 au 24/04, 13 du 06/08 au 25/09. Max. 132 le 22/08 à Margny-sur-Matz (H. de LESTANVILLE), 20 le 31/08... 4 données de plus de 10 oiseaux.

Somme : **Nidification** : minimum 2 c. au POM.

Hors PMP, 4 données, 1 en août, 2 en sept et 1 en nov. Observée toute l'année sur le littoral. Au POM, **hivernages** 28 en janv., 27 en nov. et 26 en déc.

Max. : 28 le 25/08.

SPATULE BLANCHE *Platalea leucorodia*

(108 données)

Uniquement en PMP, surtout en RNBdS-POM où l'espèce **hivern** (6 de début janv. à mi-fév.), 13 fin déc. et **niche** : 6 couples. **Migrations** visibles fin fév., puis augmentations des effectifs fin juillet, en août et sept. (max. par décade) Août : 76/114/114 – sept. : 86/179/40. Fréquente aussi en BdA (max. 28 le 11/08), au H.A. (en avril, août, sept. et oct. max. 4), la basse vallée de la Somme (max. : 33 le 05/04), le marais du Crotoy...

CYGNE TUBERCULE *Cygnus olor*

(531 données)

Nidification : Aisne : en augmentation, 4 sites, Bucy-le-Long, 1c./3p. + 2c.; Mont St Père, 1c./3J. ; PEA 1c./6J.; Viry-Noureuil, 1c. : 6J.

Oise : Là aussi en augmentation. Breuil-le-sec, 1c./3p. ; Chevières, 1c. probable ; Coye-le-Forêt, 1c./2p. ; LSM, 1c./4p. ; Pontpoint, 3 familles pour 13 p. ; St-Félix, 1c./4p. ; Verberie, 1c. ; VH, 1c./3p.

Somme : en PMP, beaucoup de couples nicheurs : 26 repérés (15 en BVS, 4 au HA, 2 au POM, aux BdlQF et au Crotoy, 1 à Rue. Pour, 19 familles, 94 p. soit une moyenne de 4.9 p./c.

Dans la vallée de la Somme, 7 sites pour 10 c., 4 familles repérées. Dans les autres vallées du département : 4 sites pour 5 familles. Pour ces 9 familles, 50 p. moyenne : 5.5p/famille.

Période inter-nuptiale :

Aisne : Quelques rassemblements dans ce département où l'espèce était, il y a peu encore très localisée : Beautor, 15 le 18/11, Courtemont-Varennnes, 16 le 16/04 ; Soissons, 28 le 29/02, 11 le 13/06, Villers-en-Prayères, 26 le 13/06 ; Viry-Noureuil, 20 le 24/06, 11 le 26/02... Remarquer la présence de groupes importants en été. Informations rapportées de 15 sites cette année.

Oise : 25 données de groupes de +10 ind. ; à noter par exemple, Beauvais, entre 20 et 30 hivernants (présence jusqu'au 08/04 et à partir du 06/08) ; Gouvieux, une dizaine d'hivernants, jusqu'à 20 en nov. ; Houdancourt, 15 à 20 de juillet à nov. ; Sacy-le-Grand, 13 le 21/07 ; St-Félix, 22 le 30/07 ; VH, 22 le 02/01, 30 le 27/08

A Pontpoint, le tableau montre les variations d'effectifs qui semblent refléter l'état de l'espèce dans le département : présence hivernale nette, quelques couples reproducteurs, abondance en été, lente décroissance ensuite.

janv.	fév.	mars	avr.	mai	juin
12	12	7	N	N	N
juil.	août	sept.	oct.	nov.	déc.
N	47	34	27	15	13

Des info sont rapportées de 27 sites avec plus de 200 données.

Somme :

Des info sont rapportées de 29 sites avec plus de 250 données dont 11 de plus de 100 ind.

Hors PMP, quelques groupes : Amiens, une quarantaine d'hivernants ; Basse vallée de la Bresles, une dizaine d'hivernants et plus de 60 en juillet et en oct. ; HVS, 36 le 12/01...

En PMP, les stationnements sont importants. Remarquer que l'on ne retrouve plus les énormes groupes estivaux au HA d'il y a quelques années, les BdlQF semblent les accueillir.

	Janv.	Fév.	Mars	Avr.	Mai	Juin
BdlQF	18	21	7	56	169	112
HA	103	70	30	16	N	N
Le Crotoy	116	88	54	N	N	N
POM	13	30	20	12	24	59
	Juil.	Août	Sept.	Oct.	Nov.	Déc.
BdlQF	208	195	76	19	7	5
HA	76	110	113	76	76	47
Le Crotoy	14	21	42	?	16	38
POM	41	36	45	58	18	30

Les totaux hivernaux et estivaux sont impressionnants d'autant que d'autres sont présents en d'autres sites : BVS, 127 le 09/01 ; Grands Laviers, 66 le 31/12, 48 le 29/10...

2 trouvés morts sur les plages (dont 1 plombé!)

CYGNE NOIR *Cygnus atratus*

(17 données)

Observé dans les trois départements de la région :

Aisne : 1 le 08/11 à Château Thierry

Oise : 1 à Saint-Félix du 10/03 au 18/07 ; 2 aux Bdd de Bresles le 07/05 ; 1 le 27/08 à VH

Somme : 1 au HA du 21/03 au 26/08 ; 3 le 02/07 aux BdlQF.

OIE DES MOISSONS *Anser fabalis* (3 données)

4 en BdA les 02/01 et 05/01 (T. RIGAUD et M. GUERVILLE) ; 4 - les mêmes ? - le 27/01 en RNBdS-POM.

OIE RIEUSE *Anser albifrons*

(7 données)

1 obs. dans l'Oise de la migration postnuptiale : 36 le 18/10 à Morienvall (J.P. FAGARD).

1 hivernante au POM jusqu'au 24/03. 1 en BdA le 20/12 (T. RIGAUD).

OIE CENDREE *Anser anser*

(124 données)

Migration pré-nuptiale :

Aisne : 6 données du 29/01 au 27/02 ; de 1 à 75 oiseaux, moyenne : 34.5 oiseaux/vol

Oise : 21 données du 07/02 au 23/03 ; de 1 à 120 oiseaux, moyenne : 43.4 oiseaux/vol

Somme (hors PMP) : 8 données du 31/01 au 27/02 ; de 13 à 200 oiseaux, moyenne : 69.9 oiseaux/vol

PMP : 16 données du 26/01 au 02/04, de 5 à 416 oiseaux, moyenne : 80.2 oiseaux/vol

Migration post-nuptiale :

Aisne : 2 données les 15 et 16/12 pour 80 et 260 oiseaux

Oise : 18 données du (06/08, 2 à Verberie) 02/09 au 24/12 ; de 2 à 220 oiseaux, moyenne : 50.2 oiseaux/vol

Somme (hors PMP) : 3 données du 20/10 au 07/12, de 22 à 95 oiseaux, moyenne : 47 oiseaux/vol

PMP : 14 données du 15/10 au 21/12, de 9 à 287 oiseaux, moyenne : 137 oiseaux/vol

PMP : 14 données du 15/10 au 21/12, de 9 à 287 oiseaux, moyenne : 137 oiseaux/vol
Cas particulier du POM où environ 200 oiseaux hivernent et où l'espèce niche, minimum 6 nids, premiers pulli le 07/04. Ces données sont exclues des informations sur les migrations où seuls les vols actifs ont été pris en compte.

OIE DES NEIGES *Anser caruleus*

(1 donnée)

1 (échappée de captivité) à la mi-juin au POM

OIE A TETE BARREE *Anser indicus*

2 au POM le 10/04

BERNACHE DU CANADA *Branta canadensis*

(9 données)

Aisne : 6 le 12/06 à Quierzy, 23 le 01/09 à Anizy-le-Château

Oise : Angy, 1 à 2 du 14/03 au 21/04; Chantilly, 4 le 08/03, 2 le 12/06 ; Précly-sur-Oise, 2 le 22/02.

BERNACHE NONNETTE *Branta leucopsis*

(9 données)

Aisne : 1 le 05/11 au PEA.

Somme : 14 hivernantes disparaissant progressivement au POM, dernière le 20/04 ; 1 le 14/10.

BERNACHE CRAVANT *Branta bernicla*

(32 données)

Au POM, du 09/02 au 04/06, max. 35. retour le 16/09 (10), max. 27 le 28/10.

BdA, 4 le 10/02 ; 1 les 9/10 et 20/12.

Sud BdS, du 20/02 au 26/04 (toujours moins de 10 oiseaux). Du 08/10 au 31/12, max. 150 le 06/12.

5 trouvées mortes sur les plages (dont 2 plombées!)

OUETTE D'EGYPTE *Alopechen aegyptiacus*

(2 données)

6 le 21/08 à Vauciennes (60) ; 1 le 04/04 au HA (80).

TADORNE CASARCA *Tadorna ferruginea*

(27 données)

Oise : 2 du 26/07 au 05/09 à Houdancourt ; 1 au BddC le 04/04.

Somme : au POM, 2 du 20/05 au 13/06, 8 (2 ad; et 6 juv.) à la mi-juillet. Encore 7 le 27/08 (dernière date de l'année); la reproduction est donc possible.

TADORNE DE BELON *Tadorna tadorna*

(282 données)

Hors PMP : **Hivernage** : Aisne : 1 le 02/01 à Vermand (Bihécourt) ; Oise : 6 obs. en 4 sites de janv. et fév. (1 à 2 individus) ; Somme : 17 le 12/01 en HVS, 14 le 11/02 à Estrées-Mons.

Nidification : Aisne : 1c./3p. à Bucy-le-Long le 13/06 (X. COMMECY) ; Oise : pas de certitude de reproduction ; Somme : 5c. parquent en mai à Estrées-Mons et 3 à Roye.

Migrations : Aisne : 6 obs. entre le 13/03 et le 24/06 : 40 le 06/05 à Origny-St-Benoîte et 25 le 24/06 ; 5 le

08/05 à Lislet (Montcornet)... ; Oise : 48 données de mars à sept., max. 7 le 19/03 à Vauciennes et le 09/06 à Houdancourt, 6 le 12/03 à Chevières... ; Somme : 5 données, 12 le 14/05 à Epénancourt, 38 les 25/03 et 10/04 à Estrées Mons...

PMP : RNBdS-POM, **Hivernage**, plusieurs milliers d'individus (9200 le 23/01, 9450 le 10/12) ; étiage de fin juillet à mi août (mini, 14 individus - migration de mue) ; **reproduction** : 102 c. appariés en avril, premiers pulli le 22/05...

BdA : (surtout d'après T. RIGAUX) :

janv.	fév.	mars	avr.	mai	juin
1000	1200	540	600	285	180
juil.	août	sept	oct.	nov.	déc.
120	45	381	160	?	1040

HA : Observé tous les mois sauf en sept. ; 11 juv. le 15/08 ; max. 156 le 20/02, 67 le 10/06... moins de 10 en hiver.

Nidification : BVS, 15 c. (Moyenne pour 9 familles, 6.4 p.) ; BdlQF, mini 4 couvées, jusqu'à 40 juv. et p. locaux ; Le Crotoy (bassin de chasse) 1c./11p. ; Rue 2 c. ; Villers/Authie 1c./2p.

29 trouvés morts sur les plages (dont au moins 4 plombés!)

CANARD MANDARIN *Aix galericulata*

(2 données)

2 obs. dans l'Oise, 1 le 17/02 à LSM ; 2 le 10/04 à Saintines.

CANARD CAROLIN *Aix sponsa*

(5 données)

Observé à Gouvieux (Toutevoie), 1 du 14/02 au 21/02 puis le 17/10.

CANARD SIFFLEUR *Anas penelope*

(132 données)

Aisne : 16 données du 09/01 au 11/04, surtout vu au PEA : 1 à 2 hivernants, 7 début mars, 20 au milieu du mois 13 le 21/02 à Tergnier et 4 à Viry-Nouereuil ; 1 le 01/04 à Courtemont-Varenes.

4 obs. du 05/12 au 20/12 (6 c dernier jour au PEA).

Oise : 34 données, 7 de plus de 10 oiseaux, entre le 05/03 et le 19/03 (max. 60 le 18/03 à Beauvais), comme dans l'Oise, le passage de début mars est net. Puis les 08/11 et 03/12.

Somme : Hors PMP, 2 le 20/10 à Boves et 1 le 21 à Gamaches.

PMP : dans les marais, (hors POM où l'espèce peut hiverner grâce à l'absence de l'activité de chasse), là encore les premiers stationnements se font après le début mars : 52 le 15, 144 le 05/04 en BVS, 145 le 21/03 au HA... derniers début avril. Quelques observations d'oct. à déc., à partir du 14/10, 22 le 20/12 aux BdlQF.

BdA : 127 le 12/01... derniers, 4 le 08/04. 1 le 17/09, 58 le 15/11, 80 le 23/12...

RNBdS-POM : plus de 200 hivernants en janv., fév. ; lente décroissance pour atteindre moins de 10 ind. à la mi-avril ; obs. en mai, juin ; retour avec 11 le 05/07, +100 après le 15/09, max. de +400 le 25/12.

CANARD CHIPEAU *Anas strepera*

(193 données)

Aisne : 7 obs. du 31/01 au 26/02 (max. de 8 ce dernier jour à Tergnier) ; 1 le 01/11 à Vermand (Bihécourt).

Oise : 41 données, **hivernant** peu abondant (max. 4 ensemble pour janv. et fév.; 17 en déc.) ; **Migrations** : 14 données en mars-avril (max. 10 ensemble) ; retour le 13/08 ; 3 données de sept. et 4 de nov. (max. 6).

Somme : hors PMP : 4 obs. entre le 17/02 et le 10/04 (max. 3).

PMP : des groupes de +10 en BVS de début mars à mi avril (max. 40).

H.A. : **hivernant** peu abondant (max. 7), **migration pré-nuptiale** nette du 21/03 (43 ind.) à la mi-avril. Pas de migration post-nuptiale remarquée.

BdIQF : observés chaque mois de l'année, max; de 27 le 05/03, 17 le 20/12... ; 3 familles le 24/06.

RNBdS-POM : une centaine d'hivernants en janv. ; et fév., - de 10 oiseaux dès la mi mars, 3 c. repérés sans certitude de reproduction, max. de 64 fin août pour la migration post-nuptiale, 131 le 25/12.

SARCELLE D'HIVER *Anas crecca*

(311 données)

Aisne : 56 données de 11 sites. Du 31/01 au 13/04, max. 24 à Tergnier le 09/02, 13 au PEA le 31/01...

1 c. au PEA (5 pulli le 03/08) (D. BAVEREL).

Quelques obs. après le début nov. (max. 100 le 05/11 à AsL, -10 pour les autres).

Oise : du 12/01 au 16/04, 31 données de 11 sites ; max. 49 le 20/02, 27 le 19/03.

Obs. de juin, juil., août à Houdancourt, La Neuville en Hez, Vauciennes et Vez (Wallu) : **nidifications** possibles.

Du 05/08 au 23/12, 43 données de 8 sites ; 90 le 6 et max. de 140 le 16/09 à Houdancourt, 110 le 01/11 et 95 le 02/12 à Vauciennes....

Somme : Hors PMP : 23 données, quelques oiseaux en **hiver** (10 à Amiens - présents jusqu'au 20/03 -, à l'unité dans 3 autres sites) ; 2 données pour 3 et 4 oiseaux en mars - avril seules traces du **passage pré-nuptial** ; 1 c. en juin à Roye **nidification?** ; 10 le 31/08 à La Chaussée -Tirancourt pour le **passage postnuptial** puis quelques belles troupes aux Bdd Roye: 21 le 30/09, 45 le 18/11...

PMP: BVS, de début mars à mi-avril, beaux stationnements : 79 le 25, 47 le 05/04...

HA, hivernant peu abondant (max. 3) ; plus nombreuses de début mars à mi-avril (70 le 09/04, 44 le 21/03...), derniers le 01/05.

BdIQF : quelques unes en hiver (max. 52 en déc., 16 en janv., 48 en fév.). Jusqu'au 14/05 et à partir du 23/08, augmentation des effectifs nette fin nov.

RNBdS-POM : **Hivernage** : 500 à 600 en janv. et fév. ; +1000 à partir de fin sept. ; max. 2135 le 25/12. Moins de 100 ind. entre la mi avril et la fin juillet. Pas de nidification repérée.

SARCELLE DU CHILI *Anas flavirostris*

(8 données)

3 le 09/01 à St-Valéry-sur-Somme (80) ; 1 les 12/01 et 18/06 à La Neuville-en-Hez (60) ; 1 le 22/07 au POM (80) ; 3 les 08 et 09/09 à Houdancourt (60) ; 2 le 09/09 à LSM (60) ; 1 le 12/11 à Beauvais (60).

CANARD COLVERT *Anas platyrhynchos*

(443 données)

Aisne : Ce département recèle un site majeur pour les stationnements de l'espèce, le PEA (max. mens.)

janv.	fév.	mars	avr.	mai	juin
672	475	165	6		
juil.	août	sept.	oct.	nov.	déc.
	300	330	600	120	1500

Une seule autres obs. de +100 : 110 le 09/07 à AsL.

Oise : pas de site majeur mais des obs. de +100 ind. dans 10 sites : 271 à Vieux Moulin (janv.), 239 et 140 à Vauciennes (en dec. et nov.), 235 à St Félix (sept.), 151 à Chantilly (janv.), 133 à Bresles (juil.), 108 à Coye la forêt (janv.), 103 à Bitry (janv.), 101 à chevrières (août), 101 à Breuil le sec (juil.), 100 à Houdancourt (juil.).

Nidification, premiers pulli le 10/04, pour 6 familles, 8.1p./c.

Somme : En dehors du POM, 4 données de +100 ind. en 2 sites : 110 en HVS (janv.), 210 à Roye en sept., 150 en nov., 110 en août.

POM : max. mensuels (surtout d'après SUEUR 2001)

janv.	févr.	mars	avr.	mai	juin
1100	615	230	188	169	634
juil.	août	sept.	oct.	nov.	déc.
826	1800	1144	1140	1637	1310

Nidification, premiers pulli les 25/03 en site et 27/03 en un autre, pour 11 familles, 5.9 p./c.

CALLONETTE A COLIER *Callonetta leucophrys*

(4 données)

1 le 18/05 à Chevrières (60), 1 du 21 au 29/08 à Pontpoint (60).

CANARD PILET *Anas acuta*

(177 données)

Aisne : **Migration pré-nuptiale** : 5 données entre le 21/02 et le 13/04, en vallée de l'Oise (max. 34) et 1 à Vermand (Bihécourt), concernant 2 oiseaux.

Oise : **hivernage**, 1 à Pontpoint le 25/01 puis quelques uns en nov. et déc. (max. 7) ; 1 à Beauvais le 12/11.

Migration pré-nuptiale : 12 obs. du 12/03 au 06/04, max. 12 le 12/03, 29 le 19/03, 14 les 23 et 30/03 à Chevrières et autant le 19/03 à Vauciennes.

Migration post-nuptiale : 7 données du 13/09 au 27/10, max. 5 à Vauciennes.

Somme : Hors PMP : **Migration pré-nuptiale** : 6 données entre le 10/03 (42 à Roye) et le 10/04 (22 à Roye), les autres obs. max. 4 ensemble.

PMP : HA, rares hivernants (-10), **migration pré-nuptiale** : nette à partir du 11/03 (quelques

PMP : HA, rares hivernants (-10), **migration prénuptiale** : nette à partir du 11/03 (quelques mouvements dès mi-fév.), max. 191 le 19, derniers le 01/05.

BdIQF, 1 à 2 en hiver, 85 le 02/04, derniers le 14/04, retour le 23/08. 46 en BdA le 15/11.

POM : max. mensuels (surtout d'après SUEUR 2001)

janv.	Févr	mars	avr	mai	juin
1350	1246	942	760	13	0
juil.	août	sept	oct	nov	déc
2	19	560	1115	1670	1662

SARCELLE D'ETE *Anas querquedula*

(134 données)

Aisne : du 01/04 au 08/05, 4 obs., max. 3

Oise : du 18/03 au 24/04, max. 8 ce dernier jour à Verberie ; **nidification** : 1F/7p. le 19/05 à Houdancourt (F. BOUCHINET) ; du 18/07 au 16/09, 4 données hors du site de reproduction.

Somme : Stationnements importants en **migration prénuptiale** en BVS, 49 le 25/03, 36 les 15/03 et 05/04... à la même période, 10 le 18/03 et 16 le 09/04 au HA ; 10 le 19/03, 12 le 08/04 au Crotoy quant les effectifs restent faibles au POM (max. 10) alors que la **migration post-nuptiale** y est plus marquée : 45 mi-juillet, 102 début août. Quelques obs. hors PMP aussi.

Nidification : possible au HA avec 11 le 08/07 (et des obs. en juin) ainsi qu'au Crotoy (9 le 30/07).

Dernières observations : le 28/09.

CANARD SOUCHET *Anas clypeata*

(315 données)

Hivernage : Aisne : 20 le 28/12 au PEA. Oise : 8 données en 4 sites pour déc., max. 24 le 10/12 à Morlincourt, 12 le 31 à Herchies... Somme : 4 le 12/12 au HA.

Migration prénuptiale : Aisne : du 21/02 au 14/04, max. 13, 11 données.

Oise : du 15/02 au 14/04, 40 le 27/03 à chevrières, 34 le 19 à Bailleul-sur-Thérain, 31 le 19 à Villers-St-Sépulcre..., 44 données.

Somme : **Hors PMP**, 9 données du 10/03 au 08/05, max. 38 à Estrées Mons le 28/03, 17 à Roye le 10/03... **PMP**, BVS, 254 le 20/03, 289 le 23/03... ; HA, observé uniquement après le 06/02, max. 500 le 15/03, 314 le 09/04, 131 le 12/03..., Le Crotoy, 70 le 19/03...

Nidification : Aisne : 4 c. à Origny-St-Benoîte le 24/06 Oise : présence d'un c. en mai, juin, juillet à Houdancourt ; Somme : BVS, 3c./5,5, et 8p. (F. SUEUR 2001) ; présence continue au HA de mai à août ; 2 c. à Roye le 13/06.

Migration post-nuptiale : Aisne : uniquement remarquée au PEA à partir du 26/09 (max. 7).

Oise : dès le 16/07 (7 à Chevrières), 20 le 30 à Houdancourt... Passage net début nov. : 67 le 08 à Pontpoint, 18 le 17 à LSM...

Somme : moins marquée, 17 le 30/07 au Crotoy, 5 autres obs. hors PMP.

2 sites majeurs pour l'espèce dans le département, en particulier pour les stationnements post-nuptiaux et l'hivernage depuis quelques années.

	janv.	fév.	mars	avr.	mai	juin
BdIQF	2	79	128	148	4	4
POM	235	176	304	333	25	42
	juil.	août	sept.	oct.	nov.	déc.
BdIQF	30	97	580	360	280	225
POM	75	309	415	630	1140	305

T. RIGAUX (BdIQF) et F. SUEUR 2001 (POM).

NETTE ROUSSE *Netta ruffina*

(9 données)

HA (80), 1 le 05/01 ; BdIQF (80), 1 du 25/10 au 25/11 ; Bouvancourt (80), 2 le 12/11 (F. NOËL) ; Tergnier (02) 1 du 31/01 au 21/02 (T. DAUMAL et Y. LE SCOUARNEC)

FULIGULE MILOUIN *Aythya ferina*

(481 données)

Aisne :

Nidification, aucune certitude mais des ind. sont vus en mai ou juin à Bucy-le-Long, Courtemont-Varennnes, Origny-St-Benoîte, Maizy, Neuville-sur-Ailette (PEA), Vailly-sur-Aisne.

Assez bien répandu en **hiver**, autour de Tergnier et Beautor, (252 le 21/01, 273 le 12/02, 140 le 22/10, 271 le 18/11...) et au PEA (max. mensuels, 380/janv. ; 50/fev. ; 5/mars ; 41/sept., oct. 300/oct. ; nov. 650/nov. ; 660/déc.) et en d'autres sites mais en groupes moins nombreux.

Oise : aucune certitude mais des ind. sont vus en mai ou juin à Chevrières, Cinqueux, Houdancourt, Litz, Pontpoint, Sacy-le-grand, VH.

Nombreux groupes en hiver sur les gravières. Nous ne mentionnons que les groupes de plus de 100 ind. mais il y a bien d'autres données. Semble plus largement distribué en fév. qu'en janv. (bien que des mouvements migratoires soient enregistrés dès la fin de ce mois) :

100 le 23/02 à Bailleul-sur-Thérain ; 184 le 04/02 à Beauvais ; 130 le 24/09 à Houdancourt ; 205 le 10/02, 382 le 27/10, 434 le 10/11 à LSM ; 121 le 19/01 à Morlincourt, 186 le 29/01 à VH. A Pontpoint (Moru), les effectifs varient comme suit :

janv.	fév.	mars	avr.	mai	juin
900	290	4	2	5	0
juil.	août	sept.	oct.	nov.	déc.
20	26	7	156	720	600

Somme : Présent en mai et juin à Camon et 1 c. en juin à Villers-sur-Authie.

En dehors de la PMP, des données en hiver et lors des migrations mais aucun groupe de +100 ind., max. : 37 : absence de milieux favorables et calmes.

PMP : 3 sites d'importance, des données ailleurs, une seule de +100 : 130 le 05/02 à Régnières-Ecluses.

	janv.	fév.	mars	avr.	mai	juin
BdIQF	320	145	114	4	34	9
HA	154	223	87	47	36	34
POM	54	48	24	19	2	8
	juil.	août	sept.	oct.	nov.	déc.

FULIGULE NYROCA *Aythya nyroca*

(9 données)

Aisne: PEA, 1 F. le 09/01 (D. BAVEREL)

Oise: Pontpoint, 2 le 02/01 (Y. BAS) puis 2 du 17/11 au 23/12 (P. SENGEZ, F. BOUCHINET, J.P. FAGARD, Y. BAS) ; St Félix, 1 M. le 20/10 (F. BOUCHINET et Y. LECOMTE).

3 sites, 6 oiseaux différents certainement, une bonne année pour cet oiseau peu abondant et 6 observateurs contents!

FULIGULE MORILLON *Aythya fuligula*

(440 données)

Aisne: Moins abondant que le F. milouin; à noter: 64 le 18/11 à Beautor, 44 le 03/01 à Monampneuville, 41 le 26/02 à Viry-Nouveau...

1 site important le PEA (D. Baverel) avec 127 oiseaux le 25/07, 145 le 16/08, 350 le 31/10, 500 le 27/11

Nidification: certaine au PEA, et possible (oiseaux en mai, juin, juil.) à Bucy-le-Long (2 c.), Lislet (3 c.), Maizy (4 c.) et Soupir (mini 5 c.).

Oise: quelques obs. en hiver et en migration dans 17 sites, rares sont celles de +10 ind., uniquement à Houdancourt: 28 le 23/02, 35 le 31/03; LSM: 37 le 17/02, 55 le 14/03, 48 le 31/03...

A Pontpoint

janv.	fév.	mars	avr.	mai	juin
176	85	80	16	N	N
juil.	août	sept.	oct.	nov.	déc.
124*	145	135	350	500	260

* dont 24 pulli.

Nicheur possible à Bresles, Chevières, Pontpoint et Vauciennes.

Somme: Hors PMP, quelques obs. en basse vallée de la Bresles en janv. puis de sept. à déc., max. 35 à Gamaches et 17 à Beauchamps le 29/12.

	janv.	fév.	mars	avr.	mai	juin
BdIQF	25	35	50	20	24	20
HA	17	31	68	24	10	13
POM	100	58	44	22	14	13
	juil.	août	sept.	oct.	nov.	déc.
BdIQF	24	14	25	34	25	14
HA	17	7	0	0	0	11
POM	14	11	8	39	61	99

1F./9p. au POM le 24/06; 1c/8p. à Rue le 19/07 (X. COMMECY); possible au HA et aux BdIQF.

FULIGULE MILOUINAN *Aythya marila*

(44 données)

Oise: 2 le 12/02 à Vairesnes (L. GAVORY); 1 du 08/11 au 16/11 à Pontpoint (W. MATHOT, A. ROUGE et P. SENGEZ).

Somme: PMP; BdIQF, 9 le 9/01, BdA, 1 le 23/12 (T. RIGAUX); HA, 1 le 29/12; RNBdS-POM, 6 en janv., 13 en fév., 10 en mars, 6 en avril (derniers le 5) puis 1 en oct. (à partir du 25), 3 en nov. et déc. (surtout d'après SUEUR 2001).

EIDER A DUVET *Somateria molissima*

(103 données)

Oise: Pontpoint, 1 présent toute l'année, rejoint par un second à partir du 18/11.

Somme: uniquement sur le littoral. En BdA, 43 en fév., 9 en avril, 27 en juil., 17 en août, 4 en sept.

En RNBdS-POM:

janv.	fév.	mars	avr.	mai	juin
32	160	54	152	52	15
juil.	août	sept.	oct.	nov.	déc.
230	95	149	64	78	36

HARELDE BOREALE *Clangula hyemalis*

(1 donnée)

1 le 02/12 en RNBdS (F. SUEUR 2001)

MACREUSE NOIRE *Melanitta nigra*

(36 données)

Oise: 1 le 09/01 à Pontpoint (C. WALBECQUE)

Somme: Uniquement en PMP, quelques rares obs. au sud de la BdS (11 en mer le 15/11, 2 les 20 et 22/03 au HA) mais l'essentiel des oiseaux sont repérés au nord de la BS: en BdA, 600 le 25/03, 360 le 5/11... et en RNBdS, 100 le 05/07, 555 le 05/08, 700 le 05/10.

MACREUSE BRUNE *Melanitta fusca*

(20 données)

Etonnement observée uniquement loin du littoral, 2 f. du 15/01 au 03/03 à Pontpoint (19 observations).

GARROT A ŒIL D'OR *Bucephala clangula*

(101 données)

Aisne: 12 obs. en janv. et fév., de 4 sites, 1 oiseau à chaque fois sauf 3 les 05 et 12/02 à Tergnier.

Oise: là aussi, toutes les obs. en janv. et fév. (29) sauf 3 en déc.: 3 à Pontpoint du 28 au 31/12 où 7 étaient vus en janv. et fév. 1 le 26/02 à VH.

Somme: Toutes les obs. en PMP, de début janv. au 15/04 puis du 10/09 à la fin de l'année mis à part 1 F. le 03/06 au HA.

A noter, 5 le 05/02 aux BdIQF...; au POM (max. mens.) 5 en janv., 7 en fév., 5 en mars, 2 en avril, 1 en oct., 2 en nov., 6 en déc.

HARLE PIETTE *Mergus albellus*

(36 données)

Aisne: PEA, 1 en janv., 3 en fév., 1 le 01/03; 1 le 28/12; 1F. le 29/01 à Château-Thierry; 6 (3M. 3F.) le 05/02 à Tergnier.

Oise: 1 le 09/03 à Pontpoint.

Somme: POM, 3 en janv., 5 en fév., 2 (F.) le 08/03; 2 en déc. (max. mensuels).

HARLE HUPPE *Mergus serrator*

(52 données)

Aisne: PEA, 1F. du 06/02 au 21/02, 3 le 19/03, 1 les 13 et 18/04 (D. BAVEREL). 1F. du 31/01 au 12/02 à Tergnier (Y. LE SCOUARNEC et F. NOËL).

Somme: Tous en PMP, en mer; au large des côtes du sud de la BdS, 13 en janv., 17 en fév., 38 en mars, 2 en avr., 3 en nov., 1 en déc. De même au large des

côtes au nord, 1 en janv., 2 en fév., 7 en mars, 4 en avr., 1 le 1 mai, 5 en nov., 2 en déc.

HARLE BIEVRE *Mergus merganser*

(28 données)

Aisne : PEA, 2 à 3 de début janv. au 01/03.

Oise : Pontpoint, 1 le 02/01 et 2 le 30/01.

Somme : uniquement au HA, 1F. du 01/01 au 27/02.

BONDREE APIVORE *Pernis apivorus*

(109 données)

Premières observations : 1 le 10/04, 2 le 14, 2 le 18, 1 le 29, 2 le 30, toutes en migration en RNBdS. La donnée suivante provient de Gourchelles (60) avec 1 ind. le 05/05. Notée ensuite durant chaque décade avec un max. de 18 ind. Le 12/05 en F. de Compiègne (60).

Nidification : Premières parades observées le 20/05. 3 sites dans l'Aisne, 13 dans l'Oise et 7 dans la Somme.

Migration post-nuptiale : remarquée dès le 12/07 dans l'Aisne ; 3 le 26/07 dans l'Oise puis nettement plus marquée durant la seconde quinzaine d'août.

Dernière obs. : 1 le 25/09 à Gournay-sur-Aronde (60)

MILAN NOIR *Milvus migrans*

(23 données)

Première obs. : 1 le 02/04 en BdA et en RNBdS puis noté durant chaque décade d'avril à mai jusqu'au 23/05 à Houdancourt (60) ; 1, le dernier de l'année, le 17/06 en RNBdS.

MILAN ROYAL *Milvus milvus*

(16 données)

Première obs. : 1 les 07/04, 12 et 13/05 à Mont-St-Père (02) et c'est tout pour le passage prénuptial.

Passage post-nuptial : 1 le 30/07 à Attichy (60) ; 1 à la mi-août en RNBdS ; 1 à la mi-septembre, 2 le 01, 1 le 18 et 1 le 22/10 à Morienvall (60) ; enfin 1 le 03/11 à la R.N. de Boves (80) et le dernier le 11/11 à Morienvall (60).

BUSARD DES ROSEAUX *Circus aeruginosus*

(144 données)

Espèce présente désormais toute l'année dans la région mais localisé en PMP en hivers.

Hivernage : noté à plusieurs reprises en janv. et fév. en RNBdS et à Villers-sur-Authie (80) ; 7 données de mars, premières parades le 25.

Nidification : 8 sites dans la Somme dont des cas de reproduction certaine (notamment au H.A.) ; 4 sites dans l'Oise mais aucun dans l'Aisne.

BUSARD SAINT MARTIN *Circus cyaneus*

(179 données)

Nidification : parades notées en mai. Aisne : 1 c. ; Oise : 10 c. ; Somme : 5 c.

Hivernage : 5 le 02/01 en dortoir à Noyelles-sur-mer ; 11 données de janvier, 13 de février, 23 de novembre et 15 de décembre.

Migrations : quelques migrateurs actifs repérés : 2 le 07/09 ; 5 le 02, 2 le 04, 3 le 29/10 ; 4 le 5 et 2 le 11/11 à Morienvall (60).

BUSARD CENDRE *Circus pygargus*

(45 données)

Première obs. : 1 le 04/04 à Trumilly (60) ; 3 autres données d'Avril ; 1 en migration active le 12/05 à Orrouy (60).

Nidification : 2 c. dans l'Oise, 4 dans la Somme et 8 dans l'Aisne.

Dernière obs. : 1 le 27/08 à Grez (60) puis 1 le 23/09 à Granvillers (60) puis 1 le 30/09 en RNBdS.

AUTOUR DES PALOMBES *Accipiter gentilis*

(8 données)

1 seul c ; (considéré comme nicheur possible) en F. d'Hallate (60) pour cette année (absence des obs. habituelle de l'Aisne).

6 données en dehors de ce site : 1 le 22/01 en RNBdS ; 1 le 04/02 à Vron (80), 4 en migration post-nuptiale sur le site de Brassoir à Morienvall (60) : 1 les 11 et 16/09 ; 1 le 1/10 et 1 le 09/11.

EPERVIER D'EUROPE *Accipiter nisus*

(173 données)

Nidification : parades observées dès le 15 mars.

Aisne : pas de données ; Oise : 6 c. ; Somme : 11 c.

Migration : premier oiseau en migration active noté le 21/07, 10 le 09/09 en RNBdS et 8 le 23/09 en BdA.

BUSE VARIABLE *Buteo buteo*

(338 données)

Nidification : Parades notées du 15/02 au 06/05. 9 le 15/02 et 8 le 08/05 en F. d'Ermenonville (60), 7 le 19/03 en F. de Retz (60), 8 le 16/04 à Fleurines (60)...

Quelques données de migrateurs : 4 le 23/09 au marais de Sacy (60), 6 le 01/10 à Morienvall (60), 4 le 14 en RNBdS (80) et 5 le 29 à Morienvall (60).

BUSE PATTUE *Buteo lagopus*

(4 données)

1 im. Du 08 au 14/01 en RNBdS (F. SUEUR 2001) et 1 du 24 au 29/03 en basse vallée de la Somme (F. Montel in F. SUEUR 2001). S'agit-il du même individu ? (Ces données n'ont pas été soumises au Comité d'Homologation National).

AIGLE POMARIN *Aquila pomarina*

(1 donnée)

1 ad. le 18/02 en RNBdS (F. SUEUR 2001). (Cette donnée n'a pas été soumise au Comité d'Homologation National).

BALBUZARD PECHEUR *Pandion haliaetus*

(42 données)

1 les 27/02, 24/03 et 04/04 au PEA (02) et le 08/04 au bassin de Monampteuil voisin (02). 1 le 14/04 en RNBdS.

Dernières obs. : 1 le 15/07 à Crillon (60) ; dernier hors PMP le 02/09 à Monampteuil ; noté jusqu'au 15/10 en RNBdS.

FAUCON CRECERELLE *Falco tinnunculus*

(439 données)

Nombreuses observations. Accouplements notés dès le 19/03.

FAUCON KOBEZ *Falco vespertinus*

(1 donnée)

1 f. le 05/05 au H.A. (F. MONTEL in F. Sueur 2001).

FAUCON EMERILLON *Falco columbarius*

(28 données)

Noté du 09/01 au 22/02 puis 1 le 16/04 et du 08/09 au 30/12.

3 ind. en migration active le 05/11 à Morienvall (60).

FAUCON HOBEREAU *Falco subbuteo*

(118 données)

Première obs. : 1 le 18/04 aux BdlQF, 4 autres obs. au cours de ce mois.

Nidification : 1 site dans l'Aisne, 10 dans l'Oise et 3 dans la Somme.

Migration post-nuptiale : 1 le 10/09 en RNBdS, 1 le 16 en F. d'Ermenonville, 2 le 24 en RNBdS, 1 les 02 et 10/10 à Morienvall (60).

Dernières obs. : 1 le 12/10 en RNBdS.

FAUCON PELERIN *Falco peregrinus*

(17 données)

3 le 10/01 puis 1 à 2 jusqu'au 30/04 en RNBdS. 1 le 05/03 en BdA. Retour en RNBdS avec 1 m. le 15/07 puis 1 à 2 jusqu'à la fin de l'année.

Hors PMP : 1 les 06 et 08/09 à Houdancourt (60), 1 les 05/10 et 09/11 en migration active à Morienvall (60) et 1 le 16/11 à Trosly-Breuil (60).

PERDRIX ROUGE *Alectoris rufa*

(5 données)

Somme : Basse vallée de la Somme, Domart-sur-la-Luce et Saveuse.

Oise : F. de Chantilly. Aucune observation de reproduction pour ces oiseaux lâchés à des fins de divertissement cynégétique.

PERDRIX GRISE *Perdix perdix*

(33 données)

6 rapports de rassemblements hivernaux d'au moins 10 individus : 4 de l'Oise (13 le 18/12 à Tille, 12 le 27/01 à Houdancourt...) et 2 de la Somme (19 le 03/02 à Mézières-en-Santerre...).

Espèce nicheuse, premiers p. le 16/06 à Moreuil (80), 1 c./13 p. le 14/08 à Le-Plessiers-Rozainvillers (80)...

CAILLE DES BLES *Coturnix coturnix*

(39 données)

Première obs. : 1 cht (précoce) le 05/03 à Gury (60) (W. MATHOT) puis 2 données à des dates plus traditionnelles fin avril.

Dernières obs. : 1 le 25/09 à Cires-les-Mello (60). Repéré entre ces deux dates dans 25 communes, max. 6 chts le 13/05 entre Nanteuil et Betz (60).

FAISAN DE COLCHIDE *Phasianus colchicus*

(51 données)

Quelques rapports de reproduction : 1c./2 J. volants le 13/06 à Roye (80) (2 autres données en PMP) ; 1F./3p. le 18/07 à Bailleul-sur-Thérain (60)...

RALE D'EAU *Rallus aquaticus* (90 données)

Max. : 8 le 11/02 à Villers-sur-Authie (80) et autant le 25/12 au POM (80) où après une absence estivale commençant début avril, leur présence est repérée après la mi-août. Pas d'indice de reproduction rapportés.

MARQUETTE PONCTUEE *Porzana porzana*

(33 données)

Oise : Houdancourt, 1 du 05/09 au 19/09 ; Vauciennes : 1 du 24/08 au 24/09 (2 le 24/09)

Somme : Vallée de la Somme, 1 cht le 05/05 à La Chaussée-Tirancourt (F. DEHONDT)

PMP : premier le 22/03 en BVS ; 1 juv ; le 01/08 au H.A.

2 cht. le 29/04 à Rue (V. Bawedin et X. COMMECY) , 1 cht. le 08/04 à Villers-sur-Authie (F. Dehondt), 3 le 25/04 (T. RIGAUX).

Le passage de septembre est net ; les données de chanteurs peuvent laisser espérer quelques reproducteurs localisés.

MARQUETTE POUSSIN *Porzana parva*

(10 données)

1 cht. le 08/04 à Villers-sur-Authie (80) (F. Dehondt) ; sans suite sur un site régulièrement suivi.

Quelques données au passage d'automne : 1 le 13/08 en RNBdS (F. Sueur 2001) et surtout 1 juv. le 20/08 aux Bdd de Vauciennes (60), 2 les 21 et 22 et 1 le 26 (P. et M. SENGEZ, F. BOUCHINET, A. ROUGE et al.).

RALE DES GENETS *Crex crex* (9 données)

En MVO, **premiers**, 4 le 05/05 ; sur les communes de Amigny-Rouy, Manicamp et Varesnes, de 8 à 11 chanteurs sont repérés.

Plus étonnantes ces données obtenues dans un milieu cultivé à Talmas (80) : 2 chanteurs le 07/06 (F. BLIN).

GALLINULE POULE D'EAU *G. Chloropus*

(331 données)

Quelques **rassemblements hivernaux** (données regroupées par secteurs géographiques pour cette espèce dispersée) : 242 le 12/01 en vallée de la Somme de Bray-sur-Somme à Péronne (80) ; basse vallée de la Bresle (80) : 25 en janv. ; 40 en août ; 134 en oct. ; 124 en nov. ; 57 en déc. . Suivis au POM (80) :

janv.	fév.	mars	avr.	mai	juin
157	35	38	24	7	33
juil.	août	sept.	oct.	nov.	déc.
42	76	100	124	40	36

Nidification : rapportées de 26 communes (3 de l'Aisne, 13 de l'Oise et 10 de la Somme) ; pour 72 c. (Résultats partiels). 1 nid garni de 3 œufs le 10/03 au

POM (80) ; premier pulli le 14/05 à Braches (60) ; encore des p. de quelques jours le 31/07 à Camon (80) ; un nid en construction le 10/09 au POM. 18 c. à Saint Quentin (RN) (02) ; 15 c./86 p. au POM (80) ... ; pour 28 c. dont la taille de la nichée a été relevée, on note : 11c.X1p., 4c.X2p., 10c.X3p., 1c.X4p., 2c.X5p. Moyenne : 2,3p./c.

FOULQUE MACROULE *Fulica atra* (719 données)
Quelques sites suivis accueillant de grandes (parfois très grandes) quantités d'oiseaux montrent la phénologie de stationnements de cette espèce dans la région. Seuls les maxima mensuels sont donnés. Des séries plus complètes de données existent, il appartiendra aux observateurs de les exploiter dans des bilans spécifiques, comme certains l'ont déjà fait.

mois	janv.	fév.	mars	avr.	mai	juin
PEA	520	513	305	10		
Houdancourt	111	153	80	8	4	253
Pontpoint	361	192	163	21	65	
V. en H.	1000	300		68		113
BIQF	880	965	560	185	625	260
POM	838	500	398	258	207	512
HA	280	340	125		130	120
Vallée de Bresles	3020					
mois	juil.	août	sept.	oct.	nov.	déc.
PEA		160	400	500	750	850
Houdancourt	324	260	216	344		
Pontpoint	330	464	301	403	468	569
V. en H.	120	700	600			840
BIQF	930	1870	2320	1850	1450	1190
POM	1035	1504	1452	1270	526	565
HA	190	317				314
Vallée de Bresles	935	1650	2213	2505	2663	3308

Quelques rassemblements impressionnants !

Aussi, près de 1200 dans la vallée de la Somme de Corbie à Péronne (80) le 12/01

Nidification : rapportées de 47 communes (8 de l'Aisne, 23 de l'Oise et 16 de la Somme) ; pour 202 c. ; pour 67 c. dont la taille de la nichée a été relevée, on note : 15c.X1p., 15c.X2p., 15c.X3p., 11c.X4p. 9c.X5p., 2c.X6p. Moyenne : 2.85 p./c. Premières parades : 10/02 à St-Félix (60) ; premier nid le 17/02 à Amiens (80) ; premiers œufs le 18/03 à Litz (60) ; premiers p. le 14/04 au POM (80) où sont aussi observées les dernières éclosions le 20/07 mais 3 autres données de jeunes non volants après le 15 août : Croy-la-forêt (60), Chantilly (60) et Gamaches (80).

	janv.	fév.	mars	avril	mai	juin
RNBdS	54	56	235	326	177	123
Autres PMP	1/11		3/89	6/29	3/7	
	juil.	août.	sept.	oct.	nov.	déc.
RNBdS	138	27	4	31	44	86
Autres PMP	2/46	1/30	1/1			2/27

GRUE CENDREE *Grus grus*

(15 données)

2 seulement au passage prénuptial : 50 le 19/03 à Crépy (60) (A. Thiebeaux) et 1 le 24/03 en BvS (80) (F. Sueur 2001).

Passage postnuptial plus remarqué : du 07/09 (2 posée à la Fère -02-) au 13/12 (3 en vol à Mont-Saint-Père -02-). Max. : 40 le 10/10 à Vermand (02), 59 le 20/12 au PEA, 52 le 22/12 à Lierval (02), 59 à Senlis (les mêmes vues à Chamant ?).

HUITRIER PIE *Haematopus ostralegus*

(129 données)

La RNBdS-POM concentre la quasi-totalité des ind. en toutes saisons à marée haute, des oiseaux rejoignant la BdA à marée basse pour s'y nourrir.

	janv.	fév.	mars	avr.	mai	Juin
RNBdS	5000	5260	2660	1346	800	2115
BdA	1200	1600	280	190	22	19
	juil.	août	sept.	oct.	nov.	déc.
RNBdS	4410	14240	7484	8000	7200	5000
BdA	95	295	340	1080	2200	

Surtout d'après Sueur (2001) pour la RNBdS.

Régulièrement observé en petit nombre au HA où 1 c. se cantonne, sans suite semble-t-il.

Nidification : 2 c. au POM (3 p. pour l'un).
19 trouvés morts sur les plages.

ECHASSE BLANCHE *Himantopus himantopus*

(96 données)

Aisne : 1c./2 J. à Origny-Sainte-Benoîte (F. NOËL et H. ARBOUCH, (2001)

Oise : Houdancourt, premières, 4 le 12/05, présentes sans interruption jusqu'au 21/08 ; 6 ind ; entre la mi-juillet et la mi-août, parades observées le 02/06, mais pas de reproduction semble-t-il.

BddC : 6 le 16/07

Bdd de Vauciennes : 3 le 14/05 ;

Somme : 1 à Roye le 05/05, toutes les autres observations sont de la PMP.

Première obs. , 1c. le 19/04 à Rue (V. BAWEDIN et X. COMMECY)

BVS, 3c., 2 juv. le 27/07 (SUEUR, 2001).

BddGL, 7 le 19/07 et 18 le 12/08, probablement les nicheurs et J. de la BVS.

POM, du 21/04 au 26/08, 4 nids le 17/06, 1 p. le 19, 3 p. au nid le 06/08.

BdlQF : présentes du 14/05 au 03/09, max. 6 en juin.

HA, 1 les 10 et 11/06 ; 5 le 29/07.

Le Crotoy, 1 le 30/07.

AVOCETTE ELEGANTE *Recurvirostra avocetta*

Aisne : 1c./2 J. non volants le 24/06 à Origny-Sainte-Benoîte (F. NOËL et H. ARBOUCH, (2001)

Oise : Uniquement au passage prénuptial, 1 le 09/03, 2 le 10, 1 le 29 à Beauvais ; 6 le 09/04 à LSM ; 3 le 23/05 à Houdancourt.

Les max. sont notés les 25 mars et 07/04 en RNBdS-POM. L'hivernage se développe.

Nidification : POM : 77 nids le 08/05. Premières arrivées le 26/02, premiers P. le 05/05, encore 8 p. le 01/07.

HA: 1 nid le 12/04, 2 le 26, 4 c. le 17/05 (1/2J, 2/nid).

Le Crotoy, 21 p. + 3 nids le 19/06.

1 trouvée morte sur les plages (plombée!).

OEDICNEME CRIARD *Burhinus oedicnemus*

(10 données)

Du 30/04 au 27/08 en 3 sites de la Somme, hors PMP (nicheurs probables), les autres obs. en PMP (certainement des migrants).

GLAREOLE A COLLIER *Glareola pratincola*

1 au HA les 24/04 (L. GAVORY) et 01/05 (P. DECORY)

PETIT GRAVELOT *Charadrius dubius*

(210 données)

Aisne : 11 localités d'observations du 09/04 à Château Thierry au 20/08 à Origny-Sainte-Benoîte.

Nidification : probable ou certaine de 8 sites / 9 c.

Oise : 15 localités d'observations du 10/03 à Château Thierry au 30/09 à Origny-Sainte-Benoîte.

Nidification : probable ou certaine de 9 sites / 12 c.

Quelques groupes en **migrations** :

Houdancourt (où l'espèce niche, 2 c.) : 14 le 27/03, 18 le 19/05, 12 le 06/07, 16 le 27/07, 10 en août, 15 en sept. ; et aux Bdd de Vauciennes (où l'espèce niche, 2 c.) : 14 le 08 et 13 le 16/07.

Somme : du 13/03 au 02/09.

Nidification : hors PMP, 5 sites pour autant de c. ; PMP, 3 sites pour 29 à 32 c. (26 à 29 c. au HA, J.C. ROBERT)

Migration : 23 le 26/08 au POM...

GRAND GRAVELOT *Charadrius hiaticula*

(157 données)

Oise : Belle série de 37 obs. pour cette espèce pas si fréquente que cela loin du littoral.

Migration pré-nuptiale : du 14/05 au 04/06

Bdd Vauciennes : 1 le 14/05, 10 le 18, 8 le 20, 19 le 22 ; 7 le 01/06, 6 le 4.

Houdancourt : 3 les 19 et 21/05, 12 le 26 ; 2 le 02/06.

Migration pré-nuptiale : du 15/07 au 01/10;

Bdd Vauciennes : 1 le 05/08 ; 2 le 17/09.

Houdancourt : 1 du 15/07 au 25/08, 4 le 26, 5 le 29, 6 le 31 ; 11 le 15/09, 7 le 17, 1 le 22.

LSM : 1 du 17/09 au 01/10.

Somme : Toutes les obs. en PMP

Nidification : à Cayeux-sur-mer, 7 c. au HA et 4 à Brighton (J.C. ROBERT); 1 c. probable au POM.

	janv.	fév.	Mars	avr.	mai	juin
RNBdS	70	125	150	123	4800	300
BdA				15		
	juil.	août.	sept.	oct.	nov.	déc.
RNBdS-	85	3350	3100	500	9	30
BdA	110	480	25	35		

Les max., en RNBdS 4800 le 15/05, 3350 le 15/08 (SUEUR 2001), 3100 le 02/09 (T. RIGAUX).

Cayeux-sur-mer (La mollière) : 450 le 03/09,

GRAVELOT A COLLIER INTERROMPU *Charadrius Alexandrinus*

(34 données).

En PMP du 21/03 au (17/09)

Nidification : à Cayeux-sur-mer, 10 - 11 c. au HA et 15 - 16 c. à Brighton (J.C. ROBERT); 1 c. probable au POM.

Quelques rassemblements en **migration post-nuptiale** : St Valéry-sur-Somme, mollières : 148 le 25/07; 180 le 09 et 127 le 27/08 (P. DECORY)

Cayeux-sur-mer, La Mollière : 117 le 03/09 et 45 le 17/09 (T. RIGAUX)

BdA : 57 le 30/07 ; 44 le 30/08...

RNBdS : 80 le 15/08...

Exceptionnellement, arrivée d'hivernants en RNBdS, 1 le 15 et 4 le 25/12 (SUEUR 2001).

PLUVIER DORE *Pluvialis apricaria*

(179 données)

Aisne : 800 le 14/02 à Château-Thierry

Oise : 130 données.

Jusqu'au 05/03, retour le 04/09.

Maxima liés aux **migrations pré et post-nuptiales** en fév. et déc., par ex. 3700 le 15/12 à Lachy, 2030 le 11/12 à Sarnois, 2000 le 26/02 à Morienvall, 1500 le 24/12 à Tille, 1470 le 22/12 à Laversine, 1200 le 01/02 à Troissereux et le 17/12 à Hadancourt-le-haut-clocher, 1190 le 24/12 à Nivillers, 1043 le 19/12 à Le crocq. A ces 8 données de plus de 1000 oiseaux ensemble, il faut en ajouter 14 de groupes dénombrés entre 500 et 1000 et 32 entre 100 et 500. Beaucoup de ces données sont de H. DE LESTANVILLE.

Somme : Jusqu'au 15/03, retour sur le littoral le 01/07 (1 oiseau), max. de 7 en août et de 2 en sept., retour le 22/10 hors PMP.

Max. : 800 le 23/01 au BddQFM, 700 le 12/02 au Bosquel, 518 le 28/12 à Villers-aux-érables. A ces 3 données de plus de 500 oiseaux, il faut en ajouter 10 de groupes entre 100 et 500 oiseaux.

PLUVIER ARGENTE *Pluvialis squatarola*

(86 données)

Hors PMP. Oise : **migration pré-nuptiale**. 1 du 19 au 23/05 à Houdancourt (F. BOUCHINET) ; 1 le 10/05 à Vauciennes 'P. et M. SENGEZ et A. ROUGE). Passage bien groupé.

Migration post-nuptiale : 1 le 15/10 à Rouvillers, 1 le 16 à Barbéry, 1 le 11/12 à Maignelay-Montigny (H. DE LESTANVILLE).

Somme : Toutes les données en PMP.

Migrants actifs vers le nord repérés (plusieurs dizaines par heure) les 02, 04 et 06/05.

BdA, régulier en petit nombre (max. 30 en mai)

L'essentiel des stationnements se fait en RNBdS. Quelques autres obs., oiseaux toujours en petit nombre, en divers points de la PMP.

	janv.	fév.	mars	avr.	mai	juin
RNBdS	180	320	150	34	830	18
	juil.	août	sept.	oct.	nov.	déc.
RNBdS	15	74	52	120	220	270

VANNEAU SOCIABLE *Chettusia gregaria*

(3 données)

1 les 24 et 25/11 à Romescamps (60) (H. DE LESTANVILLE, P. SENGEZ). Quelques observations sont occasionnellement réalisées dans la région dans les grands groupes de Vanneaux huppés. En voici une de plus !

VANNEAU A QUEUE BLANCHE *Chettusia leucura*

(1 donnée)

1 le 15/05 à Martainneville (80) (L. GAVORY et GAVORY 2000)

VANNEAU HUPPE *Vanellus vanellus*

(535 données)

Nidification :

Aisne : 2 c. à Bucy-le-Long. Pas d'info. sur les habituels c. de Thiérache.

Oise : Quelques c. (6 en autant de sites), surtout dans les Bdd.

Somme : Hors PMP, Epénancourt (1 c.) et Roye (6 c.) (X. COMMECY)

PMP : POM, 20 c. ; HA, 2 c./p. le 09/05 ; Le Crotoy, 3c./4p., 1c./3p., 5 c./nids (V. BAWEDIN et X. COMMECY) dans des cultures.

Stationnements migratoires :

Aisne : 1600 le 22/10 à Essigny-le-Grand, 750 le 20/08 à Origny-sainte-Benoîte... 6 groupes de plus de 100 en fin juin, juillet, août puis sept-oct. ainsi que 3800 le 05/11 à Crépy-en-Laonnois et 2600 le 09/11 à Berry-au-Bac

Oise : 6000 le 29/11 à Maignelay-Montigny, 5500 le 19/11 à Berneuil-sur-Aisne, 4960 le 10/11 à Moulin-sous-Touvent, 3900 le 11/12 à Sarnois, 3680 à Barbery (H. DE LESTANVILLE *et al.*). + 36 données de groupes estimés à plus de 1000 oiseaux. Les stationnements à la descente sont parfois impressionnants.

Somme : 8650 le 20/12 à Saint-Valery-sur-Somme, 7100 le 22/10 à Erches, 6000 le 15/11 à Rubescourt, 6000 le 26/11 à Franleu, 4590 le 03/02 à Mézières-en-Santerre... + 16 données de groupes estimés à plus de 1000 oiseaux.

Hivernage (janv. et déc.) :

Aisne : seulement quelques dizaines observées.

Oise : Plus de dix obs. de groupes de plus de 100 oiseaux.

Somme : les groupes de plus de 100 oiseaux sont seulement vus en PMP (dont plusieurs de plus de 1000).

BECASSEAU MAUBECHE *Calidris canutus*

(75 données)

Migration pré-nuptiale : Premier pic de passage en fév. en RNBdS : 120 en fév.1 ; 100 en fév.2 puis 126 en fév.3.

Migration post-nuptiale notée dès le 5/08 avec 201 ind. en RNBdS et bien marquée jusque fin sept. : 320 le 15/09 et 117 le 25/09 toujours en RNBdS.

Hivernage : présent tout l'hiver : jusqu'à 25 en janv. et 50 en déc..

Hors PMP : 1 à Estrées Mons (80) le 14/05 (X. COMMECY) et du 4/09 au 9/09 à Houdancourt (60).

BECASSEAU SANDERLING *Calidris alba*

(81 données)

Migration pré-nuptiale peu notée mais un pic de passage est relevé le 15/05 avec 2200 ind. en RNBdS.

Migration post-nuptiale : Les premiers rassemblements en BdS sont remarqués le 25/07 à St Valéry-sur-Somme avec 1185 oiseaux et 1050 sont encore notés le 17/09 à Cayeux-sur-mer.

Hors PMP : 1 le 11/12 au Plessier-sur-Saint-Just (60) (H. DE LESTANVILLE).

BECASSEAU MINUTE *Calidris minuta*

(114 données)

Migration pré-nuptiale concentrée sur le mois de mai, les effectifs sont plus faibles qu'en automne.

Migration post-nuptiale : Nombreuses données en juil., août et sept.. Effectif maxi de 31 le 25/09 en RNBdS.

Hors PMP : Migration post-nuptiale remarquée à Houdancourt (60), Vauciennes (60), Château-Thierry (02) et Roye (80).

Hivernage : Présence d'1 à 4 ind. le long des côtes aussi bien en janv. qu'en déc.

BECASSEAU DE TEMMINCK *Calidris temminckii*

(11 données)

PMP : Au POM : 1 le 6/05, 1 juv. le 25/08 et 1 le 11/09 (données du POM) ; 1 le 10/09 en RNBdS (F. SUEUR 2001).

Hors PMP : 1 le 14/05 à Vauciennes (60) (W. MATHOT), 1 le 29/07 à Houdancourt (60) (P. et M. SENGEZ, F. BOUCHINET) et 1 le 8/09 toujours à Houdancourt (60) (W. MATHOT).

BECASSEAU TACHETE *Calidris melanotos*

(10 données)

1 sur les Bdd de Vauciennes (60) le 20/05 (F. BOUCHINET) ; 1 du 24/07 au 28/07 à Houdancourt (60) (F. BOUCHINET, P. et M. SENGEZ, A. ROUGE, C. LOUVET) et enfin 1 oiseau (le même ?) de nouveau sur les Bdd de Vauciennes (60) le 2/08 (P. et M. SENGEZ).

BECASSEAU COCORLI *Calidris ferruginea*

(56 données).

Première obs. très tardive d'1 ind. au POM le 3/06.

Migration post-nuptiale bien marquée en BdS : Effectif maxi/décade : 2/juil.1 ; 3/juil.2 ; 7/juil.3 ; 8/août 1 ; 16/août 2 ; 34/août 3 ; 58/sept.1 ; 9/sept.2 ; 5/sept.3 ; 5/oct.1 et 1/oct.2.

Hors PMP : 2 ind. Les 28 et 30/07 à Vauciennes (60), 1 le 6/08 et de 1 à 10 ind. du 27/08 au 9/09 à Houdancourt (60) puis 1 à Vauciennes (60) le 24/09.

BECASSEAU VIOLET *Calidris maritima*

(1 donnée)

1 ind. au HA (80) le 2/06 (J.C. ROBERT).

BECASSEAU VARIABLE *Calidris alpina*

(182 données)

Sur le littoral :

Migration pré-nuptiale peu ressentie : il est difficile de faire la part entre les oiseaux migrateurs et les hivernants s'attardant sur nos côtes.

Migration post-nuptiale : Les effectifs gonflent dès la mi-juil. (1040 le 15/07 en RNBdS), et augmentent jusque mi-août (2000 le 15/08 en RNBdS). D'août à fin oct. le nombre d'oiseaux est stable et c'est début nov. que sont constatées les arrivées massives d'hivernants : 3000 le 5/11 et 8000 le 15/11 !

Hivernage : En janv., le max. dénombré est de 7000 oiseaux en RNBdS et de nov. à déc. les chiffres oscillent entre 8000 et 6000 toujours en RNBdS.

Hors PMP : Bien noté aux deux passages, surtout dans l'Oise : 48 données pour 6 sites (la majorité des données provenant des gravières d'Houdancourt). Somme : 3 données pour 2 sites.

BECASSEAU FALCINELLE *Limicola falcinellus*

(6 données)

3 données pour ce migrateur arctique rare en France : 2 ind. du 18 au 20/05 sur les Bdd de Vauciennes (60) (P. et M. SENGEZ et A. ROUGE) ; 1 juv. le 6/09 en RNBdS (F. SUEUR 2001) et 1 juv. (le même ?) au POM le 11/09.

BECASSEAU ROUSSET *Tryngites subruficollis*

(1 donnée)

1 obs. de cet occasionnel américain le 1/10 au HA (F. SUEUR 2001), donnée non soumise au CHN.

COMBATTANT VARIE *Philomachus pugnax*

(178 données)

Première obs. : 1 le 3/02 à Mézières-en-Santerre (80).

Migration pré-nuptiale remarquée dans les 3 dépts. avec un maxi. de 84 le 5/03 en basse vallée de la Somme. A noter aussi 47 le 20/03 au HA (80).

Migration post-nuptiale notée dans les 3 dépts.. Maxi. de 35 ind. à Roye (80) le 30/09. Les obs. s'évalent jusqu'en déc. (13 le 31/12 au HA (80))

BECASSINE SOURDE *Lymnocyptes minimus*

(12 données)

1 au POM le 12/01 (donnée du POM) ; 1 à Blangy-Tronville (80) le 18/03 (F. DEHONDT) ; 1 le 22/03 en RNBdS (F. SUEUR 2001) ; 1 au Crotoy (80) le 29/08 (P. ROYER) et 1 le même jour en RNBdS (F. SUEUR 2001) ; 2 à Martaineville (80) le 25/11 (P. et M. SENGEZ) ; de 1 à 3 ind. à MP (60) du 1/12 au 17/12 (P. et M. SENGEZ, F. BOUCHINET, C. LOUVET) ; 1 le 17/12 à Cayeux-sur-mer (80) (X. COMMECY) et enfin 1 le 26/12 en RNBdS (F. SUEUR 2001).

BECASSINE DES MARAIS *Gallinago gallinago*

(231 citations)

Hivernage : Remarqué à MP (60), au HA (80), au BdlQF (80) et au POM (80).

Migration pré-nuptiale concentrée du 15/02 au 8/04, peu ressentie cette année.

Pas de données relatives à la nidification.

Migration post-nuptiale : Démarre brutalement le 19/07 avec 103 ind. à Grand-Laviers (80). Au mois d'août sont enregistrées 65 données sur un total de 231 soit plus d'1/3 des données annuelles et les groupes dépassant la vingtaine d'ind. ne pas rares dans l'Oise comme dans la Somme (peu de données dans l'Aisne). A noter quelques rassemblements : A Grand-Laviers (80) : 168 le 26/08 ; 126 le 22/09 et au HA (80) : 251 le 30/09 ; 126 le 15/10 et 163 le 15/11.

BECASSE DES BOIS *Scolopax rusticola*

(37 données).

Nidification : Des chanteurs sont notés de mars à mai en forêt de Chantilly (60), FDC (60) et forêt d'Ermenonville (60).

Migration post-nuptiale bien remarquée au POM (80) et en RNBdS (80) du 15/10 au 4/11.

BARGE A QUEUE NOIRE *Limosa limosa*

(148 données)

Hivernage toujours plus important d'une année à l'autre en RNBdS : jusqu'à 45 ind. en janv.1 et 88 en déc.3.

La **migration pré-nuptiale** est étalée avec 10 à 25 oiseaux notés régulièrement en PMP de début mars à mi-avr., puis un pic de 57 ind. en mai2 en RNBdS.

Hors PMP : 8 obs. en 5 sites (tous dans l'Oise) et 7 ind. max. les 12/03 aux BddC et 28/05 à Houdancourt.

La **migration post-nuptiale** est notable à compter de juin2 (53 en RNBdS) et atteint plusieurs pics en RNBdS : 76 le 16/07, 73 le 31/08, 88 le 26/09, 121 en oct.1 et 128 le 7/11.

Une seule obs. hors PMP lors de ce passage : 1 ind. le 13/08 à Houdancourt (60).

BARGE ROUSSE *Limosa lapponica*

(68 citations)

Hivernage de quelques dizaines d'ind. : jusqu'à 30 le 9/01 en BdA.

Le **passage pré-nuptial** est seulement noté en mai1 et mai2, avec un effectif max. de 180 en mai1 en RNBdS, ce qui est faible au regard des autres années.

Présence estivale de quelques individus (jusqu'à 7 en juin3 en RNBdS).

Le **passage post-nuptial** est sensible de juil.3 à oct.2 avec un effectif max. de 70 en RNBdS en sept.2.

Une seule obs. hors PMP : 1 ind. aux Bdd de Vauciennes le 02/08 (P. & M. SENGEZ).

COURLIS CORLIEU *Numenius phaeopus*

(59 données)

La quasi-totalité des données concernent 4 sites : BdA, BdlQF, RNBdS et HA.

Première obs. : 2 ind. (N) au-dessus du POM le 6/04.

Migration pré-nuptiale sensible de mi-avr. à mi-mai, avec un max. notable de 170 ind. en BdA le 1/05.

Le **stationnement estival** a concerné au max. 4 ind., en RNBdS le 04/06 et 22/08.

La **migration post-nuptiale** a été sensible de juil.1 à sept.1, avec un max. de 280 ind. en RNBdS le 5/08 et

une obs. hors PMP : 1 ind. à Houdancourt (60) le 18/07 (W. MATHOT).

Dernière obs. : 1 ind. le 30/09 au POM.

COURLIS CENDRE *Numenius arquata*

(75 données)

Hivernage : jusqu'à 920 oiseaux en janv.1 et 1090 en déc.3, en RNBdS.

Migration pré-nuptiale : effectifs importants en PMP jusqu'en fév.3 (420 en RNBdS) ; puis max. de 30 ind. (le 1/05 au POM) jusqu'en juin3.

Hors PMP : 6 ind. le 21/02, et 8 le 13/04, à Beautor (02).

Nidification possible au HA (2 ind. le 4/05, 4 le 31/05), en RNBdS (30 ind. le 1/05, 16 le 15/06) et à Condren (02)(40 ind. le 13/05).

Migration post-nuptiale notée à compter de juin3, pics de stationnement en août3 (985 ind.), sept.3 (940) et oct.3 (1050) en RNBdS.

Hors PMP : Somme : au - 1 ind. le 11/08 à la Chaussée-Tirancourt ;

Aisne : 2 ind. en vol le 1/08 à Saint-Quentin, 1 ind. le 20/08 à Origny-Sainte-Benoîte ;

Oise : 1 ind. le 3/08 à MP, 1 le 4/08 à Houdancourt, 1 en vol le 1/10 à Morienvall, 1 en vol à Pierrefonds le 19/10, et enfin 4 ind. le 30/12 à MP.

CHEVALIER ARLEQUIN *Tringa erythropus*

(76 données)

Observé chaque mois de l'année.

Hivernage d'1 ind. (2 en janv.2) de début janv. à mars3 en RNBdS.

Migration pré-nuptiale discrète, notée du 26/03 (5 ind. au POM) au 1/05 (2 en BdA), avec un effectif max. de 7 ind. le 25/04 au POM.

Une seule donnée hors PMP lors de ce passage : 1 ind. à Beautor (02) le 13/04.

La **migration post-nuptiale** est notée à partir de juin2 et donne des stationnements max. de 29 ind. en sept.2 et oct.2 en RNBdS.

Nombreuses données hors PMP lors de ce passage (22, toutes dans l'Oise), notamment à Vauciennes (effectifs max. : 1/août1, 3/août2, 1/août3) et à Houdancourt (max. : 8/août3, 5/sept.1, 1/sept.2, 1/sept.3), également à LSM (4 ind. le 17/09) et MP (1 le 18/11).

Et encore 2 ind. présents en RNBdS en déc.3.

CHEVALIER GAMBETTE *Tringa totanus*

(195 données)

Hivernage : effectif max. : 248 ind. présents en janv.1, et 48 en déc.2, en RNBdS.

Migration pré-nuptiale : effectif max. record de 3250 ind. en mai2 en RNBdS (SUEUR, 2001). Hors PMP : à noter 13 ind. le 12/03 aux BddC (60), 11 ind. le 18/03 à Beauvais (Plan d'eau du Canada - 60), 30 ind. (O) à Mareuil-Caubert (80) le 4/05 et 15 le 6/06 à Houdancourt (60).

Migration post-nuptiale : effectif max. observé en juil.3 : 948 ind. en RNBdS. Pas d'effectifs conséquents hors PMP (max. : 10 ind. le 9/09 à Houdancourt).

CHEVALIER ABOYEUR *Tringa nebularia*

(172 données)

Première obs. : 17 ind. (N) le 19/03 au HA.

Migration pré-nuptiale : effectifs max. notés au POM (principal site) : 18/avr.3, 156/mai1, 57/mai2, 43/mai3. Nombreuses obs. de quelques ind. à l'intérieur des terres.

Présence estivale : 1 ind. présent en RNBdS tout le mois de juin, et 1 ind. observé le 13/06 à Roye (80).

Migration post-nuptiale : en PMP, effectifs max. en RNBdS, de 57 ind. en juil.2, 47 (S) en août3 (POM) et 58 en sept.3 (POM) ; hors PMP, effectifs max. de 15 ind. le 20/08 à Origny-Sainte-Benoîte (02), 19 ind. le 21/08 et 28 le 25/08 à Houdancourt (60), et 11 ind. le 26/08 à Daours (80).

Dernière obs. : 5 ind. en nov.1 en RNBdS.

CHEVALIER CULBLANC *Tringa ochropus*

(218 données)

Plusieurs données hivernales (jusqu'à 6 ind. le 15/01 aux BddC (60).

Au passage pré-nuptial, les principaux effectifs sont observés aux Bdd d'Estrées-Mons (80) : 11 ind. le 28/03, et 14 le 10/04.

Au passage post-nuptial, les principaux stationnements observés sont : 20 ind. les 30/06 et 18/07, et 17 le 3/08, à Houdancourt (60) ; 22 ind. le 11/08 aux BddC (60) , 14 le 23/08 aux BdlQF (PMP), 14 ind. le 13/09 à Houdancourt, et 13 le 22/09 aux BddGL (PMP).

A noter enfin : encore 12 ind. le 26/11 aux BddGL.

CHEVALIER SYLVAIN *Tringa glareola*

(87 données)

Année riche en obs. de cette espèce.

Première obs. très précoce : 1 ind. le 21/03 à LSM (60) (JP. Fagard).

Seulement 4 autres obs. au **passage pré-nuptial** : 1 ind. le 30/04 aux BdlQF (PMP), et le 1/05 en RNBdS (PMP), 2 le 6/05 en RNBdS, puis 1 ind. le 14/05 aux Bdd de Vauciennes (60).

Le **passage post-nuptial** est détecté le 27/06, en PMP (1 ind. au HA). Il est noté en continu de juil.3 à sept.3, essentiellement dans deux secteurs : les Bdd de l'Oise (Houdancourt, Vauciennes, Chevières) et la PMP. Deux pics sont notés, en juil.3 et à la mi-août, avec des effectifs remarquables : 10 ind. le 28/07 à Chevières, et 20 ind. le 20/08 à Vauciennes (P. & M. SENGEZ).

Les dernières obs. ont été faites en PMP (dernière : 1 ind. le 1/10 au POM).

CHEVALIER GUIGNETTE *Actitis hypoleucos*

(309 données)

Hivernage noté dans les 3 départements et pendant toute la période (max. de 5 ind. le 11/02 aux Bdd d'Estrées-Mons (80)).

La **migration pré-nuptiale** est notée à partir d'avr.1 et donne les effectifs max. en mai : 31 ind. en mai1 et 15 ind. le 12/05 au HA, 15 ind. le 22/05 à Vauciennes (60).

Le **passage post-nuptial** est notable à partir de juil.2. Effectifs max. par décade :

En PMP (POM) : 10/juil.2, 29/juil.3, 19/août1, 16/août2, 27/août3, 17/sept.1.

Hors PMP : 18/juil.2, 50/juil.3, 25/août1, 35/août2, 15/août3, 7/sept.1.

TOURNEPIERRE A COLLIER *Arenaria interpres*

(39 données, toutes en PMP)

Première obs. plutôt tardive : 2 ind. le 21/04 en RNBdS.

Le pic du **passage pré-nuptial** est noté en mai1 avec 49 ind. en RNBdS.

Pas de présence notée en juin et juil.1.

La **migration post-nuptiale** est notée de juil.2 à nov.2, avec un pic de passage de 26 ind. le 10/09 au Crotoy (bassin de chasse).

Hivernage : 1 ind. observé en RNBdS en déc.1 et 2.

PHALAROPE A BEC ETROIT *Phalaropus lobatus*

(2 données)

Deux données automnales concernant sans doute le même oiseau : 1 ind. le 8/10 en RNBdS (SUEUR, 2001) et 1 juv. le 10/10 au POM.

PHALAROPE A BEC LARGE *Phalaropus fulicarius*

(6 données)

Une obs. exceptionnelle par la date : 1 ind. le 12/03 au HA (SUEUR, 2001).

Une obs. automnale : 1 ind. le 13/10 au HA (SUEUR, 2001).

Egalement une présence hivernale : 1 ind. le 4/12 au POM (observateurs du POM) et le 10/12 à la Mollière de Cayeux-sur-mer (T. RIGAUX).

LABBE POMARIN *Stercorarius pomarinus*

(5 données)

Le premier ind. est noté le 2/08 en RNBdS, puis 1 le 19/08 en BdA, 1 le 26/08 au HA, 2 le 1/09 en RNBdS et le dernier le 13/09 en BdA.

LABBE PARASITE *Stercorarius parasiticus*

(7 données)

Le premier Labbe parasite noté concerne 1 juv. le 12/08 en RNBdS. Puis 1 ind. à chaque fois le 15/08 à Cayeux-sur-mer, le 30/08 en BdA, le 2/09 et le 10/09 en RNBdS, le 24/09 en BdA et enfin 2 ind. vus en RNBdS le 9/12.

GRAND LABBE *Stercorarius skua*

(5 données)

Une donnée hivernale d'un oiseau vu le 9/01 en BdA. Les autres obs. sont réalisées lors du passage post-nuptial : 2 le 13/08 en RNBdS ; 1 le 10/09 en BdA ; 1 le 14/10 au HA puis 1 le 15/11 en BdA.

MOUETTE MELANOCEPHALE *L. melanocephalus*

(32 données)

Hors PMP : A Roye (80), 1 couple est noté le 10/04 puis le 5/05 (X. COMMECY) et 1 ind. à MP (60) le 11/10 (F. BOUCHINET).

PMP : Pas de données hivernales (1^{ère} obs. le 19/03, dernière le 19/10). 1 à 6 ind. (ad. et im.) sont régulièrement observés au POM jusqu'au 31/05, aucune donnée en juin, puis 7 sont vus le 1/07 toujours au POM. L'unique donnée qui concerne un juv. provient de la BdA : le 18/08.

Passages : 23 le 19/04 au HA et 34 le 30/08 en BdA.

MOUETTE PYGMEE *Larus minutus*

(48 données)

8 données à l'intérieur des terres.

Hors PMP une donnée hivernale de 2 ind. le 2/01 à MP (60). **Migration pré-nuptiale** peu marquée : seul 1 ind. le 4/04 aux Bdd de Houdancourt (60). La **migration post-nuptiale** est elle aussi de faible intensité et concentré du 19 au 23/08 avec 1 ou 2 ind à chaque fois à MP (60) et Houdancourt (60).

PMP : La **migration pré-nuptiale** est clairement ressentie de fin mars à mi-mai, mais les gros mouvements ont lieu en avr.1 et avr.2 : 230 le 8/04 aux BdlQF, 180 le 9/04 au HA, 675 migrent en mer le 16/04 à Cayeux-sur-mer et 152 le même jour aux BdlQF. La **migration post-nuptiale** est peu notée et s'étale d'août à nov.

MOUETTE DE SABINE *Larus sabini*

(1 donnée)

1 ind. est observé au Hourdel (80) le 10/12 (S.MAILLIER). Donnée tardive pour cette espèce peu fréquente sur nos côtes.

MOUETTE RIEUSE *Larus ridibundus*

(350 données)

Nidification : les premiers nids sont repérés le 20/04 au POM.

Nidification probable à Houdancourt (60), et certaine sur 6 sites : 360 nids à Roye (80) ; 94 nids au POM ; 32 nids à Bucy-le long (02) ; 20 nids à Origny-ste-Benoite (02) ; 14 nids à Vecquemont (80) et 1 seul nid repéré pour environ 200 oiseaux à Lislet (02).

Hivernage : c'est en janv. et fév. que les plus gros rassemblements sont observés : 3100/janv. puis 4900/fév. à MP.

GOELAND CENDRE *Larus canus*

(84 données)

Hors PMP : 13 données : à MP (60), Houdancourt (60), Beauvais (60), LSM (60), Boran-sur-Oise (60) et Rocquemont (60). Maxi de 12 le 14/08 à LSM (60).

PMP : Les effectifs les plus importants sont notés de fin juil. à mi-sept. avec un maxi de 1500 le 5/09 en RNBdS.

GOELAND BRUN *Larus fuscus*

(102 données)

Un total de 102 données pour 56 intérieures ! Sa présence hors PMP y est certainement mieux relevée par les observateurs que sur le littoral. Présence notée toute l'année à effectifs variables. Maxi de 186 à MP (60) le 11/09.

PMP : Présent toute l'année. Effectif maxi de 1150 en BdA le 5/08.

GOELAND ARGENTE *Larus argentatus*

(72 données)

Nidification : Très peu notée. Construction de nids et accouplement au POM fin mars. 393 nids sur les falaises picardes (Mers-Ault) (Violet 2000).

Hors PMP : Noté de façon éparse, toute l'année et à effectifs variables (max. de 350). Nombreux allers-retours zones de nourrissage (surtout décharges) / dortoirs. Utilise volontiers bassins de décantation et certaines gravières de l'Oise comme reposoir ou dortoir.

PMP : Les plus gros rassemblements s'observent au post-nuptial, maxi de 6000 le 15/09 en BdA.

GOELAND LEUCOPHEE *Larus michahellis*

(37 données)

Deux obs. hivernales : 1 le 15/01 à Boran-sur-Oise (60) et 2 le 6/02 au PEA (02).

A partir du 27/05, le rythme des observations s'accélère pour atteindre le maxi en juil. (11 données). Les groupes gonflent peu à peu courant juil. et août et le maxi est atteint le 15/09 avec 600 ind. en BdA. A noter que toutes les plus grosses quantités sont relevées en BdA.

A l'intérieur, l'espèce est bien présente (18 données), surtout dans l'Oise. Les principaux sites visités sont les gravières de MP (60) et de Boran-sur-Oise (60). Jusqu'à 90 oiseaux le 29/08 à MP.

Le dernier est vu le 1/11 à Duvy (60).

GOELAND PONTIQUE *Larus cachinnans*

(1 donnée)

1 ad. en RNBdS le 11/11 (SUEUR 2001).

GOELAND MARIN *Larus marinus*

(85 données)

Toutes les données proviennent du littoral où l'espèce est visible toute l'année. L'effectif maxi est relevé le 2/01 avec 1700 ind. en BdA. Les quantités diminuent à partir de la mi-fév. pour devenir très faibles en période de nidification (surtout des im.). Les effectifs remontent progressivement début juil. et 600 sont dénombrés en sept. en BdA, puis 480 en oct. en RNBdS.

MOUETTE TRIDACTYLE *Rissa tridactyla*

(4 données)

Hors PMP : 1 le 18/01 à MP (60) (W MATHOT)

PMP : 1 le 20/02 au HA, 1 juv. le 6/08 en BdA et 1 le 27/08 dans les mollières du fond de la BdS.

STERNE CASPIENNE *Sterna caspia*

(3 données)

2 sont observées le 26/08 en RNBdS (SUEUR 2001) et 1 ad. en mue le 30/08 au POM.

STERNE CAUGEK *Sterna sandvicensis*

(88 données)

Toutes les données proviennent du littoral.

Première obs. : 2 le 22/03 au HA et 5 le même jour en RNBdS.

Maxi de 780 le 30/07 en BdA.

Dernière obs. : 1 le 5/10 en BdA et 21 le même jour en RNBdS.

STERNE DE DOUGALL *Sterna dougallii*

(2 données)

Deux obs. pour cette espèce rare en migration : 2 ad. le 20/07 en RNBdS (A. ROUGE) et 2 le 24/08 en BdA (SUEUR 2001).

STERNE PIERREGARIN *Sterna hirundo*

(132 données)

Première obs. : Somme: 6 le 21/03 au HA

Oise : 1 le 26/03 à MP.

Nidification : Certaine sur 2 sites : A MP (60) 8 nids, et à Viry-Nouveau (02) 2 nids, et probable à Villers-en-Prayeres (02).

Migration post-nuptiale : Bien marquée sur le littoral surtout en août : 1020/août 1 et 1100/août 2 en RNBdS.

Dernière obs. : 1 le 5/10 en BdA.

STERNE ARCTIQUE *Sterna paradisaea*

(7 données)

6 obs. : En RNBdS 7 le 18/07 (SUEUR 2001), 1 le 3/08 (P. DECORY ; SUEUR 2001) et 6 le 17/08 (SUEUR 2001) ; puis 1 le 24/08 en BdA (SUEUR 2001), 2 le 27/08 à St Valéry-sur-Somme (P. DECORY) et enfin 1 au POM le 10/09.

STERNE NAINE *Sterna albifrons*

(31 données)

Première obs. : 4 le 2/04 en BdA.

Maxi de 180 le 25/04 en RNBdS et 117 le 25/07 dans les mollières du fond de la BdS. Dernière obs. : réalisée hors PMP avec 1 juv. le 4/10 au marais St Nicolas de Boves (80) (L. GAVORY).

GUIFFETTE MOUSTAC *Chlidonias hybridus*

(9 données)

Hors PMP : 3 le 4/04 à Houdancourt (60) (A. ROUGE)

PMP : 1 le 26/04 au HA (L. GAVORY) ; 4 le 27/04 au HA (JC. ROBERT) ; 3 le 29/04 toujours au HA (L. GAVORY) ; 1 le 9/05 au marais du Crotoy (X. COMMECY) ; 5 le 3/06 au POM ; 2 le 4/06 en RNBdS (SUEUR 2001) ; 2 le 2/07 en RNBdS (SUEUR 2001) et enfin 1 juv. le 20/09 au HA (SUEUR 2001).

GUIFFETTE NOIRE *Chlidonias niger*

(66 données)

Première obs. :

Somme : 5 le 16/04 au HA.

Oise : 1 le 1/05 à Bailleul-sur-Thérain.

Aisne : 7 le 6/05 sur les Bdd d'Origny-ste-Benoite.

Passages : 12 le 6/05 en RNBdS, 14 le 19/08 en BdA, 15 le 3/09 puis 18 le 6/09 aux BdlQF et 10 le 17/09 sur le plan d'eau du Canada à Beauvais (60).

Dernière obs. : 1 le 28/10 aux BdlQF.

GUIFFETTE LEUCOPTERE *C. leucopterus*

(4 données)

1 ad. le 17/08 en RNBdS (SUEUR 2001) ; 1 juv. 18/08 au POM et 1 juv. le 22/08 au HA (C. HERVE).

GUILLEMOT DE TROÏL *Uria aalge*

(7 données)

7 données toutes en mer.

BdA : 2 le 5/02 ; 1 le 16/03 ; 12 en vol sud le 9/10 et 20 en vol sud également le 4/11. Cayeux-sur mer : 1 le 23/02 et 2 le 17/12.

PINGOUIN TORDA *Alca torda*

(5 données)

3 le 29/03 en BdA ; 1 le 30/09 en RNBdS ; 1 le 22/10 et 1 le 4/11 en BdA ; et 2 le 15/11 toujours en BdA.

MERGULE NAIN *Alle alle*

(1 donnée)

2 en vol sud le 4/11 en BdA (SUEUR 2001).

PIGEON COLOMBIN *Columba oenas*

(97 données)

Nicheur et hivernant peu commun sur l'ensemble de la Picardie. Des parades ou des chanteurs sont repérés de fév. à juil. Les premiers rassemblements post-nuptiaux ont lieu dès la mi-juil. et la migration post-nuptiale se fait sentir de mi-sept. à fin oct.. A noter un passage de 123 oiseaux en 2h le 22/10 à Morienvall.

PIGEON RAMIER *Columba palumbus*

(197 données)

Espèce commune toute l'année avec une augmentation significative des effectifs pendant la migration post-nuptiale et en hivernage. Les troupes sont parfois considérables : 7000 à Morienvall (60) le 26/11 et 1500 à Ablainville (60) le 17/12.

TOURTERELLE TURQUE *Streptopelia decaocto*

(32 données)

Espèce peu notée par les observateurs, les données sont peu significatives. Rassemblement de 73 ind. sur des fils électriques le 16/12 à Cuise-la-Motte (60).

TOURTERELLE DES BOIS *Streptopelia turtur*

(83 données)

Première obs. : Somme : 1 le 14/04 en basse vallée de la Somme.

Oise : 1 le 20/04 à Saint-Félix.

Nicheuse assez commune. Rassemblements post-nuptiaux : 50 le 3/08 à Orrouy (60) ; 27 le 19/08 à MP (60).

Dernière obs. : 1 juv. le 1/10 en RNBdS.

PERRUCHE A COLLIER *Psittacula krameri*

(3 données)

1 à Amiens (80) le 25/06 et 2 à Hirson (02) le 3/11.

COUCOU GRIS *Cuculus canorus*

(51 données)

Première obs. : Oise : 1 le 4/04 à Breuil-le-Vert

Somme : 1 le 9/04 au HA

Aisne : 1 le 11/04 à Mont-st-Père

Dernière obs. : Oise : 1 le 1/09 à Lamorlaye.

Somme : 1 le 7/09 en RNBdS.

EFFRAIE DES CLOCHERS *Tyto alba*

(26 données)

26 données réparties sur les 3 départements. 4 concernent des ind. morts dont 3 liés à des collisions avec des véhicules.

PETIT DUC SCOPS *Otus scops*

(2 données)

Deux données en forêt d'Ermenonville (60), comme en 1999. 1 le 20/05 et 1 chanteur le 18/06 (J.L.BARAILLER).

CHEVECHE D'ATHENA *Athene noctua*

(69 données)

Intéressante recherche sur 30 communes de l'Oise qui a permis d'obtenir 43 contacts sur 20 communes où elle peut être considérée comme nicheuse (H.DE LESTANVILLE). Jusqu'à 7 contacts sur la seule commune d'Ons-en-Bray.

Les autres obs. sont éparses et peu significatives dans l'Oise et la Somme, pas de donnée dans l'Aisne. 1 chanteur à Margny-sur-Matz (60).

CHOUETTE HULOTTE *Strix aluco*

(41 données)

Notée sur 27 communes, les obs. sont peu significatives.

Le 30/04 1 ad. est observé transportant des matériaux et, sur un autre site, le 13/06 des jeunes sont entendus.

HIBOU MOYEN DUC *Asio otus*

(43 données)

Dortoirs : A MP (60) jusqu'à 4 ind. ; en FDC (60) 6 ind..

Nidification : Noté chanteur en période favorable à La Neuville-Vault (60). Des couples sont observés au cimetière de la Madeleine à Amiens (80) et à Herchies (60). Des jeunes sont entendus à Velennes (80), Foulanges (60), Cires-les-Mello (60) et en forêt d'Ermenonville (60).

HIBOU DES MARAIS *Asio flammeus*

(24 données)

Hors PMP : 1 le 27/02 à Baron (60) (J.M.GERNET).

PMP : 19 données du HA où un maxi de 3 ind. est relevé de janv. à mars. De retour dès le 29/09 avec 2 ind. puis 1 seul jusqu'au 3/12. RNBdS : 1 le 20/02 et 1 le 12/11. Basse vallée de la Somme : 1 le 6/04 et 1 le 17/11.

ENGOULEVENT D'EUROPE *Caprimulgus europaeus*

(4 données)

Noté uniquement en FD d'Ermenonville (60) : 2 le 20/05, 2 le 17/06, 4 le 23/06 et 1 le 13/08.

MARTINET NOIR *Apus apus*

Première obs. : Aisne : 1 le 16/04 à Mont-Saint-Père.

Oise : 5 le 23/04 à Gouvieux.

Somme : 1 le 23/04 au POM.

200 le 4/05 au HA et 200 le 1/07 à Borest (60).

Dernière obs. : deux données très tardives : 1 le 14/11 en basse vallée de la Somme et 1 au POM le 19/11 !

MARTINET PALE *Apus pallidus*

(1 donnée)

1 ind. le 13/10 au POM (SUEUR 2001)

MARTIN PECHEUR *Alcedo atthis*

(276 données)

276 données surtout automnales et hivernales (seulement 14 données en avr. et 10 en mai). L'apport d'oiseaux hivernants est évident. Néanmoins nicheur dans les trois départements ; nourrissage de juv. observé jusqu'au 9/09.

GUEPIER D'EUROPE *Merops apiaster*

(1 donnée)

4 (dont au moins 1 juv.) sont observés le 5/08 à Pierrepont (02) (T. NANSOT).

HUPPE FASCIEE *Upupa epops*

1 observée se nourrissant sur une vasière desséchée à Houdancourt (60) le 20/07 (F. BOUCHINET) ; 1 le 24/08 au POM et 2 le 25/08 toujours au POM (données du POM).

TORCOL FOURMILIER *Jynx torquilla*

(16 données)

Première obs. : 1 chanteur en FDC (60) le 9/04.

Des chanteurs sont notés sur les forêts de l'Oise : FDC, FD de Retz et FD de Hez-Froidmont.

Dans l'Aisne 2 ind. paradant sont repérés pendant 1 semaine à Mont-Saint-Père fin mai et le 29/06 5 ind. dont 2 juv. sont observés (A. BOUSSEMARY).

Migration post-nuptiale : 1 à Orrouy (60) le 18/08 (P. et M. SENGEZ), 2 en FD de Halatte (60) le 20/08 (Y. BAS), 1 aux Bdd de Vauciennes (60) le 22/08 (P. et M. SENGEZ), 1 au HA (80) le 23/09 (P. LEGAY) et enfin 1 le 30/09 à Beautor (02) (P. et M. SENGEZ).

PIC VERT *Picus viridis*

(185 données)

Près de 200 données. L'espèce semble bien présente sur l'ensemble de la Picardie.

PIC NOIR *Dryocopus martius*

(93 données)

Nidification : Oise : Bien représenté sur l'ensemble des massifs forestiers : FD de Chantilly, de Hez-Froidmont, d'Ermenonville, de Retz, de Halatte, FDC, forêt de Pontarmé... Noté chanteur sur tous ces sites mais l'espèce est également présente dans de nombreux bois. Nicheur probable sur au moins 25 sites mais probablement plus...

Aisne : Présent autour du PEA, à Craonne, à Gland, et en FD de Retz.

Somme : Noté dans les bois de Frémontiers, Contre et Famechon. 1 ind. à Inval Boiron sur un larris fin janv. et 1 au POM le 12/10.

PIC EPEICHE *Dendrocopos major* (106 données)
Espèce bien établie sur l'ensemble de la Picardie.

PIC MAR *Dendrocopos medius*

(52 données)

Présent surtout dans les massifs forestiers de l'Oise, quelques données de l'Aisne.

Nidification : Oise : Est noté chanteur, nicheur possible ou probable à Chantilly (6 sites), Compiègne (2 sites), Halatte (4 sites), Ermenonville (2 sites), forêt du Lys (1 site), bois du lieutenant à Apremont (4 sites), et à Gouvieux bois de la cave (1 site) et bois des bouleaux (1 site).

Aisne : 3 sites : Chartèves, Mont-Saint-Père et Villers-Cotterêts.

Rappelons que pour la nidification d'espèces forestières comme les pics, les observations relatives à des comportements reproducteurs sont inutilisables si les numéros de parcelles ne sont pas indiqués.

PIC EPEICHETTE *Dendrocopos minor*

(56 données)

Les données sont réparties tout au long de l'année de façon homogène bien que peu nombreuses (1 cinquantaine). Est noté chanteur de fév. à août dans les bois, les forêts mais surtout aux abords de zones humides diverses. Aisne : 3 sites. Oise : 15 sites. Somme : 14 sites.

COCHEVIS HUPPE *Galerida cristatus*

(36 données pour 17 sites)

Observé toute l'année, principalement dans l'Oise avec 12 sites, 4 pour la somme et un seul dans l'Aisne peut-être en raison d'un manque de prospection. Il semble en diminution et a déjà disparu de plusieurs sites du bassin creillois.

ALOUETTE LULU *Lullula arborea*

(31 données)

Nidification : elle a pratiquement disparue en tant que nicheur (en raison d'un manque de données de l'Aisne ?) : 1 le 25 avril à Saint-Quentin-en-Tourmont (80) (F. SUEUR).

Migration prénuptiale : 1 le 06/02 à Trosly-Breuil (60) ; 11 le 12/03 à Chelles (60) et 2 le même jour à Compiègne (60).

Migration post-nuptiale : Nombreuses mentions à Morienvall (60) : 13 le 06 et 6 le 08/10... ; 5 le 15 et 25 le 22/10 à Saint-Quentin-en-Tourmont (80).

Hivernage : Présente en déc. sur le littoral picard, 1 le 02/12 à Fort-Mahon, 1 le 10 à Saint-Quentin-en-Tourmont (80) et 17 le 20 à Rue.

ALOUETTE DES CHAMPS *Alauda arvensis*

(105 données)

Quelques données d'oiseaux en **migration** : Morienvall (60) : 212 le 6, 275 le 13, 1639 le 22 oct. ; 3231 le 3, 2498 le 4, 632 le 9 et 842 le 11 nov.

ALOUETTE HAUSSECOL *Eremophila alpestris*

(15 données)

Peu de données et pas de bandes importantes cet hiver sur le littoral.

	janv.1	fév.2	fév.3	nov.1
BdA	12		1	
RNBdS	12	16	13	
St-Valéry/ Somme		11		
	nov.2	nov.3	déc.1	déc.2
BdA				
RNBdS	2	4	8	4
St-Valéry/ Somme	5			

HIRONDELLE DE RIVAGE *Riparia riparia*

(90 données)

Première obs. : un individu précoce le 26/02 au HA (80).

Nidification : Quelques colonies sont notées

Aisne : Bucy-le-Long (35 trous), Grigny-en-Thiérache (15 trous), Maizy (180 trous), Soupir (30 trous), Viry-Nouveau, Villers-Cotterêts (Forêt de Retz), Villers-en-Prayères (400 trous)

Oise : Angy (71 trous), Boran-sur-Oise, Verberie (300 trous), Gouvieux, Saint-Leu d'Esserent, Saint-Maximin (900 trous), Varennes.

Somme : Amiens (1 ind. Entre dans un trou dans un parapet, Boismont (36 trous), Daours (15 trous), Framicourt, Fricourt.

Migration post-nuptiale : 750 le 15/08 en BdA (80) ; au HA (80) (en dortoir) : 4500 le 22/08, 1500 le 24, 1450 le 26.

Dernière obs. : 1 le 14/10 au HA.

HIRONDELLE RUSTIQUE *Hirundo rustica*

(123 données)

Première obs. : 1 le 13/03 à Cires-les-Mello (60).

Migration pré-nuptiale : déjà 70 le 27/03 à LSM (60), 100 le 06/04 à Gouvieux (60), 200 le 07 à Houdancourt (60) et 500 le 04/05 au HA (80).

Migration post-nuptiale : Morienvall (60) : 124 le 26/09, 154 le 27, 175 le 30 ; 232 le 01/10, 370 le 6 et 10 le 13.

Quelques données très tardives dans la Somme : Saint-Valéry-sur-Somme : 1 le 26/11, 5 le 10 et 3 le 17/12 ; 1 le 03/12 à Cayeux-sur-mer et la dernière le 21/12 à Blangy-Tronville (80) (L. GAVORY).

HIRONDELLE DE FENETRE *Delicon urbica*

(81 données)

Première obs. : 1 le 30/03 à Saint-Félix (60)

Nidification : surtout notée dans l'Oise.

Dernière obs. : 1 le 14/10 à St-Quentin-en-Tourmont (80).

PIPIT ROUSSELINE *Anthus campestris*

(6 données pour 4 sites.)

Migration pré-nuptiale : 1 le 10/05 à Lataule (60) (P. ROYER)

Migration postnuptiale : Morienvall (60) : 1 le 19/08 et 2 le 27/09 (P. et M. SENGEZ) ; HA (80) : 2 les 22 et

23/09 (P. DECORY et F. SUEUR) et 6 le 23/09 en BdA (80) (T. RIGAUX).

PIPIT DES ARBRES *Anthus trivialis*

(46 données)

Première obs. : 1 le 02/04 en F. d'Ermenonville (60).

Nidification : l'Oise accueille la quasi-totalité des nicheurs et seulement un site signalé dans l'Aisne et dans la Somme.

Dernière obs. : 3 le 01/10 à Morienvall (60).

PIPIT FARLOUSE *Anthus pratensis*

(134 données)

Quelques données de **migration** : Morienvall (60) : 36 le 24/09, 325 le 26, 733 le 30 ; 522 le 01/10, 437 le 4, 593 le 6, 284 le 12, 591 le 13, 257 le 22, 109 le 29 ; 111 le 09/11, 471 le 4, 231 le 9 et 42 le 11.

PIPIT SPIONCELLE *Anthus spinoletta*

63 données, toutes réalisées dans l'Oise ou dans la Somme, une seule dans l'Aisne. Quelques bandes : 26 le 21/02 à Sacy-le-Grand (60), 40 le 06/09 à Camon (80), 15 le 25 à Chevières (60) ; 25 le 27/10 à Vauciennes (60).

PIPIT MARITIME *Anthus petrosus*

Seulement deux données pour deux sites, à noter une rare mention à l'intérieur des terres.

1 le 24/11 dans une prairie à Saint-Germer-de-Fly (60) (H. DE LESTANVILLE) ; 1 le 14/11 à Noyelles-sur-mer (80).

BERGERONNETTE PRINTANIERE *Motacilla flava*

(84 données)

Une donnée **hivernale** d'un individu le 05/02 aux Bdd Chevières (60) (R. BARADEZ et P. MALIGNAT).

Premier migrateur : 1 le 16/03 à Dieudonné (60).

Quelques **rassemblements post-nuptiaux** : 150 le 05/09 à Ourroy (60), 250 le 25/09 à Lataule (60)...

Dernière obs. : 2 en migration active à Morienvall.

BERGERONNETTE FLAVEOLE *M. f. flavissima*

(4 données)

Première obs. : 10 le 10/04 au HA (80) où y sont aussi notées 65 le 12 et 57 le 26/04 (X. COMMECY).

2 le 30/04 à Mézières-en-Santerre (80). Pas de donnée concernant la nidification.

BERGERONNETTE A TÊTE GRISE *M. f. thunbergi*

1 le 09/04 à Château-Thierry (02) (A. BOUSSEMAR).

BERGERONNETTE DES RUISSEAUX *M. cinerea*

74 données pour 34 sites.

Notée durant toute la période et dans toute la région ; nidification de mars à juillet.

Aisne : Mont-Saint-Père.

Oise : Beauvais, Breuil-le-sec, Breuil-le-vert, Chantilly, Coye-la-forêt, Saint-Félix, Senlis, Vieux-moulin.

Somme : Boves, Conty, Daours, Fouencamps, Hem-hardenvall, Loeuilly, Vers-sur-Selles.

BERGERONNETTE GRISE *Motacilla alba*

(34 données)

La **migration post-nuptiale** est bien suivie à Morienvall (80) : 92 le 01/10, 99 le 5, 427 le 6, 176 le 13, 162 le 22 ; 77 le 09/11, 7 le 11.

Quelques rassemblements : 320 le 07/10 à Saint-Etienne-Raloye (60), 180 le 19/10 à Croutot (60).

Hivernage : Il est surtout noté dans l'Oise : Breuil-le-sec, Chevières, Creil, Gouvieux, Houdancourt, Moru.

Aisne : Chamouille (PEA), Noyon et Montlognon.

Somme : Cayeux-sur-mer.

BERGERONNETTE DE YARREL *M. alba yarelli*

11 données pour 6 sites, toutes réalisées sur ou près de la côte.

BdS : 1 le 10/02, Cayeux-sur-mer : 1 le 18/03, Fort-Mahon : 1 le 06/03, Saint-Quentin-en-Tourmont : 1 le 09/02 et 3 le 10/03. 16 le 29/10 à Beauchamps.

Nidification : 1 seul site d'observation pendant la période : 1 les 4 et 14/06 à Saint-Quentin-en-Tourmont

CINCLE PLONGEUR *Cinclus cinclus*

Une seule donnée, les observations des observateurs de Thiérache n'ayant pas été communiquées : 1 le 06/05 à Blangy (Forêt d'Hirson). (F. NOËL et H. ARBOUCH).

ROSSIGNOL PHILOMELE *Luscinia megarhynchos*

(52 données)

Première obs. : 1 le 18/03 à Rethondes (60) puis 1 le 06/04 à Gouvieux (60).

Dernière obs., date peu tardive, 2 le 30/07 à Houdancourt

GORGEBLEUE A MIROIR *Luscinia svecica*


44 données pour 25 sites.

Première obs. : 1 le 12/03 à Verneuil-en-Halatte.

Nidification : Voir carte

Dernière obs. : 1 le 07/09 à Vauciennes (60).

Répartition des chanteurs de Gorgebleue à miroir en 2000



ROUGEQUEUE NOIR *Phoenicurus ochruros*

(65 données)

Première obs. : 1 le 11/03 à Epieds (02). Les migrateurs arrivent dans la deuxième décade de mars et cela continue tout le mois.

Hivernage : on compte 8 observations hivernales (en augmentation) ; Aisne : 1 le 26/02 à Bucy-le-Long ;

Oise : 1 m. le 12/01 à Venette, 1 le 10/12 à Cires-les-Mello, 1 le 17/12 à Verberie, 1 le 30/12 à Senlis ;


Somme : 1 les 19/01 et 23/12 au HA, 1 le 14/12 à Amiens.

ROUGEQUEUE A FRONT BLANC *P. phoenicurus*

(45 données)

Première obs. : 1 le 25/03 à Trosly-Breuil (60)

Répartition des chanteurs de Rougequeue à front blanc en 2000



Dernier : 1 le 03/11 en BVS.

TARIER DES PRES *Saxicola rubetra*

(51 données)

Première obs. : 1 le 01/03 à Babeuf (60).

Nidification : peu de données cette année.

Nidification : cette année les nicheurs sont contactés dans le pays de Bray (60) et surtout dans les forêts de l'Oise et du sud de l'Aisne, en forêt de Hez-Froidmont, au bois du Roi, en forêt de Chantilly et à Château-Thierry. Les plus fortes densités sont trouvées dans les forêts de Compiègne et d'Ermenonville.

Vallée de l'Oise (Aisne et Oise) : Appilly, Manicamps, Vendeuil et Varesnes.

Dernière obs. : 2 le 11/11 à Cayeux-sur-mer – HA (80).

TARIER PATRE *Saxicola torquata*

(120 données)

Retour noté dès le 13/01 à Camon (80).

Hivernage de plusieurs individus au HA (80) en janvier et décembre ; 2 le 05/12 à Camon (80) et 1 à Quend (80) le 23/12.

TRAQUET MOTTEUX *Oenanthe oenanthe*.

(87 données)

Première obs. : 1 le 13/03 au HA (80).

Nidification : exclusivement nicheur sur la frange littorale. Cayeux-sur-mer (nord), 1 m. nourrit le 17/05 (X. COMMECY), 10 à 12 c. nicheurs au HA (F. SUEUR)

Dernière obs. : 1 le 03/12 au HA.

MERLE A PLASTRON *Turdus torquatus*

(19 données)

Migration pré-nuptiale : 12 données entre le 03/04 (3 à Noyelles-sur-mer – 80-) et le 25/04 réparties sur les trois départements (nombreuses observations à Morienvall -60-).

Migration post-nuptiale : 7 données du 19/10 au 20/11 (le dernier à Hirson -02-).

GRIVE LITORNE *Turdus pilaris*

(48 données)

Migration pré-nuptiale : max. de 120 le 24/03 à Domfront (60) ; fin le 09/04 avec 5 à Chavençon (60).

Migration post-nuptiale : premières à Saint-Quentin-en-Tourmont (80), 40 le 19/10. Noyelles-sur-mer (80) : 257 le 15/11, 613 le 28...

Hivernage : 700 le 01/02 à Fouilloy (80) et 220 le 15 ; 175 le 30/12 à Baron –(60).

Nidification : non rapportée cette année.

GRIVE MUSICIENNE *Turdus philomelos*

(81 données)

A notre : 70 en plein hiver le 13/02 à Morienvall (60).

GRIVE MAUVIS *Turdus iliacus*

(95 données)

Première obs. : 2 le 09/09 à Saint-Quentin-en-Tourmont (80).

Dernière obs. : 6 le 04/04 à Hangest-sur-Somme (80).

Quelques bandes importantes, principalement dans la Somme : 377 le 28/11 à Noyelles-sur-mer, 205 le 30/11 à Nampont.

GRIVE DRAINE *Turdus viscivorus*

(66 données) Rien de particulier à signaler.

BOUSCARLE DE CETTI *Cettia cetti*

(96 données pour 31 sites ; observée toute l'année).

Nidification : Aisne : Brissay-Choigny (1 cht.), Lislet (1 cht.), Neuville-sur-Ailette (1 cht.), Vermand (1 cht.).

Oise : Vallée de la Somme : Ailly-sur-Somme (1 cht.), Amiens (2 cht.), Camon (1 cht.), Frise (1 cht.), Glisy (1 cht.), La Chaussée-Tirancourt (1 cht.), Mareuil-Caubert (2 cht.). Sus amiénois : Boves (1 cht.), Fouencamps (1 cht.), Moreuil (1 cht.). Vallée de la Bresle : Gamaches (1 cht.). PMP : Noyelles-sur-mer (20 cht.), Rue (11 cht.), Saint-Quentin-en-Tourmont (4 cht.), Villers-sur-Authie (2 cht.).

CISTICOLE DES JONCS *Cisticola juncidis*

(14 données pour 4 sites dans la Somme littorale)

Des chanteurs sont entendus du 18/06 au 17/09 ; en RNBdS 1 à 4 ind ; (P. ROYER, F. SUEUR et T. RIGAUD) ; au HA : 1 les 18/06 et 12/08 ; à Noyelles-sur-mer : 1 le 05/09 ; à Fort-Mahon : 1 le 17/09 (F. SUEUR).

Le nombre de sites et d'individus reste croissant.

LOCUSTELLE TACHETEE *Locustella naevia*

(44 données pour 24 sites)

Première obs. : 1 le 01/04 à Noyelles-sur-mer (80).

Dernière obs. : 1 le 17/08 à Saint-Quentin (02).

LOCUSTELLE LUSCINOIDE *L. luscinioïdes*

(12 données pour 6 sites)

Première obs. : 3 le 07/04 à Noyelles-sur-mer (80).

Nidification : on peut noter une baisse du nombre de données. Oise : marais de Sacy (2 cht.). Somme : Boves (1 cht.), Noyelles-sur-mer (4 cht.), Rue (9 cht.), Villers-sur-Authie (1 cht.).

Dernière obs. : 1 le 25/09 à Cayeux-sur-mer (80).

PHRAGMITE DES JONCS *A. schoenobaenus*

(63 données pour 30 sites)

Première obs. : 1 le 21/03 au HA (80).

Nidification : Aisne : 5 sites pour autant de chanteurs ; Oise : 13 sites pour 26 chanteurs ; Somme : 10 sites pour 26 chanteurs données partielles).

Dernière obs. : 1 le 25/09 à Cayeux-sur-mer (80).

ROUSSEROLLE VERDEROLLE *A. palustris*

(8 données)

8 données pour 8 sites

Oise : Chantilly (1 cht.)

Somme : Boves (1 cht.), Camon (1 cht.), Cayeux-sur-mer (3 cht.), Daours (1 cht.), Mareuil-Caubert (1 cht.), Saint-Quentin-en-Tourmont (1 cht.), Villers-sur-Authie (1 cht.). Peu notée.

ROUSSEROLLE EFFARVATTE *A. scipaceus*

(88 données)

Première obs. : 1 cht. le 01/04 à Noyelles-sur-mer (80)

Jusqu'à 50 ind. Le 17/08 à Saint-Quentin (02).

Dernière obs. : 1 le 12/10 à Amiens (80).

ROUSSEROLLE TURDOIDE *A. arundinaceus*

(3 données)

Espèce en régression alarmante, seulement 3 données pour 2 sites.

1 cht. Les 21 et 22/07 à Cottenchy (80) (V. BAWEDIN et X. COMMECY) ; 1 migrateur le 22/08 au HA (80).

HYPOLAIS ICTERINE *Hyppolais icterina*

Aucune donnée cette année, absence probablement due à la non communication des données des observateurs de Thiérache.

HYPOLAIS POLYGLOTTE *Hyppolais polyglotta*

(62 données)

En augmentation. Même remarque que dans la synthèse de l'année précédente : il est très peu noté dans l'Aisne et dans la Somme.

Première obs. : 3 le 24/04 à Guvy (60).

Dernière obs. : 1 le 17/09 à Vauciennes (60).

FAUVETTE BABILLARDE *Sylvia curruca*

(20 données) pour 15 sites.

On constate une baisse du nombre d'observations et de sites (significatif ?).

Première obs. : 1 le 10/04 à Saint-Félix (60).

Nidification : répartition des chanteurs et des couples, difficile à séparer des migrateurs chanteurs.

Aisne : Neuville-sur-Ailette, Manicamp.

Oise : Avrechy, Gourdelles, Lataule, Monchy-Saint-Eloi et Saint-Félix.

Somme : Amiens, Boves, Dreuil-les-Amiens, Fort-Mahon, Saint-Quentin-en-Tourmont.

Dernière obs. : 1 juv. le 01/09 à Boran-sur-Oise (60).

FAUVETTE GRISETTE *Sylvia communis*

(60 données)

Première obs. : 1 le 04/04 à Breuil-le-vert (60).

Nidification : Jusqu'à 30 chanteurs le 20/05 à Vauciennes (60).

Dernière obs. : une date très tardive avec 1 le 17/12 à Saint-Quentin-en-Tourmont (80) (F. Ducordeau).

FAUVETTE DES JARDINS *Sylvia borin*

(49 données)

Première obs. : Un oiseau précoce, chanteur le 01/04 à Noyelles-sur-mer (80) (F. SUEUR)

Dernière obs. : 1 le 10/09 à Vauciennes (60).

FAUVETTE A TETE NOIRE *Sylvia atricapilla*

(119 données)

Hivernage : 1 le 30/01 à Amiens (80) ; 1 à 2 du 18/11 au 09/12 à Pondron (60) se nourrissant dans une Vigne vierge ; 1 le 15/12 à Mont-Saint-Père (02) et 1 le 29/12 à Amiens (80).

Migration post-nuptiale : 1 le 19/03 à Vismes (80).

POUILLOT SIFFLEUR *Phylloscopus sibilatrix*


29 données pour 11 sites

Première obs. : 1 cht. Le 20/04 en F. de Compiègne (60).

Nidification : toutes les observations sont effectuées dans les forêts de l'Oise (F. de Compiègne, d'Ermenonville, de Hez, de la basse Pommeraie, d'Halatte, d'Ormoy-Villers, et de Thelle ; bois des Côtes), à l'exception d'une dans l'Aisne (F. de Retz).

Dernière obs. : 1 le 20/08 à Morienvall (60).

Répartition des chanteurs de Pouillot siffleur en 2000



POUILLOT DE BONELLI *Phylloscopus bonelli*

(6 données)

6 données pour 4 sites

1 cht. en F. de Compiègne du 08 au 16/05 sur un site peu favorable (M. et P. SENGEZ).

1 cht. du 01/06 au 12/06 dans le secteur du mont du tremble (60). Site connu depuis 1994 (A. ROUGE, R. BARADEZ et P. MALIGNAT) ; nicheur probable.

1 cht. à Béthisy-Saint-Pierre (60) à la vallée Saint-Fiacre (R. BARADEZ et P. MALIGNAT), site connu depuis deux ans par L. GAVORY ; nicheur possible.

2 cht. et un troisième au sol le 13/06 en F. de Pontarmé (60), la butte aux gens d'armes et 1 le 08/07 (P. MALIGNAT). Site connu depuis 1988 ; nicheur probable.

Une recherche a été effectuée par R. BARADEZ et P. MALIGNAT (à paraître) dans les forêts de l'Oise ; tous les sites antérieurement signalés ont été contrôlés avec l'utilisation de repasse ; seuls les trois derniers sites précédents ont permis d'obtenir une réponse positive. Rares sont les indices de nidification, de nombreux chanteurs semblent concerner des migrateurs égarés.

POUILLOT FITIS *Phylloscopus trochilus*

(53 données)

Première obs. : 1 cht. le 22/03 à Noyelles-sur-mer (80)

Migration prénuptiale : arrivée dans plusieurs localités durant la dernière décade de mars.


Dernière obs. : 1 le 24/09, cht ; en halte migratoire à Morienvall (60).

POUILLOT VELOCE *Phylloscopus collybita*

(218 données)

Augmentation du nombre de données hivernales : 32 pour 25 sites de décembre à la mi-février, les chanteurs de la dernière décade peuvent concerner des migrateurs précoces. On remarque que la majorité des oiseaux sont observés en décembre au début de l'hivernage mais des séjours complets sont notés aux bords des rivières.

Répartition des Pouillots véloces hivernants en 2000



Vallée de l'Oise : Chevières, Moru-Pontpoint, Verneuil-en-Halatte, Noyon, Boran-sur-Oise, Verberie, Courtemont-Varennnes.

Vallée du Thérain : Beauvais, Bailleul-sur-Thérain

Vallées de la Somme et de la Bresle : Amiens, Glisy, La-Chaussée-Tirancourt, Gamaches.

Littoral : Cayeux-sur-mer, Saint-Quentin-en-Tourmont, Noyelles-sur-mer.

De nombreuses observations sont réalisées en dehors des vallées mais une seule provient du département de l'Aisne.

ROITELET HUPPE *Regulus regulus*

(55 données)

Rien de particulier à signaler.

ROITELET TRIPLE BANDEAU *R. ignicapillus*


(44 données)

44 données pour 20 sites

Nidification : il est observé exclusivement dans les forêts de l'Oise et de Retz (02).

Des hivernants ont été remarqués cette année.

Répartition des chanteurs de Roitelet triple-bandeau en 2000



GOBEMOUCHE GRIS *Muscicapa striata*

(32 données)

Première obs. : 1 le 06/05 à Saint-Simon (02).

Nidification : il est peu noté sur la région, peut-être en raison de sa discrétion.

Dernière obs. : 1 le 24/09 à Morienvall (60).

GOBEMOUCHE NOIR *Ficedula hypoleuca*

(8 données pour 3 sites)

Première obs. : 1 le 24/04 à Compiègne (60).

Nidification : seulement rapportée de la F. de Compiègne (60) où 14 chanteurs différents seront entendus du 24/04 au 08/05 (R. BARADEZ, P. MALIGNAT, A. ROUGE et al.).

Dernière obs. : 1 le 12/09 à Orrouy (60).

PANURE A MOUSTACHES *Panurus biarmicus*

(10 données pour 5 sites)

Oise : 2 le 23/08 à Boran-sur-Oise (60) (Y. Bas)

Côte picarde : Le Crotoy, 7 le 20/02 ; HA, 18 le 20/02, 3 le 08/07, 1 le 15 et 20 le 03/08 ; Noyelles-sur-mer, 12 le 01/04 et 41 le 03/10 ; Villers-sur-Authie, 3 le 22/02 et 1 le 04/11.

MESANGE NONNETTE *Parus palustris*

(52 données)

Bien présente dans les forêts de l'Oise et pas ou peu notée dans la Somme.

MESANGE BOREALE *Parus montanus*

(34 données)

Présente sur toute la région, rapportée de 20 sites.

MESANGE NOIRE *Parus ater*

(16 données)

16 données pour 10 sites

Nidification : exclusivement vue dans les forêts de l'Oise et tout particulièrement en F. d'Ermenonville.

GRIMPEREAU DES BOIS *Certhia familiaris*

(2 données)

1 donnée remarquable (par sa date et sa localisation) qui a été certifiée par l'auteur qui exclut toute confusion : 1 cht. et 2 juv. le 13/06 à Gouvieux (Y. Bas) ; 3 dont 1 cht. le 20/08 en F. d'Halatte (60) (Y. Bas).

REMIZ PENDULINE *Remiz pendulina*

(4 données)

4 données pour un seul site : 1 à 2 ind. du 30/09 au 08/10 à Vauciennes (F. BOUCHINET et al.)

LORIOT D'EUROPE *Oriolus oriolus*

(80 données)

Première obs. : 1 le 26/04 à St-Quentin-en-Tourmont (80).

Dernière obs. : 1 le 30/08 à Houdancourt (60).

PIE-GRIECHE ECORCHEUR *Lanius collurio*

14 données pour 6 sites

Première obs. : 2 le 21/05 à Compiègne (60)

Nidification : 11 couples ou M. repérés cette année
Soissonnais : F. de Compiègne, 2 sites, 4 c. dont 1 avec 4 juv. volants.

Vallée de l'Oise : Manicamp 2 c., Varennes 2 c. dont 1 M. nourissant 1 juv.

Vallée de la Somme : Daours, 3 M., Allery, 1.

Vallée de l'Ailette : 1 à Neuville-sur-Ailette (02).

PIE-GRIECHE GRISE *Lanius excubitor*

10 données pour 4 sites

Diminution générale alarmante en tant qu'hivernante et nicheuse.

Période inter-nuptiale : 1 hivernant de janv. Au 10/04, revu en déc. En F. de Hez (60) ; 1 du 01/09 au 14/04 à Noyelles-sur-mer (80) ; 1 le 13/04 à Beautor (02) ; 1 le 18/04 à Manicamp (04).

Pas de signalement de **nidification** cette année.

CHOUCAS DES TOURS *Corvus mobedula*

(48 données)

Quelques rassemblements : 316 à Saint-Quentin-en-Tourmont (80) ; 380 le 02/12 et 570 le 23/12 au dortoir à Hangard (80).

CORBEAU FREUX *Corvus frugilegus*

(361 données)

Une enquête régionale a été réalisée cette année, 11500 nids ont été comptabilisés. Par extrapolation, la population picarde est estimée à 20000 c. Une comparaison avec l'enquête de 1978 sur 5 secteurs de la Somme semble montrer une augmentation de 18% des effectifs (X. COMMECY et F. Noël 2001).

ETOURNEAU ROSELIN *Sturnus roseus*

(1 donnée)

1 le 08/06 au HA (80) (A. COHEZ) ; la dernière mention de cette espèce orientale concernait 1 juv. le 31/08/1989 au POM.

MARTIN TRISTE *Acridotheres tristis*

(1 donnée)

2 le 27/07 à Breuil-le-sec (60) (F. BOUCHINET). Il s'agit d'une espèce originaire du sud de l'Asie introduite localement en Afrique. Des cas de reproduction sont connus en France suite à des échappées d'oiseaux tenus en captivité.

MOINEAU FRIQUET *Passer montanus*

22 données pour 12 sites

Observé tout au long de l'année mais seulement 6 sites de **nidification** signalés.

PINSON DES ARBRES *Fringilla coelebs*

(156 données)

Pas de gros passage remarqué : 161 le 22/10 à Morierval (60)...

PINSON DU NORD *Fringilla montifringilla*

(44 données)

Quelques rassemblements hivernaux : 90 le 02/01 en F. de Hez (60) et 95 le 09 puis 150 le 16.

100 le 03/01 à Coye-la-forêt (60).

Derniers : 1 le 23/04 en forêt de Hez (60) et 1 le même jour à Saint-Quentin-en-Tourmont (80).

SERIN CINI *Serinus serinus*

(66 données)

Aucune donnée hivernale.

Premier : 1 le 01/03 à Neuville-sur-Ailette (02).

Dernier : 9 le 30/11 à Villers-sur-Authie.

VERDIER D'EUROPE *Carduelis chloris*

(52 données)

Quelques bandes hivernales : 95 le 05/02 à Montiers et 260 le 16/12 à Berneuil-sur-Aisne (60).

TARIN DES AULNES *Carduelis spinus*

(110 données)

L'**hivernage** est principalement noté dans l'Oise : 120 le 07/01 à Retz, 71 le 25/02 à Compiègne...

Dernier : 1 le 11/05 à Saint-Quentin-en-Tourmont (80).

Première obs. : 3 le 21/07 en RNBdS (80).

Migration post-nuptiale en RNBdS : 70 le 15/10, 160 le 22 et 80 le 11/11.

LINOTTE MELODIEUSE *Carduelis cannabina*

(54 données)

Hivernage : encore quelques bandes dans l'Oise en décembre : 240 le 16/12 à Berneuil-sur-Aisne, 150 le 24 à Morierval.

SIZERIN FLAMME *Carduelis flammea*

5 données pour 4 sites

Observations toutes effectuées dans le sud de l'Oise : **hivernage** : 1 le 14/02 en F. de Pontarmé, 12 le 28/02 à Chantilly.

Migration prénuptiale : 1 le 16/04 en F. d'Ermenonville, 8 le 25/04 en F. de Pontarmé ;

Migration postnuptiale : 1 le 23/10 à Senlis.

BEC-CROISE DES SAPINS *Loxia curvirostra*

(6 données pour 4 sites)

Même remarque que les deux années précédentes : il est uniquement observé en baie de Somme et dans les forêts du sud de l'Oise.

A St-Quentin-en-Tourmont (80) : 14 le 09/01 et 5 le 28.

F. d'Ermenonville (60) : 4 le 02/04 et 1 le 24, 1 le 15/12 ; bois du lieutenant – Apremont – (60) : 1 le 09/05.

GROSBECCASSE-NOYAUX *Coccothraustes*

Coccothraustes

(66 données)

Quelques bandes importantes : 20 le 15/12 à Amiens (80), 18 le 25/02 à Lamorlaye (60).

En période de **nidification**, il est surtout présent dans l'Oise et l'Aisne.

BRUANT LAPON *Calcarius lapponica*

(2 données)

2 le 11/11 en RNBdS (80) (F. SUEUR 2001) et 1 le 03/12 au HA (80) (J.L. Bigorne).

BRUANT DES NEIGES *Plectrophenax nivalis*

15 données pour 5 sites littoraux

Baie de l'Authie : 19 le 02/01, 26 le 9 ; 23 le 05/02 et 2 le 20.

RNBdS : 12 le 22/01 ; 13 le 06/02, 1 le 22 et 35 le 10/12.

Saint-Valéry-sur-Somme : 17 le 18/02.

Le Hourdel : 10 le 06/02

HA : 1 le 03/12, 3 le 23 et 4 le 24.

BRUANT ZIZI *Emberiza cirius*

6 données pour 3 sites

Toujours aussi rare : 1 le 31/03 en RNBdS (80) (F. SUEUR, 2001) ; 1 le 01/04 à Saint-Quentin-en-Tourmont (80) (T. DAUMAL, F. NOËL et H. ARBOUCH) ; 1 cht. du 20 au 27/10 à Laigneville (60) (F. BOUCHINET). Les quelques couples du Sud d'Amiens n'ont pas été repérés.

BRUANT DES ROSEAUX *Emberiza schoeniclus*

(106 données)

En **migration**, 52 le 04/11 à Morienvall (60).

BRUANT PROYER *Miliaria calandra*

(52 données)

Rares sont les mentions hivernales et pas de grosses bandes : 1 le 09/11 à Blaincourt-les-Precy (60) et 10 le 22/02 à Neuilly-en-Thelle (60).