

ENQUETE SUR LES LIMICOLES NICHEURS DE PICARDIE

Synthèse des résultats des prospections conduites au cours des saisons de reproduction 1995 et 1996

par Thierry Rigaux, coordinateur de l'enquête

INTRODUCTION

L'enquête sur les Limicoles nicheurs de Picardie, objet de la présente synthèse, s'inscrit dans le cadre plus général de l'enquête nationale pilotée par la Ligue de Protection des Oiseaux (LPO).

Son lancement a été motivée par le constat suivant :

- la première (et la plus récente) enquête nationale "Limicoles nicheurs de France" a été coordonnée en 1983-1984 par Dubois et Mahéo (1986) et sa réactualisation semblait vivement souhaitable après une dizaine d'années ;
- le statut de certaines espèces de Limicoles est précaire en France (Yeatman-Berthelot & Jarry 1994) et dans le reste de l'Europe (Tucker & Heath 1994).

Les objectifs assignés à l'enquête nationale étaient les suivants :

- évaluer les effectifs nicheurs (couples cantonnés) en France des quinze espèces de limicoles concernées ;
- préciser la distribution actuelle des espèces ;
- déduire des tendances évolutives ;
- identifier les sites prioritaires pour la conservation des limicoles et proposer des mesures de conservation pour les espèces présentant un statut de conservation défavorable ;
- évaluer la proportion des effectifs de limicoles nichant dans les espaces protégés.

En Picardie, une participation active des ornithologues régionaux à l'enquête nationale paraissait également vivement souhaitable pour permettre une comparaison de la situation régionale actuelle avec celle des années 1983-1984, pour lesquelles les ornithologues régionaux s'étaient mobilisés et avaient permis la réalisation d'une première synthèse sur les effectifs nicheurs de limicoles en Picardie (Rigaux, 1985).

Cette synthèse montrait la diversité assez élevée des espèces nicheuses en Picardie mais aussi le caractère précaire de leur statut (effectifs souvent faibles, habitats en voie de raréfaction...).

Depuis, les travaux réalisés sur les Limicoles nicheurs ont porté essentiellement sur la plaine maritime picarde qui a bénéficié d'une intensité de prospection assez soutenue comme en témoignent les publications suivantes: "Oiseaux d'eau nicheurs en plaine maritime picarde" de Mouronval et Triplet, 1991, "Les Limicoles nicheurs de la plaine maritime picarde" de Triplet et al, 1993, "Volet avifaune de l'étude d'accompagnement de l'opération locale agriculture-environnement en plaine maritime" de Flipo et al., 1995.

En dehors de ce territoire et du secteur de la vallée de l'Oise (entre Thourotte et Vendeuil) concerné par l'action communautaire pour la nature (ACNat) pilotée par le Conservatoire des Sites Naturels de Picardie, les données sont généralement ponctuelles ou fragmentaires. L'atlas des oiseaux nicheurs de Picardie (Combecy, 1995) concernant la période 1983-1987 constitue une référence régionale intéressante dont il faut noter toutefois qu'elle reprend pour l'essentiel, en ce qui concerne les Limicoles, les résultats de l'enquête 1983-1984 (Rigaux, 1985). L'ouvrage "Oiseaux nicheurs menacés de Picardie (Gavory et al., 1995) réactualise le statut régional de la plupart des espèces objet de la présente enquête sans avoir pu en intégrer tous les résultats, pour des raisons de calendrier d'édition. Le contexte local se prêtait donc bien à une réactualisation des connaissances à l'échelle de l'ensemble du territoire régional.

MODALITÉS DE DÉROULEMENT DE L'ENQUÊTE

Les modes de prospection préconisés par le coordinateur régional correspondent aux recommandations communiquées par la Ligue de Protection des Oiseaux. L'ensemble des ornithologues identifiés comme susceptibles de participer aux prospections de terrain dans l'Aisne et la Somme ont été destinataires d'une lettre circulaire en date du 17 mars 1995 accompagnée des pièces jointes suivantes :

- présentation des protocoles de l'enquête 1995-1996 (document LPO) ;
- bordereaux des méthodes détaillées et simplifiées ;
- bilan sur le statut reproducteur européen et national des espèces étudiées avec préconisations pour leur recensement ;
- liste des destinataires de la lettre et du dossier.

Cette lettre incitait les personnes informées à reproduire les documents adressés et à les transmettre à un maximum d'ornithologues.

Pour le département de l'Oise, le principe d'une délégation de la coordination à l'échelle départementale a été retenu, le Groupe d'Etudes Ornithologiques de l'Oise étant bien structuré. La mission de coordination a été confiée à Franck Spinelli auquel les ornithologues de l'Oise étaient donc conviés à communiquer leurs observations.

Le courrier adressé en mars incitait également les ornithologues à informer les coordinateurs locaux, départemental ou régional des territoires/sites qu'ils comptaient

**Effectifs de Limicoles nicheurs recensés DANS LES TROIS DÉPARTEMENTS DE PICARDIE
AU COURS DE LA SAISON DE REPRODUCTION 1995**

Espèces (en nombre de couples)	SOMME	AISNE	OISE	TOTAL PICARDIE
Huitrier pie	20-22	-	-	20-22
Avocette	min 73	-	-	min 73
Petit Gravelot	66-70	50-57	18-21	134-148
Grand Gravelot	4	-	-	4
Gravelot à collier interrompu	42-45	-	-	42-45
Vanneau huppé	218-242	73-94	29-32	320-368
Bécassine des marais	2 (possible)	4	-	6
Barge à queue noire	3	-	-	3
Courlis cendré	1 (possible)	17-19	-	18-20
Echasse blanche	9	-	-	9
Nombre minimal d'espèces nicheuses par territoire	10	4	2	10

**Effectifs de Limicoles nicheurs recensés DANS LES TROIS DÉPARTEMENTS DE PICARDIE
AU COURS DE LA SAISON DE REPRODUCTION 1996**

Espèces (en nombre de couples)	SOMME	AISNE	OISE	TOTAL PICARDIE
Huitrier pie	16-17	-	-	16-17
Avocette	89-94	1	-	90-95
Petit Gravelot	67	19-21	20-21	106-109
Grand Gravelot	6	-	-	6
Gravelot à collier interrompu	48-51	-	-	48-51
Vanneau huppé	207-231	30-45	21-25	258-301
Bécassine des marais	1-2	-	-	1-2
Barge à queue noire	1	-	-	1
Courlis cendré	1	16	-	17
Chevalier gambette	1	-	-	1
Chevalier guignette	-	2	-	2
Echasse blanche	1	-	-	1
Nombre minimal d'espèces nicheuses par territoire	11	5	2	12

prospector afin de veiller à la cohérence des recensements effectués par les uns et les autres.

Les responsables sitologiques étaient les suivants :

Pour le Département de la Somme

En Plaine Maritime Picarde :

- pour la Baie d'Authie : Thierry Rigaux et Stéphanie Flipo ;
- pour le Marquenterre (bas champs entre la baie d'Authie et le Champ Neuf) : Pascal Etienne et Jérôme Mouton ;

- pour le Parc Ornithologique du Marquenterre et le Domaine Public de la Réserve Naturelle de la Baie de Somme : Philippe Carruette et Patrick Triplet ;
- pour le Champ Neuf : Stéphanie Flipo ;
- pour les marais arrière-littoraux : Stéphanie Flipo ;
- pour le marais du Crotoy et les gravières de Saint-Firmin : Philippe Carruette ;
- pour la Basse Vallée de la Somme (incluant la renclôture Elluin) : Patrick Triplet ;
- pour le Hâble d'Ault et le poulier de galets : Jean-Claude Robert pour les Gravelots, Laurent Gavory pour les autres espèces ;

- pour les bas-champs de Cayeux (hors Hâble) : Laurent Gavory ;
- pour les bassins de décantation de Grand Laviers : Gérard Deloison.

Pour l'intérieur du Département :

- pour la vallée de la Somme entre Abbeville et Amiens : Laurent Gavory ;
- pour la Réserve Naturelle de Boves : Xavier Commecy ;
- pour les bassins de décantation de Daours : Vincent Bawedin ;
- pour les bassins de décantation d'Eppeville : Nadia de la Perche ;
- pour les bassins de décantation d'Estrées Mons : Xavier Commecy.

Pour le Département de l'Aisne :

- pour la Moyenne Vallée de l'Oise (ZICO) : Rémi François assisté de l'équipe du GFFA animée par Yves Corbeaux ;
- pour la Vallée de l'Aisne (de Soissons à Guignicourt) : Jacques Litoux ;
- pour la vallée de la Souche : Laurent Gavory ;
- pour la Thiérache : Laurent Larzillière ;
- pour la vallée de la Marne : Joël Moréniaux ;
- pour les bassins de décantation d'Aulnois-sous-Laon : Laurent Gavory ;
- pour Bohain-en-Vermandois : Fabrice Cochon.

Pour le Département de l'Oise, la coordination est assurée par Franck Spinelli.

RÉSULTATS

Liste des observateurs ayant communiqué leurs observations.

La liste est la suivante (les noms suivis d'un (*) indiquant les personnes ayant participé activement de façon certaine aux deux années d'enquête) :

Gilles Anglerot, S. Bacquet, Rémi Baradez (*), Serge Barande, Olivier Bardet, Vincent Bawedin (*), Jacques Bellard, Marie-Paule Bertrand, Pierre Boennec (*), Evelyne Boennec (*), Olivier Boucher (*), Jacques Camus (*), Philippe Carruette (*), Alain Church (*), Fabrice Cochon, Xavier Commecy (*), Agnès Corbeaux, Aline Corbeau (*), Christiane Corbeau (*), Nathalie Corbeau (*), Yves Corbeaux (*), Charles Dancoisne, Régis Decool, Gérard Deloison (*), Dominique Delville, J. Durand, Jean-Claude Erman, Pascal Etienne (*), Stéphanie Flipo (*), Rémi François (*), Laurent Gavory (*), Jean-Marie Gernet, Michaël Guerville, Marie-Claire Hiblot, Jean-Eric Lardé (*), Jean-Rock Lardé (*), Ombeline Lardé, Laurent Larzillière, Jacques Litoux, Hélène Lison (*), Bernard Mafille, Dominique Mafille, Franck Mafille, Frédéric Mafille, Georges Mafille, Pascal Malignat (*), Liliane Marchandise, Jean-Bernard Marque (*), Monique Michel, Joël Moréniaux (*), Jérôme Mouton (*), Nadia de la Perche, Christian Renard (*), Nicolas Renard (*), Thierry Rigaux (*), Isabelle Riot, Jean-Claude Robert (*), Alain Rouge, Gabriel Saget, Simone Saget (*), Dominique Salvi, Jean-Michel Sannier, Franck Spinelli (*), Patrick Triplet (*), Patrick Varin, Marie Viera.

Merci de la compréhension et de l'indulgence des personnes qui auraient été malencontreusement oubliées

Données spécifiques recueillies :

Les résultats sont fournis sous la forme des tableaux départementaux et régionaux ci-annexés.

DISCUSSION

a) Remarque sur l'implication des ornithologues régionaux.

Effectifs de Limicoles nicheurs recensés DANS LE DÉPARTEMENT DE L'OISE AU COURS DE LA SAISON DE REPRODUCTION 1995					
Espèces (en nombre de couples)	Moyenne Vallée de l'Oise (en amont de Thourotte) ZICO	Vallée de l'Oise en aval de Thourotte (partiel)	Marais du Lys (partiel ?)	Autres sites (partiel)	TOTAL
Petit Gravelot	5-7	13-14	-	-	18-21
Vanneau huppé	12-14	6	7-8	4	29-32

Effectifs de Limicoles nicheurs recensés DANS LE DÉPARTEMENT DE L'OISE AU COURS DE LA SAISON DE REPRODUCTION 1996							
Espèces (en nombre de couples)	Moyenne Vallée de l'Oise (en amont de Thourotte) ZICO	Vallée de l'Oise en aval de Thourotte (partiel)	Marais du Lys (partiel ?)	Vallée de la Nonnette (Chantilly)	Marais de Sacy	Autres sites (Grandvilliers)	TOTAL
Petit Gravelot	3-4	16	-	-	-	1	20-21
Vanneau huppé	3-4	14-17	1	2	1	-	21-25

Ayant bénéficié du concours de plus d'une soixantaine de personnes, les prospections réalisées au cours de la saison de reproduction se sont appuyées sur un réseau d'observateurs bien plus étoffé que lors de l'enquête régionale réalisée en 1983 et 1984. La mobilisation constatée est réjouissante mais il subsiste toutefois des lacunes qui imposent une certaine prudence dans l'interprétation des résultats, le différentiel d'intensité de prospection pouvant évidemment constituer un biais considérable. La plaine maritime picarde est quasiment la seule entité territoriale qui, relativement bien suivie, permette de dégager assez surment des tendances démographiques, quoiqu'il faille parfois rester prudent. A titre d'exemple des biais à prendre en compte dans la comparaison des résultats des deux enquêtes, signalons que la population reproductrice de Gravelots de la façade littorale de Picardie n'avait probablement jamais été suivie aussi finement qu'en 1995 et 1996.

b) Commentaire général sur les données relatives à la réussite de la reproduction.

Globalement, il convient de signaler que les informations relatives à la réussite de la reproduction recueillies dans le cadre de l'enquête sont assez rares et fragmentaires. D'une façon générale, faute de temps ou par souci de minimiser les dérangements, les observateurs se sont contentés de recueillir des informations sur le nombre

de couples cantonnés. Des études complémentaires sur des territoires à fortes potentialités sont donc précieuses pour mieux cerner les freins à la réussite de la reproduction et, a contrario, pour identifier les mesures les plus susceptibles de l'améliorer.

HUTRIER PIE *Haematopus ostralegus*

Inféodée à la plaine maritime picarde, la population reproductrice est assez bien suivie et semble en léger déclin (20-22 couples en 1995 et 16-17 en 1996 contre 19-26 en 1983/84).

VANNEAU HUPPÉ *Vanellus vanellus*

Dans la Somme, l'effectif littoral recensé est assez stable (201-221 couples en 1995, 197-221 en 1996 contre 201-211 en 1984) tandis que l'effectif recensé dans l'intérieur du Département passe de 2 couples en 1983/84 à 17-21 couples en 1995 (et 10 couples en 1996), vraisemblablement grâce à l'accroissement de l'effort de prospection.

Dans l'Aisne, l'effectif recensé passe de 17-21 couples en 1983/84 à 73-94 couples en 1995 et 30-45 en 1996, progression considérable imputable essentiellement à une étude attentive de la ZICO de la moyenne vallée de l'Oise, à celle de la vallée de l'Aisne, des marais de la Souche et de sites plus ponctuels disséminés, en Thiérache en particulier. Un effort de prospection particulier sur la vallée de l'Oise en amont de la ZICO et sur les paysages

Effectifs de Limicoles nicheurs recensés DANS L'INTÉRIEUR DU DÉPARTEMENT DE L' AISNE AU COURS DE LA SAISON DE REPRODUCTION 1995								
Espèces (nombre de couples)	Moyenne Vallée del'Oise (ZICO)	Vallée de l'Aisne (de Soissons à Guignicourt)	Vallée de la Souche	Thiérache (partiel)	Vallée de la Marne (partiel)	Aulnois sous-Laon (bassin de décantation)	Bohain-en-Vermandois	TOTAL
Petit Gravelot	17	26-31	-	4	-	3-5	-	50-57
Vanneau huppé	32	14-15	8-17	10	2-5	3-5	4-10	73-94
Bécassine des marais	3	-	1	-	-	-	-	4
Courlis cendré	16-18	-	-	1	-	-	-	17-19

Effectifs de Limicoles nicheurs recensés DANS L'INTÉRIEUR DU DÉPARTEMENT DE L' AISNE AU COURS DE LA SAISON DE REPRODUCTION 1996								
Espèces (nombre de couples)	Moyenne Vallée del'Oise (ZICO)	Vallée de l'Aisne (de Soissons à Guignicourt)	Vallée de la Souche	Thiérache (partiel)	Vallée de la Marne (partiel)	Aulnois sous-Laon (bassin de décantation)	Autres sites (Festieux, aérodrome de Laon)	TOTAL
Avocette	-	-	-	-	-	1	-	1
Petit Gravelot	8-9	?	-	2-3	?	8	-	19-21
Vanneau huppé	9-12	?	15-27	3	-	1	-	30-45
Courlis cendré	15	-	-	-	-	-	1	16
Chevalier guignette	-	-	-	2	-	-	-	2

ouverts de Thiérache comportant encore des espaces prairiaux pourrait révéler quelques couples supplémentaires.

Dans l'Oise, l'effectif recensé se monte à 29-32 couples en 1995 et à 21-25 en 1996, soit un effectif inférieur à celui enregistré en 1983/84, ce qui est fort préoccupant. Une réelle régression de l'espèce est démontrée sur quelques sites, tels que les marais du Lys dont la population nicheuse est désormais proche de l'extinction.

GRAND GRAVELOT *Charadrius hiaticula*

Cette espèce, suivie tout particulièrement par Jean-Claude Robert, est confinée à la plaine maritime picarde et même au Hâble d'Ault. Ses effectifs restent très faibles : 2-3 couples en 1983/84, 4 couples en 1995 et 6 couples en 1996.

PETIT GRAVELOT *Charadrius dubius*

Dans la Somme, les effectifs totaux recensés passent de 31-37 couples en 1983/84 à 66-70 couples en 1995 et 67 en 1996. Cette progression est essentiellement imputable à la qualité du suivi réalisé par Jean-Claude Robert sur le Hâble d'Ault et le cordon de galets le prolongeant jusqu'au Hourdel (commune de Cayeux). Dans l'intérieur du Département, l'effectif compté est stable ou en légère régression: 11 couples en 1983/84, 8-10 en 1995 et 8 en 1996.

Dans l'Aisne, l'effectif recensé passe de 14-16 couples en 1983/84 à 50-57 couples en 1995 (et 19-21 en 1996, année pour laquelle des déficits de prospection importants sont encore notés). Cette progression résulte probablement pour partie des améliorations apportées dans la prospection (des bassins de décantation notamment) mais aussi, et surtout, de la multiplication des habitats favorables (au

Effectifs nicheurs recensés DANS L'ENSEMBLE DU DÉPARTEMENT DE LA SOMME AU COURS DE LA SAISON DE REPRODUCTION 1995

Espèces (nombre de couples)	Plaine maritime picarde	Somme intérieure	TOTAL
Huitrier pie	20 - 22	-	20 - 22
Avocette	min73	-	min 73
Petit Gravelot	58 - 60	8 - 10	66 - 70
Grand Gravelot	4	-	4
Gravelot à collier interrompu	42 - 45	-	42 - 45
Vanneau huppé	201 - 221	17 - 21	218 - 242
Bécassine des marais	1	1	2
Barge à queue noire	3	-	3
Courlis cendré	1	-	1
Echasse blanche	8	1	9
Nombre d'espèces par grande entité territoriale	10 espèces	4 espèces	10 espèces

Effectifs nicheurs recensés DANS L'ENSEMBLE DU DÉPARTEMENT DE LA SOMME AU COURS DE LA SAISON DE REPRODUCTION 1996

Espèces (nombre de couples)	Plaine maritime picarde	Somme intérieure	TOTAL
Huitrier pie	16-17	-	16-17
Avocette	89-94	-	89-94
Petit Gravelot	59	8	67
Grand Gravelot	6	-	6
Gravelot à collier interrompu	48-51	-	48-51
Vanneau huppé	197-221	10	207-231
Bécassine des marais	1-2	-	1-2
Barge à queue noire	1	-	1
Courlis cendré	1	-	1
Chevalier gambette	-	1	1
Echasse blanche	1	-	1
Nombre d'espèces par grande entité territoriale	10 espèces	3 espèces	11 espèces

moins momentanément) avec la prolifération des carrières en milieu alluvial (vallées de l'Aisne et de l'Oise, en particulier).

Dans l'Oise, seuls 10 couples avaient été comptés en 1983/84 contre 18-21 en 1995 et 20-21 en 1996. L'augmentation observée trouve vraisemblablement son explication dans les phénomènes signalés ci-dessus.

GRAVELOT À COLLIER INTERROMPU

Charadrius alexandrinus

Limitée au département de la Somme, la population nicheuse recensée est passée de 31-37 couples en 1983/84 à 42-45 couples en 1995 et 48-51 en 1996. Cette augmentation apparente ne doit pas occulter la très forte régression de la population qui se reproduisait en 1983/84 au nord de la Baie de Somme, sur les sites du banc de l'Ilette et de l'Anse Bidard. Notons l'augmentation spectaculaire des effectifs recensés au Hâble d'Ault entre les deux enquêtes régionales: de 4-5 couples à 39-40 couples. Il est difficile de faire la part des choses entre l'augmentation réelle de la population

nicheuse et la part d'augmentation des effectifs recensés qui revient à l'amélioration de la qualité du recensement.

BÉCASSINE DES MARAIS *Gallinago gallinago*

L'effectif nicheur régional, probable ou possible, semble quasiment stable: 6 couples recensés en 1983/84 contre 5 couples en 1995 (mais seulement 1-2 en 1996) En revanche, la distribution spatiale des observations réalisées est très différente: 5 couples cantonnés repérés dans L'Oise en 1983/84, aucun en 1995 tandis que les 3 couples recensés dans la portion axonaise du secteur de vallée de l'Oise classé en ZICO n'étaient pas connus en 1983/84. Cette espèce est manifestement très rare et menacée.

COURLIS CENDRÉ *Numenius arquata*

Dans la Somme, le statut de l'espèce est toujours aussi précaire : 1 couple reproducteur possible au cours des deux enquêtes en plaine maritime picarde. En fait, en 1995 et 1996, ce sont de simples cantonnements sans suites qui sont observés.

Effectifs de Limicoles nicheurs recensés DANS L'INTÉRIEUR DU DÉPARTEMENT DE LA SOMME AU COURS DE LA SAISON DE REPRODUCTION 1995

Espèces (nombre de couples)	Vallée de la Somme entre Abbeville et Amiens	Réserve naturelle de Boves	Bassins de décantation de Daours	Bassins de décantation de Roye	Bassins de décantation d'Eppeville	Bassins de décantation d'Estrées Mons	Autres sites circonstanciels	TOTAL
Petit Gravelot	-	-	3-5	?	2	?	3	8-10
Vanneau huppé	13-16	-	-	1-2	1	-	2	17-21
Bécassine des marais	-	1	-	-	-	-	-	1
Echasse blanche	-	-	-	-	1	-	-	1
Nombre minimal d'espèces nicheuses par site	1	1	1	1	3	?	2	4 espèces nicheuses

Effectifs de Limicoles nicheurs recensés DANS L'INTÉRIEUR DU DÉPARTEMENT DE LA SOMME AU COURS DE LA SAISON DE REPRODUCTION 1996

Espèces (nombre de couples)	Vallée de la Somme entre Abbeville et Amiens	Bassins de décantation de Daours	Bassins de décantation de Roye	Bassins de décantation d'Eppeville	Bassins de décantation d'Estrées Mons	Vallée de la Bresle (territoire picard)	Autres sites circonstanciels (marais du Bout du monde à Amiens)	TOTAL
Petit Gravelot	?	4	?	-	?	3	1	8
Vanneau huppé	3	1	6	-	?	-	-	10
Chevalier gambette	1	-	-	-	-	-	-	1
Nombre minimal d'espèces nicheuses par site	2	2	1	-	?	1	1	3

Effectifs de Limicoles nicheurs recensés EN PLAINE MARITIME PICARDE (SOMME) AU COURS DE LA SAISON DE REPRODUCTION 1995

Espèces (nombre couples)	Baie d'Authie	Marquenterre	Champ Neuf	Marais de Saily-Bray	Parc Ornithologique	R.B.d.S. (D.P.M.)	Marais du Crotoy	Basse vallée de la Somme	Bas-champs de Cayeux (hors Hable)	Hâble d'Ault et cordons de galets	Bassins de décantation de Grand-Laviers	TOTAL plaine maritime picarde
Huitrier pie	1	1	2	-	7	1	1	3	-	3 à 5	1	20 à 22
Avocette	-	-	-	-	28	6	-	24	-	1	min. 14	min. 73
Petit Gravelot	1	-	2-3	-	1	-	1	1	-	49-50	3	58-60
Grand Gravelot	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4	-	4
Gravelot à collier interrompu	2-3	-	-	-	-	1-2	-	-	-	39-40	-	42-45
Vanneau huppé	23-25	16	15-18	min7	3 (pas de mid)	7	8-10	70	7-10	45-55	-	201-221
Bécassine des marais	-	-	-	-	-	-	-	1 (possible)	-	-	-	1 (possible)
Barge à queue noire	-	-	-	1	-	-	-	2	-	-	-	3
Courlis cendré	1 (possible)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 (possible)
Echasse blanche	-	-	-	-	-	-	2	2	-	-	4	8
Nombre minimal d'espèces nicheuses par site	5	2	3	2	4	4	3	7	1	6	4	10 espèces

Effectifs de Limicoles nicheurs recensés EN PLAINE MARITIME PICARDE (SOMME) AU COURS DE LA SAISON DE REPRODUCTION 1996

Espèces (nombre couples)	Baie d'Authie	Marquenterre	Champ Neuf	Marais arrière-littoraux	Parc Ornithologique	R.B.d.S. (D.P.M.)	Marais du Crotoy	Basse vallée de la Somme	Bas-champs de Cayeux (hors Hable)	Hâble d'Ault et cordons de galets	Bassins de décantation de Grand-Laviers	TOTAL plaine maritime picarde
Huitrier pie	1	1	1	-	8	1	1	3-4	-	-	-	16-17
Avocette	1-2	-	-	-	66	-	-	12-16	-	1	10	89-94
Petit Gravelot	-	7	-	-	3	-	1	2	-	42	1	59
Grand Gravelot	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6	-	6
Gravelot à collier interrompu	4-5	2	-	-	2	5-6	-	-	-	35-36	-	48-51
Vanneau huppé	16-22	45-47	15-20	16-17	4	4-5	4-5	64	10-11	18-24	1-2	197-221
Bécassine des marais	-	-	-	1-2	-	-	-	-	-	-	-	1-2 (possible)
Barge à queue noire	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1
Courlis cendré	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1(possible)
Echasse blanche	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1
Nombre minimal d'espèces nicheuses par site	4	5	2	2	5	3	3	5	1	4	4	10 espèces

Dans l'Aisne, l'effectif global recensé est passé d' 1 couple en 1983/84 à 17-19 couples en 1995 et 13-17 en 1996. En 1983/84, le noyau reproducteur de la moyenne vallée de l'Oise (ZICO) était méconnu (pas recensé du tout) tandis que les prospections de terrain conduites en 1995 ont confirmé le déclin de la station des marais de la Souche, la population paraissant même éteinte aujourd'hui. A noter un couple cantonné en 1995 en haute vallée de l'Oise (Chigny) et à Festieux en 1996. La population reproductrice de la moyenne vallée de l'Oise est suivie de façon concertée par le Groupe Faune Flore de l'Aisne et le Conservatoire des Sites Naturels de Picardie.

Dans l'Oise, aucune observation au cours de l'une ou l'autre des deux enquêtes.

AVOCETTE *Recurvirostra avosetta*

Présente uniquement dans le département de la Somme (en plaine maritime picarde) où les effectifs reproducteurs comptés passent de 104-106 couples en 1983/84 à min 73 couples en 1995 et 89-94 en 1996. On a donc assisté à un certain déclin de la population reproductrice entre les deux enquêtes. Sans rentrer dans le détail des évolutions enregistrées et de leur déterminisme, on retiendra l'effondrement temporaire de la population accueillie par le Parc Ornithologique du Marquenterre (15 couples en 1993 selon Carruette, 1994) et l'éclatement de la colonie en cinq sites de reproduction (POM, Domaine Public Maritime de la Réserve Naturelle de la Baie de Somme, Basse Vallée de la Somme, bassins de décantation de Grand Laviers, Hâble d'Ault). En 1996, on assiste à une repolarisation de la population sur le Parc ornithologique du marquenterre, avec 66 couples, soit environ 70 % de la population régionale.

ECHASSE BLANCHE

Himantopus himantopus

Absente en 1983/84, l'espèce fait une apparition remarquable en 1995 avec un minimum de 9 couples nicheurs, dont 8 en plaine maritime picarde. Cette embellie peut résulter des conditions climatiques rencontrées sur les sites traditionnels de reproduction, plus méridionaux. Mais l'implantation massive de 1995 n'a été que fugace puisqu'en 1996 la population se limite à un seul couple.

CHEVALIER GAMBETTE *Tringa totanus*

Trouvé nicheur certain ou probable en 1983/84, il n'a pas été noté du tout en 1995 tandis que 1996 a fourni l'occasion d'une rencontre d'un oiseau cantonné en vallée de la Somme (amont d'Abbeville). Ce cantonnement semble bien être resté sans suites

Le Chevalier gambette n'est en Picardie qu'un nicheur tout à fait occasionnel, menacé par la dégradation des rares habitats lui convenant.

CHEVALIER GUIGNETTE *Actitis hypoleucos*

Trouvé nicheur certain ou probable en 1983/84, pas contacté en 1995, il est retrouvé en période favorable sur la haute vallée de l'Oise en 1996 (2 couples).

REMERCIEMENTS

Je tiens à remercier tous les observateurs ayant participé à cette enquête, les coordinateurs sitologiques et Vincent Bawedin pour la relecture de l'article.

BIBLIOGRAPHIE

- COMMECY X. coord. (1995) - Atlas des oiseaux nicheurs de Picardie (1983-1987) - Picardie Nature - Centrale ornithologique picarde - numéro spécial de l'Avocette, 234 p.
- DUBOIS P., MAEHO R. (1986) - Limicoles nicheurs de France - ministère de l'Environnement, Ligue française pour la protection des oiseaux, Bureau international de recherches sur les oiseaux d'eau, 291 p.
- FLIPO S., GAVORY L., TRIPLET P. (1995) - Étude d'accompagnement de l'opération agriculture-environnement en plaine maritime picarde - volet écologique : avifaune - Conservatoire des sites naturels de Picardie, Centrale ornithologique picarde, Office national de la chasse, Conseil régional de Picardie, Direction régionale de l'Environnement de Picardie, Syndicat intercommunal de développement économique de l'aménagement du Ponthieu-Marquenterre, 135 p.
- GAVORY L. coord. (1995) - Oiseaux nicheurs menacés de Picardie - Centrale ornithologique picarde, Conseil régional de Picardie, Direction régionale de l'Environnement.
- MOURONVAL J.-B., TRIPLET P. (1991) - Oiseaux d'eau nicheurs en plaine maritime picarde (saison de reproduction 1991 pour les anatidés, foulques et limicoles) - Conseil régional de Picardie - A.P.C.G.E. D.S., O.N.C., 217 pages.
- RIGAUX T. (1985) - Résultats 1983 et 1984 de l'enquête "Limicoles nicheurs" en Picardie - L'Avocette, 1985 9 (I), p. 1-8.
- TRIPLET P., ROBERT J.-C., ETIENNE P. (1993) - Les limicoles nicheurs de la plaine maritime picarde, saison 1993 - Picardie Écologie VIII (1), p. 38-44.
- TUCKER G. HEATH M. F. (1994) - Birds in Europe : their conservation status - Cambridge, UK : Birdlife international (Bird-Life Conservation Series n° 3).
- YEATMAN-BERTHELOT D., JARRY G. (1994) - Nouvel atlas des oiseaux nicheurs de France, 1985-1989 - Société ornithologique de France.

