

## COMMENSALISME DES BECASSEaux SANDERLING *Calidris alba* ET VARIABLE *Calidris alpina* VIS-A-VIS DU GOELAND CENDRE *Larus canus*

par François SUEUR

Si le Goéland cendré *Larus canus* est connu pour parasiter de nombreuses espèces (BARNARD et THOMPSON 1985), dont le Bécasseau sanderling *Calidris alba* s'alimentant d'Annélides (RIGAUX 1984), nous avons eu l'occasion de noter une relation hétérotypique inédite.

Le 3 février 1991 sur la plage de Saint-Quentin-en-Tourmont (Somme) au nord de la baie de Somme alors que nous observions des Goélands cendrés consommant des Coques *Cerastoderma edule* après les avoir laissées tomber d'une certaine hauteur, nous avons eu la surprise de constater qu'une quarantaine de Bécasseaux sanderlings et trois Bécasseaux variables *C. alpina* exploraient les coquilles une fois délaissées par les Laridés. Nous avons ensuite remarqué que les deux espèces de Limicoles se nourrissaient de la chair restée attachée aux valves, en particulier celles des muscles adducteurs. Nous avons déjà noté ce comportement de la part de trois Bécasseaux sanderlings le 10 décembre 1989 à Quend (Somme).

Ce comportement illustre une nouvelle fois la complexité des relations interspécifiques.

### BIBLIOGRAPHIE

- Barnard C.J. et Thompson D.B.A. (1985) *Gulls and Plovers : The Ecology and Behaviour of Mixed Species Feeding Groups* - London, Sydney (Croom Helm), 302 p.
- Rigaux T. (1984) Le Bécasseau sanderling (*Calidris alba*) sur le littoral picard (département de la Somme) - *L'Avocette* 8 : 41-48.