

CENTRALE ORNITHOLOGIQUE G.E.P.O.P.

SYNTHESE DES OBSERVATIONS 1977 DANS LA SOMME

Comme chaque année depuis 1973, année de création de la Centrale, nous constatons une progression des observations reçues tant en quantité qu'en qualité. Certains "ornithologues" se dispensent cependant d'envoyer des comptes-rendus d'observations, cet état d'esprit est déplorable tant du point de vue ornithologique que du point de vue protection de la nature : une meilleure connaissance de l'avifaune amenant une plus grande protection (voir l'exemple des pays anglo-saxons et scandinaves). On remarque une nette amélioration de la prospection des zones auparavant délaissées du littoral (falaises du sud et baie d'Authie au nord), la vallée de la Somme à l'est d'Amiens est très bien prospectée par contre il y a fort peu de données pour cette même vallée à l'ouest d'Amiens ; notons aussi que la forêt de Crécy semble délaissée.

Les faits ornithologiques marquants sont nombreux, signalons seulement :

- pendant la saison de nidification : le Grèbe à cou noir, la Fauvette pitchou et le Pouillot de Bonelli
- les observations du Puffin des Anglais, de la Sterne caspienne et du Pic noir
- l'hivernage de l'Aigrette garzette et de la Spatule blanche
- à l'intérieur des terres : Mouette mélanocéphale et Mergule nain.

H. Dupuich, P. Royer et F. Sueur

CLIMATOLOGIE

D'après le Bulletin Climatologique. Département de la Somme de janvier à décembre 1977 (n° 112 à 123).

Températures

Temps assez froid en janvier, très frais les premières semaines de février. Températures douces pour la saison durant la dernière semaine de ce mois et la plus grande partie du mois de mars. Avril est exceptionnellement frais, mai est frais avec une dernière semaine un peu plus chaude. Juin est très frais et juillet assez frais (aucune journée avec une température supérieure à 30°C à Abbeville), août est très frais (seulement 2 jours où la température égale ou dépasse 25°C à Abbeville), septembre est frais. Octobre est très doux, la première décade de novembre est exceptionnellement douce, la 2e normale et la dernière froide. Décembre est froid au début puis plus doux (+1,6°C par rapport à la normale).

Pluviométrie

Les précipitations sont fortement excédentaires en janvier et février (respectivement 50 et 60% de plus que la normale de ces mois). La pluviométrie de mars et avril est normale. Les précipitations sont excédentaires de mai à juillet (doubles de la normale en mai), très légèrement déficitaires en août surtout en fin de mois, très déficitaires en septembre et normales en octobre. Novembre est le plus pluvieux des mois de novembre depuis 1920 après 1944 : précipitations sont le double de la

normale. La pluviométrie est normale en décembre.

#### Vents

Janvier est normal, février et mars assez venteux (95km/h le 18.02 à Abbeville et 80km/h le 29.03). Avril est très venteux, mai assez venteux. Juin est peu venteux avec des vents de secteur N.NE, juillet est assez venteux. Ensuite nous avons une longue période peu venteuse d'août à octobre. Après une 1ère décade de novembre assez venteuse, on assiste à des tempêtes à partir de la 2e décade (voir note spéciale ci-après), la fin du mois est calme. Décembre est assez venteux, tempête le 24 à Abbeville (94km/h).

#### Insolation

Elle est déficitaire en janvier, normale en février, à nouveau déficitaire en mars puis supérieure à la normale en avril. L'insolation est déficitaire pendant la 1ère décade de mai, normale pendant la 2e, la 3e décade est très ensoleillée. Avec une durée d'ensoleillement à peine supérieure à la moitié de la normale, juin est très déficitaire. Juillet et août sont peu ensoleillés. Septembre est légèrement supérieur à la normale, octobre normal et novembre très ensoleillé. L'insolation légèrement supérieure à la normale en décembre.

#### Novembre

La 1ère décade est très douce par rapport à la normale mais précède la tempête. Le 10 est très doux sans vent, amorce de la tempête le 11, tempête du 11 au 15 : à Abbeville, pointes de 90km/h le 12, 101km/h le 14 et ce même jour 104km/h à Doullens et rafales d'ouest de plus de 130km/h à la côte ; le 15, 90km/h à Abbeville. Les jours suivants, la tempête se calme mais le temps reste venteux et frais avec reprise des rafales les 23 et 24, calme plat en fin de mois.

Le temps du mois de novembre est très particulier car très ensoleillé, très pluvieux et très venteux.

#### Conclusion

Temps froid en janvier et au début de février, doux de fin février à mars, d'avril à septembre frais, doux en octobre et début novembre, froid fin novembre et début décembre, doux le reste de ce mois.

Année assez pluvieuse dans l'ensemble, les pluies abondantes de mai à juillet ont perturbé les nidifications.

Année assez venteuse dans l'ensemble avec une période calme d'août à octobre suivie par les tempêtes de novembre qui amèneront quelques observations intéressantes.

Année moyennement ensoleillée avec un fort déficit de juin à août.

#### OBSERVATEURS :

F. et G. Baudry, P. Bougamont (G.E.M.O.), P. Biet, E. Chacron, X. Combecy, B. Conty, E. Corrado, C. Delahoche, F. Dordain, G. Dubois, G. Duhamel, H. Dupuich, E. Fourcy, F. Froissart (A.P.O.), M.C. Guillaume, J. Hédin (P.O.M.), R. Herbet, O. Hernandez, A. Jouve, L. Kérautret (G.O.N.), V. Lefebvre, M. Mannecart (P.O.M.), D. Masson, E. Mercier (M.E.P.), J. Mouton (G.O.N.), G. Neveu, Y. Poirot, E. et N. Ranson, Y. Ridet (P.O.M.), T. Rigaux, J.C. Robert (Calidris), P. Royer, M. et P. Sauvage (G.O.N.), F., M. et P. Sueur, P. et S. Thiery, P. de Thieulloy, G. Thieux (P.O.M.), J. Trouvilliez, R. Verdy.

ABREVIATIONS :

BA = Baie d'Authie  
BS = Baie de Somme  
POM = Parc Ornithologique du Marquenterre  
M. = mâle  
F. = femelle  
ad. = adulte  
im. = immature  
juv. = juvénile  
SO = Section Ornithologique

\*\*\*\*\*

PLONGEON ARCTIQUE Gavia arctica

1 trouvé mort le 23 janvier sur le littoral.  
POM : 1 le 31 janvier et le 6 février.  
1 le 27 février au HA.

PLONGEON IMBRIN Gavia immer

1 du 12 janvier au 19 février au POM.

PLONGEON CATMARIN Gavia stellata

1 le 16 janvier au POM.  
1 trouvé mort le 23 janvier sur le littoral, 1 autre le 27 février à Cayeux-sur-Mer.  
HA : 1 le 27 février, 1 le 13 mars (traces de plumage nuptial),  
1 le 25.  
1 (plumage nuptial) le 4 juin (X. Combecy, H. Dupuich).

GREBE HUPPE Podiceps cristatus

BS : 26 le 31 janvier, 2 le 11 juillet, 4 le 10 déc.  
104 le 27 février à Cayeux-sur-Mer.  
Cléry-sur-Somme : 15 le 19 février, 35 le 27, 30 le 12 mars,  
23 le 21 avril, 26 le 23 mai, 55 (+2 pulli) le 23 sept.,  
27 le 3 oct., 7 le 26 nov., 8 le 18 déc., 3 le 27.  
Nidification : localité, nombre de couples (nombre de jeunes)  
Boves 1 (2)  
l'espèce était nicheuse en ce lieu  
il y a plusieurs années.  
Cappy 2 (2 grands juv., 2 juv. le 23 sept.)  
Cerisy-Gailly 1 (nouvelle localité)  
Cléry-sur-Somme 10 à 13 (1-1-2-2-2-3-4-4)  
1ères parades le 6 février (G. Dubois)  
2 ad./2 pulli d'une à 2 semaines le  
23 sept. (F. Sueur)  
Corbie 2 à 3 (3)  
HA 1 (2)  
Le Hamel 2 (échec de la nidification pour 1 couple)  
Vaux-sur-Somme 1  
POM : 1 du 5 au 16 juillet, 1 les 25 et 26.

GREBE JOUGRIS Podiceps griseigena

1 du 7 janvier au 27 février au POM, 1 le 27 février à  
Cayeux-sur-Mer, 1 le 11 déc. en BS.

GREBE ESCLAVON Podiceps auritus

BS : 1 le 1er janvier, 1 trouvé mort le 23, 5 le 30 mars.

GREBE A COU NOIR Podiceps nigricollis

BS : 1 le 31 janvier, 1 le 30 mars.  
Rue : 2 puis 3 ad. les 8, 9 et 20 juin (J. Mouton, V. Lefebvre).

Boves : 5 le 23 nov., 1 le 25, 3 le 5 déc. (E. Mercier).  
2 le 18 déc. à Cléry-sur-Somme et 1 à Péronne (SO)

GREBE CASTAGNEUX Podiceps ruficollis

POM : 7 pendant la 1ère décade de janvier, 8 pendant la 2e,  
11 pendant la 3e.  
7 pendant la 1ère décade de février, 6 pendant la 2e,  
3 durant la 3e.  
2 le 13 mars, 1 chanteur les 8 et 9 avril, 1 chanteur  
le 6 juillet. 2 individus les 8, 25 et 26 juillet. 14  
le 9 oct., 16 le 26, 10 le 19 nov., 5 le 11 déc.  
1 chanteur dès le 13 janvier à Daours...  
Cléry-sur-Somme : 1 les 15 janvier et 19 février, 2 le 12  
mars, 12 le 23 sept., 7 le 26 oct., 10 les 3 et 18 déc.,  
3 le 27.  
10 le 14 février à Hamélet.  
Le Hamel : 1 chanteur le 19 février, construction d'un nid  
le 29 mars, min. 6 couples en avril, 1 ad./2 pulli le  
12 juin, 7 le 26 nov.  
Boves : 10 les 9 et 25 nov., 13 le 5 déc.  
10 les 4 et 18 déc. à Saint-Christ-Briost.

PUFFIN DES ANGLAIS Puffinus puffinus

1 le 10 sept. à Cayeux-sur-Mer (D. Masson, M. et P. Sauvage).

FULMAR Fulmarus glacialis

1 trouvé mort le 23 janvier à Fort-Mahon, 2 autres le 16  
avril à Quend-Plage.  
BS : 1 trouvé mort (cadavre ancien) le 8 juillet, 1 autre  
(mort remontant à environ 1 mois) le 13, 1 autre (mort  
assez récente) le 16 oct.

FOU DE BASSAN Sula bassana

Fort-Mahon : 1 ad. trouvé mort le 23 janvier, 3 individus  
le 30 mai.  
Cayeux-sur-Mer : 2 trouvés morts le 27 février, 15 individus  
le 12 sept.  
BS : 3 im. le 31 juillet, 1 ad. 2 im. le 7 août, 1 ad. 1 im. (1ère  
année) le 21, 15 le 23, 1 ad. 1 im. (2e année) le 28,  
nombreux les 3 et 4 sept., 25 le 16, 50 le 17.  
1 juv. trouvé mort le 16 oct. à Quend-Plage.  
1 le 11 déc. au Crottoy.

GRAND CORMORAN Phalacrocorax carbo

BS-POM : 3 ad. le 13 février, 23 en vol vers le N le 9 avril,  
1 ad. 5 im. le 24. 1 les 16 et 26 juillet, 1 les 7 et  
28 août, 5 le 17 sept., 1 le 12 nov., 3 le 13.  
10 le 10 avril à Fort-Mahon, 1 les 4 et 16 juin au HA.  
Cléry-sur-Somme : 1 ad. 1 im. le 10 avril, 1 im. le 30 mai.

HERON CENDRE Ardea cinerea

Cléry-sur-Somme : 1 le 15 janvier, 24 (20 en migration vers  
le SW) le 19 février, 16 le 6 mars, 1 le 21 avril, 7 le  
29 mai, 22 le 18 sept., 13 le 20 nov., 6 le 10 déc.  
Boismont : 40 le 13 mars, 18 le 25.  
colonie de 30 couples (J. Hédin).  
BS-POM : 7 en janvier, 10 en février, 12 en mars et avril, 7  
en mai, 10 le 25 juin, 23 le 4 juillet, 27 en août, 13  
le 25 sept., 28 en oct., 8 en nov., 15 en déc.  
Péronne : 13 au dortoir le 18 déc., dérangés par 1 dortoir  
d'Etourneaux, ils le quittent avant la tombée du jour.

HERON POURPRE Ardea purpurea

1 le 18 mai à Boves (G. Baudry, X. Combecy, F. Dordain, P. Royer).

Le Hamel : 1 d'août au 4 sept., 2 le 11 sept., 1 les 11 et 20 oct. (G. Neveu).

AIGRETTE GARZETTE Egretta garzetta

POM : 1 les 26 et 27 mai, 1 du 13 au 15 juin, 2 du 16 au 20, 3 du 21 juin à sept., 2 du 2 oct. au 13 nov., 1 les 10, 11 et 25 déc.

HERON BIHOREAU Nycticorax nycticorax

1 le 3 juillet au POM (J. Hédin).

BLONGIOS NAIN Ixobrychus minutus

Boves : 3M. le 27 avril (P. Royer), 1 chanteur le 1er mai, signalé de mai à août.

Corbie : 1 couple le 30 avril, 1M. le 6 mai.

1 juv. le 24 sept. au Hamel (G. Neveu).

GRAND BUTOR Botaurus stellaris

Boves : sédentaire, 1 chanteur le 1er mai ; signalé aussi dans d'autres localités de la vallée de l'Avre.

1 chanteur le 21 avril à Eclusier-Vaux et 1 autre à Frise,

1 chanteur le 14 mai à Noyelles-sur-Mer, 1 autre le 9 juin à Rue, 1 chanteur le 12 à Cléry-sur-Somme.

1 le 22 juin à Nampont-Saint-Martin.

CIGOGNE BLANCHE Ciconia ciconia

1 le 24 mai à Velennes.

1 le 13 juin à Quend s'envole vers le S, revue le même jour au POM en vol vers le SW.

4 en vol vers le S.SW le 16 août à Amiens (Presse locale).

CIGOGNE NOIRE Ciconia nigra

1 le 27 août au POM (F. Froissart, J. Trouvilliez).

SPATULE BLANCHE Platalea leucorodia

POM : 2im. du 1er janvier au 14 mai (2 le 31 mars à Rue, les mêmes ?), 6 le 27 mai, 2 du 2 au 5 juin, 8 le 6, 3 du 7 au 10, 4 du 11 au 14, 3 du 15 au 22, 2im. du 23 juin au 2 juillet, 3 les 3 et 4 juillet, 4 le 5, 6 le 6, 7 le 7, 6 le 8, 7 du 9 au 11 (transport de matériaux observé le 10 : Y. Ridet), 5 les 12 et 13, 6 du 14 au 17, 4 le 18, 6 du 19 au 22, 5 le 23, 6 du 24 au 26, 19 le 15 août, 21 le 24.

Ces individus sont également observés en BS et vont jusqu'au Hourdel.

Comportement individualiste d'un individu d'où certaines fluctuations d'effectifs.

HA : 2 les 25 et 26 juin, 1 juv. le 10 sept.

CYGNE TUBERCULE Cygnus olor

Saint-Christ-Briost : 13 le 15 janvier, 2 le 18 février, 19 le 12 mars, 10 le 18 déc.

Cléry-sur-Somme : 2 le 15 janvier, 18 le 19 février, 15 le 20, 1 couple nicheur observé à partir d'avril, 2 pulli viendront à éclosion, 1 seul juv. survivra et sera observé avec les parents jusqu'au 18 déc., 4 le 23 sept., 11 le 10 déc.

Des mouvements entre ces 2 localités sont observés avec des arrêts à Péronne et Brie.

HA : 4 le 16 janvier, 4 le 6 février, 21 le 13 mars, 22 le 15 avril, 5 couples nicheurs (pulli : 4-5-5), 33 le 25 sept., 37 le 9 oct., 64 le 11 nov., 7 le 11 déc.  
9 début février au Hamel, 8 les 11 et 19 nov. à Boismont.

OIE DES MOISSONS Anser fabalis

Hivernage faible début 1977 en BS : 40 pendant la 1ère décade de janvier, 32 pendant la 2e, 24 pendant la 3e, 37 pendant la 1ère décade de février, 15 pendant la 2e.  
7 le 12 nov. au Hourdel, 70 le 29 déc. en BS.

OIE CENDREE Anser anser

Remontée printanière : 17 en vol vers le N le 17 février en BA et 58 vers le NE le 27. 37 vers le NE le 13 mars en BS, 14 vers le N le 16 avril à Quend-Plage.  
1 couple/7 pulli le 28 mai au POM, juv. volants pour la 1ère fois le 20 juin, plus que 8 individus du 12 au 26 juillet.  
1 ad. serait sauvage, l'autre issu de semi-domestiques volants ce qui semble être confirmé par 1 observation du 16 juillet : 1 ad. de la sous-espèce anser (sauvage), les 7 autres individus présentant le bec rose de la sous-espèce rubrirostris (introduite au POM).  
Descente automnale : importante le 11 oct. (500 à Camon, 100 à Cachy, notée à Amiens, Boves et Corbie), 35 en vol vers le S.SW le 14 nov. à Corbie et passage nocturne le 17, 21 vers le S le 26 au Hamel.

OIE DES NEIGES Anser caerulescens

Une note séparée tentera de faire le point sur les observations de cette espèce au POM.

BERNACHE CRAVANT Branta bernicla

- ventre sombre B. b. bernicla  
BS : 1 le 24 février, 4 le 6 avril, 1 le 10, 45 en vol vers le N le 14. 1 le 25 sept., 6 le 26 nov.  
14 le 13 nov. à Cayeux-sur-Mer.
- ventre pâle B. b. hrota  
BS : 1 le 26 janvier (J. Mouton), 1 le 13 nov. (SO).

TADORNE DE BELON Tadorna tadorna

BS-POM (stationnements) : 900 les 9 et 16 janvier, 600 le 6 février, 450 le 25 mars, 150 les 10 et 24 avril, 75 ad. le 8 juillet, +200 le 25 sept., 400-500 le 12 nov., 1500 le 10 déc.  
1800 le 29 déc. (comptage photo : G. Duhamel).  
nidification : 150 couples. 2ad./7 pulli le 14 mai (date précoce : G. Neveu, F. et M. Sueur). 120 pulli le 14 juin.  
départ en migration de mue : 35-40 en vol vers le NE le 7 juillet.  
BA : 3F./pulli (14, 12 et 7) le 10 juin.  
Rue (bassins de décantation de sucrerie) : 1F./6 pulli le 21 juin.  
Cléry-sur-Somme : 13 le 15 janvier, 21 le 13 février, 23 le 19, 25 le 20, 21 le 12 mars, 20 le 20, 17 le 10 avril, 4 le 21, 14 le 26 nov., 24 les 3 et 4 déc., 39 le 27.  
Péronne : 35 le 30 janvier, les 13 et 20 février. 32 le 18 déc.  
Des mouvements sont notés entre ces deux localités.  
Le Hamel : 1 tué pendant la 2e quinzaine de nov., 1 le 6 déc.

CANARD COLVERT Anas platyrhynchos

POM : 250 le 3 janvier, 160 le 16, 100 le 31 et en février, 60 en mars, 70 en juin, 200 les 5, 6 et 18 juillet, 350 le 20, 300 le 23, 200 en sept., 220 le 9 oct., 230 le 26, +250 le 19 nov., 150 le 10 déc.

nidification : +20 couples. 1F./1 nid/18 oeufs le 9 avril (F. Sueur). 1F./1 nid/oeufs le 21 juillet à quelques jours de l'ouverture de la chasse au gibier d'eau (J. Hédin).

Cléry-sur-Somme : 140 le 15 janvier, 90 le 13 février, 80 le 19, 45 le 23 sept., 120 le 5 nov., 390 le 3 déc., 350 le 10.

nidification : +5 couples.

Dans ces 2 premières localités, les pluies abondantes de mai à juillet ont anéanti de nombreuses couvées.

Autres localités de nidification : Boves et Famechon.  
150 le 18 déc. à Péronne.

SARCELLE D'HIVER Anas crecca

BS-POM : 40 le 3 janvier, 30 les 16 et 31, 35 en mars, 3M. 1F. le 19 juin, 10 le 23, 25 en juillet, 200 le 16 sept. et le 9 oct., 130 le 12 nov., +200 le 10 déc. et 100 le 29.

Cléry-sur-Somme : 7 le 19 février, 35 le 23 sept., 50 le 3 déc., 62 le 4, 10 le 27.

30 le 31 mars à Rue, 7 le 11 avril à Boves, 25 le 11 juillet au HA, 23 le 9 oct. au Hamel, 30 le 4 déc. à Péronne.

CANARD CHIPEAU Anas strepera

BS-POM : 18 pendant la 1ère décade de janvier, 21 pendant la 3e, 1 à 3 pendant les 2 premières décades de février, 5 le 9 avril, 11 le 20 juin, 16 les 21 et 23, 21 le 26, 5 le 8 juillet, 15 le 10 déc.

HA : 2M.2F. le 13 mars, 4M.3F. le 15 avril, 1M.1F. le 14 mai, 10 le 13 juin, 2 le 11 nov.

Cléry-sur-Somme : 3M.3F. le 21 avril, 30 le 26 nov., 4 le 27 déc.

3 le 28 oct. au Hamel.

CANARD SIFFLEUR Anas penelope

BS-POM : 30 les 2 et 3 janvier, 45 le 16, 4 le 22 juin, 3M. 3F. le 8 juillet, 14 le 14, 140 le 9 oct., 150 le 12 nov.

Passages à l'intérieur signalés du 20 février au 24 avril (max. : 16 le 26 février à Corbie) et à partir du 16 oct.

Hivernage à Cléry-sur-Somme : 6 les 26 nov. et 3 déc., 8 le 27 déc.

CANARD PILET Anas acuta

BS-POM : 250 le 9 janvier, +300 le 6 février, 22 le 25 mars, 5 le 9 avril, 4M. le 6 juin, 1F. du 11 au 29, 3F. le 8 juillet, 10 le 16 sept., 25 le 9 oct., +200 le 12 nov., 450 en déc.

Cléry-sur-Somme : 1M. le 19 février, 1M.1F. les 3 et 4 déc., 1M. le 27.

3 le 4 déc. à Péronne.

SARCELLE D'ETE Anas querquedula

1ères : le 25 mars au POM (2M.1F.) et au HA (1 couple).

Migration de printemps notée du 25 mars à avril à Boves, en BS, au HA, au Hamel, au POM et à Rue.

1 couple le 14 mai à Noyelles-sur-Mer et 1M. au HA.  
POM : 7 le 2 juin, 20 le 17.  
3F. alarment le 9 juin au marais de Rue, 1F. alarme le 22  
à Nampont-Saint-Martin, 15 le 25 à Boismont.

CANARD SOUCHET Anas clypeata

BS-POM : 4M. le 2 janvier, 180 le 25 mars, 15 le 6 avril,  
17M. le 9 juin, 11 juv. volants le 19, 20 individus  
les 22 et 23, 10 les 8 et 10 juillet, 17 en vol vers  
le SE le 26, 23 en sept., 11 le 13 nov., 65 le 10  
déc., 15 le 29.  
Cléry-sur-Somme : 4M. 1F. le 19 février, 2M. 2F. le 20  
mars, 13 le 21 avril, 70 le 23 sept., +30 le 26 nov.,  
6M. 2F. le 4 déc., 7M. 2F. le 27.  
HA : 1M. 1F. le 13 mars, 11M. 4F. le 25, 4M. 4F. le 15  
avril, 10 le 11 juillet, 2 le 10 déc.  
30 en mars à Rue.  
Corbie : noté du 15 mars au 6 avril (max. 4M. 5F. le 4 avril).

NETTE ROUSSE Netta rufina

1M. du 4 au 17 déc. à Sailly-Laurette (X. Commecy, G. Neveu,  
F. et M. Sueur).  
1M. tué vers le 10 déc. aux environs de Corbie (P.Biet).

FULIGULE MILOUVIN Aythya ferina

HA : 36 le 16 janvier, 31 le 6 février, 8 le 27, 8 le 25  
mars, 10 couples le 15 avril, 12 le 25 sept., 40 le  
11 nov., 70 le 19, 180 le 10 déc.  
1M. le 19 février à Bray-sur-Somme.  
Cléry-sur-Somme : 70 le 6 février, 115 le 13, 96 le 19,  
150 le 6 mars, 100 le 12, 30 le 20, 20 le 10 avril,  
2 le 3 oct., 70 le 26 nov., 164 le 3 déc., 125 le  
10, 100-110 le 18, 70 le 27.  
Rue : 18 en mars, 3F./pulli (8, 7 et 4) les 8, 9 et 20  
juin (J. Mouton, V. Lefebvre).  
POM : 30 le 3 janvier, 4 le 6 juillet, 7 le 19 nov., 3  
le 10 déc.  
1 couple le 14 sept. à Boves.

FULIGULE MORILLON Aythya fuligula

POM : 2 à 5 du 1er au 21 janvier, 1M. du 3 au 7 juin, 4 les  
4 et 6 juillet, 1M. le 26 oct., 7 le 5 déc.  
HA : 6 les 6 et 27 février, 2 le 25 mars, 1 couple le 15  
avril, 2M. le 11 juillet, 3M. le 19 nov.  
Cléry-sur-Somme : 9 le 15 janvier, 6 le 19 février, 10 le 6  
mars, 1 couple le 21 avril, 16 le 26 nov., 14 le 3 déc.,  
32 le 10.  
1M. le 6 avril à Corbie, 7 le 9 à Saint-Christ-Briost, 1M.  
le 11 à Boves, 4M. 2F. le 9 juin à Rue.

FULIGULE MILOUVIN Aythya marila

POM : 1M. 1F. du 2 au 21 janvier, 2M. du 24 au 26 février,  
3M. le 27, 2M. du 28 février au 10 avril.  
1M. le 5 avril à Corbie.

EIDER A DUVET Somateria mollissima.

Peu noté cette année !

35 le 17 mars en BA, 1 en vol vers le N le 10 avril à Fort-  
Mahon, 1 le 9 oct. et le 10 déc. au HA, 1 le 10 déc. en BS.



MACREUSE NOIRE Melanitta nigra

Cette espèce hivernant au large des côtes, les effectifs mentionnés ici ne sont présentes que pour donner une idée des variations d'abondance.

BS : 48 le 12 janvier, 80 le 21 août, 30 le 17 sept., 130 le 16 oct., 20 le 29 déc.

Fort-Mahon : 30 le 23 janvier, 50 le 30 mars, 380 en vol vers le N le 10 avril, 60 vers le N le 11, 100 le 14 juin.

Quend-Plage : 200 le 16 avril, 10 le 31 juillet.  
31 le 25 déc. à Cayeux-sur-Mer.

MACREUSE BRUNE Melanitta fusca

Les mêmes remarques que précédemment s'appliquent aussi à cette espèce qui est notée sur le littoral du 1er janvier au 5 avril.

GARROT A OEIL D'OR Bucephala clangula

POM : 1F. le 6 février, 1F. le 26 oct., 3F. le 6 déc., 1 du 9 au 11.

HARLE PIETTE Mergus albellus

POM : 2F. le 1er janvier, 1M. 1F. du 5 au 15, 1M. le 16.

HARLE HUPPE Mergus serrator

BS-POM : 1M. le 24 février, 1M. le 30 mars, 20 le 24 avril,  
3F. le 6 déc., 5 les 10 et 11, 1F. le 28.  
8 le 27 mars au Crotoy (écluses), 1 le 25 déc. au HA.

HARLE BIEVRE Mergus merganser

1 le 11 nov. en BS.  
2M. 3F. le 10 déc. à Cléry-sur-Somme (X. Combecy).

BUSE VARIABLE Buteo buteo

Localités d'observation : Boves, Cléry-sur-Somme, Le Hamel (avril et août), Quend, POM (3 le 16 oct...), Saleux, Vers-sur-Selle.

BUSE PATTUE Buteo lagopus

1 du 22 au 27 déc. à Loeuilly (E. Corrado, J. Debergue, O. Hernandez, T. Rigaux).

EPERVIER D'EUROPE Accipiter nisus

Localités d'observation : Amiens (nov.), Boves, BS-POM (juin à déc.), Cléry-sur-Somme (nov.), Grivesnes, Le Hamel (nov.), Noyelles-sur-Mer.

MILAN ROYAL Milvus milvus

POM : 1 du 15 au 30 août (F. Froissart, J. Trouvilliez),  
1 im. le 4 sept.  
4 le 16 oct. (GOP)  
1 hivernant le 6 déc. (V. Lefebvre); à noter qu'un individu avait été tué en décembre 1970 en BS (Kérautret, 1972, Alauda 40 (2) 158-162).  
1 im. le 8 oct. à Sailly-Laurette (F. Sueur).

MILAN NOIR Milvus migrans

1 le 17 avril à Boves et 1 le 19 à Amiens/Saveuse (P. Thiery).  
1 le 13 juin en BS (D. Masson, P. Royer, M. et P. Sauvage).  
1 le 16 août au POM (F. Froissart, J. Trouvilliez).

BONDREE APIVORE Pernis apivorus

1 le 31 août au POM (J. Trouvilliez).

BUSARD DES ROSEAUX Circus aeruginosus

Rue : 1 couple parade le 31 mars, trouvé nicheur en juin (nourrissage le 9).

BS-POM : noté du 20 mai au 16 oct. (dernier : 1F. ad. les 9 et 16 oct.).

1 F./im. le 22 mai à Fouencamps, signalé en juin à Noyelles-sur-Mer, 2 couples cantonnés le 22 juin à Nampont-Saint-Martin.

HA : 1 im. le 8 juillet, 1 F./im. le 4 sept. et le 9 oct.  
1 F./im. le 23 sept. à Cléry-sur-Somme, 1 F./im. le 25 à Boves.

BUSARD SAINT-MARTIN Circus cyaneus

BS-POM : 1 F./im. du 1er au 23 janvier, signalé en août, 1 F./im. du 13 nov. à fin déc.

Velennes : 1 F./im. le 16 janvier et en mars, signalé en août.

1M. le 23 janvier à Favières, 1M. les 15 et 22 février à Rue, 1M. le 2 avril à Saint-Valery-sur-Somme.

1M. 1F. en nov.-déc. à Sailly-Flibeaucourt, 1 F./im. les 10 et 27 déc. à Cléry-sur-Somme, signalé en déc. au Crotoy.

BUSARD CENDRE Circus pygargus

1 im. en mai à Loeuilly (E. Corrado, T. Rigaux).

BALBUZARD PECHEUR Pandion haliaetus

1 le 1er mai à Famechon.

BS-POM : 1 le 18 mai, 1 le 2 juin, 1 du 20 août au 25 sept., 1 le 25 oct.

1 le 21 août au Hamel, 1 du 10 au 24 sept. à Boves, 1 le 3 oct. à Brie et Cléry-sur-Somme.

FAUCON PELERIN Falco peregrinus

POM : 1 le 23 juin (J. Hédin), 1 le 10 déc. (F. Sueur).

FAUCON HOBEREAU Falco subbuteo

1 le 31 mai à Boves. 1 le 16 oct. au POM (GEPOP).

FAUCON EMERILLON Falco columbarius

BS-POM : 2 à 3 de janvier à mars, 1 pendant la 1ère quinzaine de sept., 1 le 16 oct. (GEPOP), 1 du 11 au 13 nov. (SO), 1 le 10 déc.

1 le 11 nov. au Hourdel (SO).

FAUCON CRECERELLE Falco tinnunculus

Espèce particulièrement remarquée en janvier-février et d'octobre à décembre ; signalée en période de nidification (mai-juin) au POM, à Noyelles-sur-Mer et Rue.

PERDRIX GRISE Perdix perdix

2 couples nicheurs au POM (7 et 13 pulli).

35 à 40 individus le 28 août au Hamel, jeunes à peine volants le 31.

CAILLE DES BLES Coturnix coturnix

Le Hamel : 1er chanteur le 21 mai, 3 chanteurs le 9 août.

Espèce encore présente en nombre le 18 sept. puisque signalée à Airaines, Corbie (1 tuée), au Hamel (13 tuées),

dans la région de Montdidier, à Plachy-Buyon (1 tuée),  
Poulainville et dans le Vimeu.

FAISAN DE COLCHIDE Phasianus colchicus  
Nicheur au POM...

RALE D'EAU Rallus aquaticus  
min. 5 chanteurs le 22 sept. au Hamel.

POULE D'EAU Gallinula chloropus  
Nicheuse commune.

FOULQUE MACROULE Fulica atra  
Cléry-sur-Somme : 885 le 15 janvier, 800 le 19 février, 165  
le 12 mars, min. 10-11 couples le 23 mai, 700 le 23  
sept. et en oct., 900 le 26 nov., 1050 le 3 déc., 1700  
le 10, 1100 le 27.  
Brie : 165 le 15 janvier, 315 le 19 février, 125 le 12 mars,  
300 le 4 déc., 180 le 18.  
Péronne : 84 le 15 janvier, 400 le 17 déc.  
Saint-Christ-Briost : 200 le 15 janvier, 120 le 19 février,  
170 le 4 déc., 100 le 18.  
HA : 377 le 16 janvier, 392 le 6 février, 155 le 13 mars, 60  
le 25, 57ad. 3pulli le 11 juillet, 950 en sept., 1200 le  
9 oct., 600 les 1er et 11 nov., +300 le 19, 20 le 10 déc.  
(chute des effectifs en relation avec la diminution de  
nourriture disponible due à l'entrée d'eau de mer à la  
suite de la rupture du cordon littoral le 12 nov. et les  
jours suivants).

HUITRIER-PIE Haematopus ostralegus  
BS-POM : 1000 le 2 janvier, 1200 le 16, 1000 le 23,  
1400 le 6 février, 2000 le 16,  
1200 le 17 mars, 400 le 25,  
400 le 10 avril, 230 le 24,  
170 le 14 mai,  
330 le 5 juin, 500 le 7, 810 le 30,  
310 le 5 juillet, 420 le 7, 480 le 13, +500 les 20  
et 21, 550 le 26 (les bandes en juin et juillet  
sont composées principalement d'immatures),  
1200 le 17 août,  
1000 le 4 sept.,  
1500 les 15 et 16 oct.,  
1500-1600 les 12 et 13 nov.,  
3000 le 10 déc., 1400 le 29 (comptage photo : G.  
Duhamel).

nidification : 2ad./2 pulli éclos le jour-même le 14 juin...  
2 couples nicheurs probables le 25 juin à Boismont (J. Hédin).  
2 couples (découverte d'un nid) dans les prés au S de la BA  
(V. Lefebvre).

VANNEAU HUPPE Vanellus vanellus  
350 le 14 février à Aubigny.

Nidification : +13 couples dans le Marquenterre, au moins  
6 couples à Noyelles-sur-Mer.

Mouvements vers le SW-SE notés dans le Marquenterre du 9 au  
28 juin (voir Fig. 1), les bandes sont composées en grande  
partie de juvéniles.

1ère observation depuis le printemps à l'intérieur des terres,  
dans un secteur où l'espèce ne niche pas, le 9 juin au Hamel  
(concordance avec les 1ers mouvements dans le Marquenterre)




Fig. 1 - Mouvements du Vanneau huppé Vanellus vanellus dans le Marquenterre en juin 1977.

alors que les autres années l'espèce n'était pas notée avant début juillet.

Mouvements migratoires notés surtout du 8 au 23 octobre : 150 en vol vers le SW le 8 au Hamel, 200-250 le 13 à Corbie, 190 le 16 en BS, 200 le 19 à Corbie... reprise de ceux-ci début décembre (Le Hamel).

Peu de stationnements migratoires notables : 250-300 le 20 oct. à Corbie, 200 le 26 nov. à Vaux-sur-Somme...

PLUVIER DORE Pluvialis apricaria

BS : 220 en vol vers le S en 4h le 31 janvier, 250 en vol vers le S le 5 déc., +2350 en vol vers le S en 4h le 6.

POM : 1 le 21 juin, 10 le 5 juillet, 2 le 10, 1 du 15 au 17 août.

15 le 7 mars à Montdidier, 9 le 26 nov. à Vaux-sur-Somme, 8 le 30 nov. à Vaire-sous-Corbie.

Le Hamel : 15 le 16 nov., 24 le 9 déc.

PLUVIER ARGENTE Pluvialis squatarola

BS : 140 pendant la 1ère décade de janvier, 80 pendant la 2e, 250 pendant la 3e, 200 pendant la 1ère décade de février, 240 pendant la 2e, 60 pendant la 3e.

35 le 30 mars, 50 les 5 et 6 avril, 25 le 16, 16 le 14 mai, 10 le 13 juin, 170 le 21 août, 120 le 28, 50 le 17 sept., 60 le 12 nov., 150 le 26 déc., 250 le 29.

POM : 10 le 3 juillet, 21 le 15, 13 le 26 oct.

GRAND GRAVELOT Charadrius hiaticula

BS : 40 les 27 février et 13 mars, 120 le 14 mai, 20 le 13 juillet, 5 le 16 oct., 2 le 13 nov.

Nidification : 1 couple nicheur probable le 24 avril, 3 couples nicheurs au HA.

1 couple nicheur probable le 10 juin au POM.

PETIT GRAVELOT Charadrius dubius

POM : 2 le 15 avril, 3 couples nicheurs (2 couples/3 et 3 pulli les 3 et 10 juin).

Dernier : le 17 sept. en BS.

GRAVELOT A COLLIER INTERROMPU Charadrius alexandrinus

BS-POM : 9 le 25 mars, 20 les 9 et 10 avril, 60 le 7 juillet, 110 le 21, 30 le 28 août.

nidification : 1 accouplement le 9 avril, 2ad./3 pulli le 2 juin, 5 couples le 8...

1 couple/ pulli le 16 juillet au Hourdel.

TOURNEPIERRE Arenaria interpres

BS-POM : 1 le 24 avril, 8 le 18 mai, 10 le 21 juillet, 4 le 30 août, 4 les 3 et 4 sept., 1 le 12 nov.

1 le 12 sept. au HA.

BECASSINE DES MARAIS Gallinago gallinago

Espèce observée toute l'année sur le littoral.

1 en vol nuptial le 22 juin et le 4 juillet au POM. (J. Hédin).

Migrations particulièrement remarquées dans tout le département du 24 mars au 27 avril et du 13 juillet au 13 nov. : 37-42 en vol vers le S le 11 nov. au HA, +20 à Port-le-Grand...

BECASSE DES BOIS Scolopax rusticola

Dunes du Marquenterre : 3 le 15 janvier, 2 les 17 et 26.  
1 le 16 janvier à Fouencamps, 1 le 17 à Quend.  
Le Hamel : 1 le 14 oct., min. 10 le 23, 1 le 29, 2 le 19  
nov., 1 le 27, 2 tuées le 4 déc.  
1 le 4 déc. à Cléry-sur-Somme.

COURLIS CENDRE Numenius arquata

BS-POM : 1500 pendant les 2 premières décades de janvier,  
1700 pendant la 3e, 1200 pendant la 1ère décade  
de février, 900 pendant la 2e, 11 pendant la 3e.  
300 le 25 mars, 450 en avril, 60 le 26 juin, 200  
les 4 et 11 juillet, 450 le 12, 500 en août, 550  
en sept., 700 le 16 oct. et le 13 nov., 400 le 10  
déc., 900 le 29 déc. (comptage photo : G. Duhamel).  
nidification : 2 individus sont accompagnés par un autre  
de la même espèce nettement plus petit (moitié  
moins grand) le 11 juillet dans les mollières de  
la Maye (J. Hédin, F. Sueur). Le Courlis cendré a  
donc probablement niché cette année dans le Mar-  
quenterre.

COURLIS CORLIEU Numenius phaeopus

BS-POM : 2 le 15 avril, 3-4 le 24, +100 le 14 juillet,  
+300 le 17, 200 le 18, 10-15 en août, 15 le 12  
nov.

BARGE A QUEUE NOIRE Limosa limosa

BS-POM : 1 le 15 juin, 2 le 17, 6 le 4 juillet, 2 du 7 au  
25, migration notée du 16 au 30 août, 6 le 12 nov.

BARGE ROUSSE Limosa lapponica

BS-POM : 60 pendant les 2 premières décades de janvier, 70  
pendant la 3e, 26 pendant la 1ère décade de février,  
14-15 pendant les 2 dernières.  
80 le 24 avril, 6 le 14 mai, 3 le 3 juillet, 4 le 11,  
15 les 18 et 20, 9 le 30 août, 12 le 17 sept., 80 le  
13 nov.  
17 le 11 avril à Fort-Mahon.

CHEVALIER ARLEQUIN Tringa erythropus

1er : le 15 avril au HA, cette espèce est ensuite notée de  
façon irrégulière jusqu'au 28 août en BS et au POM.  
1 le 5 déc. en BS (V. Lefebvre).

CHEVALIER GAMBETTE Tringa totanus

BS-POM : 50 pendant la 1ère décade de janvier, 36 pendant la  
2e, 40 pendant la 3e, 12 pendant la 1ère décade de  
février, 28 pendant la 2e, 16 pendant la 3e.  
18 le 25 mars, 15 le 10 avril, 38 le 25 juin, 35  
les 5 et 6 juillet, 30 les 21 et 23, 30 le 16 août,  
20 le 9 sept., 13 le 26 oct., 40 le 12 nov., 60 le  
11 déc., 25 le 29.  
HA : 11 le 25 mars, 30 le 15 avril, 4 le 24.  
Daours : 10 le 18 avril, 3 le 27, 2 le 30, 1 le 6 mai.  
1 le 24 mai au Hamel, 1 le 24 juin à Fouencamps.  
4M. chanteurs le 10 juin dans les prés au S de la BA.

CHEVALIER ABOYEUR Tringa nebularia

BS-POM : 1 le 24 avril, 8 le 4 juin, 10 les 14, 20 et 23  
juillet, 14 le 25, 6 le 28 août, 1 les 3, 4 et 17 sept.

Daours : 1 les 18 et 27 avril, 3 le 30.  
1 le 13 juin au marais de Rue.

CHEVALIER CULBLANC Tringa ochropus

Daours : 1 les 18 et 20 avril, 2 le 27, 3 le 30, 1 le 6 mai.  
Le Hamel : 1 les 5, 18<sup>e</sup> et 19 juin, 1 les 8 juillet et 8 août.  
Fouencamps : 4 le 28 juin, 2 le 17 juillet, 4 le 17 août, 2  
le 8 sept.  
BS-POM : en juillet cette espèce a été remarquée dans de  
nombreux secteurs de la Baie, 5 le 15 sept., 2 le  
12 nov.  
1 le 4 déc. à Péronne (G. Dubois).

CHEVALIER SYLVAIN Tringa glareola

1 le 27 avril à Daours.  
POM : 1 à 2 du 5 juillet au 25 août, 1 le 9 oct.  
1 le 13 sept. à Fouencamps, 1 le 23 à Cléry-sur-Somme.

CHEVALIER GUIGNETTE Tringa hypoleucos

1 hivernant du 1er au 5 janvier au POM.  
Migrations remarquées du 24 avril au 24 mai et du 5 juillet  
au 9 oct. (5 à cette dernière date au HA).

BECASSEAU MAUBECHE Calidris canutus

BS-POM : 10 pendant la 2e décade de janvier, 16 pendant la  
3e, 8 pendant la 1ère décade de février, 11 pendant  
la 3e, 30 le 5 avril, 300 le 14 mai, 140 le 2 juin,  
25 le 5, 10 le 16 juillet, 30 le 28 août, 4 le 17  
sept., noté le 16 oct. (min. 10).

BECASSEAU MINUTE Calidris minuta

Migrations notées du 2 juin au 5 septembre en BS, au HA et  
au POM.

BECASSEAU DE TEMMINCK Calidris temminckii

3 le 27 août au POM.

BECASSEAU VARIABLE Calidris alpina

BS : 5000 pendant la 1ère décade de janvier, 3500 pendant  
la 2e, 6000 pendant la 3e, 5000 pendant la 1ère décade  
de février, 5300 pendant la 2e, 4000 pendant la 3e.  
150 le 25 mars, 280 le 24 avril, 200 le 14 mai, 35 le  
8 juillet, 80 le 21, 130 le 22, 3000 le 13 nov.  
4600 le 29 déc. (comptage photo : G. Duhamel).

BECASSEAU COCORLI Calidris ferruginea

BS-POM : migrations notées du 3 juillet au 19 août.

BECASSEAU SANDERLING Calidris alba

Espèce notée en BS et au POM du 20 mars au 24 avril, le 13  
juin (20) et du 10 juillet au 13 nov. (max. 30 en août).

COMBATTANT Philomachus pugnax

BS-POM : 1 le 26 janvier et 1 le 27 février (J. Mouton).  
migrations notées du 30 mars à avril et du 6  
juillet au 27 août (max. 22 le 17 juillet).  
1M. le 27 avril à Daours, 3 les 13 et 18 juin à Rue, 1F.  
le 4 sept. au HA.

ECHASSE BLANCHE Himantopus himantopus

Rue : 2 le 13 juin, 1M. 1juv. le 18.

1 le 16 juillet au Crottoy.

POM : 1 le 28 juillet, 1 les 15, 16 et 22 août, 1M. 1F.  
le 24, 1M. le 27.

AVOCETTE Recurvirostra avosetta

1 trouvée morte le 27 février en BA.

Nidification : 31 couples au total au POM

2 accouplements le 8 avril, 4 couples le 24 avril  
(1 nid/5 oeufs...), 17 couples le 14 mai (2 ad./4  
pulli éclos le jour-même...), dernière éclosion le  
27 juin.

Encore 52 en migration le 14 mai au POM.

11 les 25 et 26 juin au HA, 5 le 11 déc. en BS.

PHALAROPE A BEC ETROIT Phalaropus lobatus

POM : 1 le 8 mai (Y. Ridet), 1M. les 1er et 2 juin (P. Biet,  
J. Hédin, L. Kérautret, M. Mannecart, J. Mouton), 1M.  
du 13 au 16 juillet (P. Biet, B. Conty, M. Mannecart,  
F. Sueur).

OEDICNEME CRIARD Burhinus oedicnemus

Espèce présente du 4 avril (2) au 30 octobre (1) au Hamel  
où il y a 1 ou 2 couples.

GRAND LABBE Stercorarius skua

BS : 1 le 5 janvier, 1 les 18 et 29 août, 1 le 12 nov.

1 le 20 nov. à Quend-Plage.

LABBE POMARIN Stercorarius pomarinus

1 trouvé mort le 23 janvier sur le littoral picard (GEPOP).

LABBE PARASITE Stercorarius parasiticus

BS : 1 en phase claire le 26 juin (J. Hédin), 1 le 21 août,  
1im. 1ad. en phase claire le 28.

10 Labbes dont 1 L. parasite les 3 et 4 sept.

GOELAND MARIN Larus marinus

Arrivée des 1ers individus en BS et au POM en juin-juillet :  
im. le 4 juin, 5 ad. le 4 juillet, 25 le 20.

GOELAND BRUN Larus fuscus

Arrivée des 1ers individus en BS et au POM en juin-juillet :  
1 ad. les 2 et 5 juin, 12 ad. le 8 juillet.

400 (surtout graellesi) les 12 et 13 nov. en BS.

GOELAND ARGENTE Larus argentatus

1000 en janvier en BS, 450-500 le 4 juin au POM.

1 couple/1 nid/3 pulli, autres couples le 4 juin à Ault  
(Bois de Cise).

1 à pieds jaunes ("omissus" ?) le 8 sept. à Saint-Valery-  
sur-Somme (D. Masson, M. et P. Sauvage).

1 le 4 déc. au Hamel (d'autres observations à l'intérieur  
des terres tout comme pour le Goéland cendré ont été effec-  
tuées, une note leur sera consacré).

GOELAND CENDRE Larus canus

2500 en janvier en BS.

POM et Marquenterre : 16 le 14 mai, 10 le 15 juin, 20 le  
7 juillet...

A l'intérieur des terres : 1 ad. les 3 et 18 déc. à Cléry-  
sur-Somme...



MOUETTE MELANOCEPHALE Larus melanocephalus

1 im. (2e hiver) trouvé mourant le 13 nov. à Famechon  
(J.C. Robert).

MOUETTE RLEUSE Larus ridibundus

Nidification : 60 couples à Cléry-sur-Somme le 23 mai,  
200 couples à Rue,  
petite colonie au POM (1ad./1 juv. non  
volant le 29 juin...).

1000 le 4 juin au POM et en BS.

Mouvements de l'intérieur des terres vers la BS (dortoir)  
notés en fin de journée à Saint-Valery-sur-Somme :

5570 le 11 nov. (SO)

4130 en 30 mn le 12 nov. (SO), comme le passage avait  
commencé 20 mn avant le début du comptage, 7000 individus  
environ ont participé à ces mouvements. De nombreux  
individus se trouvant en BS toute la journée, l'effectif  
du dortoir doit être de plus de 10.000 individus.

Cléry-sur-Somme : la présence d'un dortoir en ce lieu sus-  
pectée depuis quelques années est prouvée le 20 nov.  
(G. Neveu), +500 le 3 déc., 1540 le 27 (H. Dupuich,  
G. Neveu, F. Sueur).

Mouvements de retour vers le dortoir notés à Amiens : 2400  
le 6 déc. ...(G. Baudry).

MOUETTE PYGMEE Larus minutus

BS : 32ad. 1im. le 7 janvier, 24ad. 1im. le 12, 22ad. le  
15, 12ad. le 31 ; 3im. le 1er sept., 9ad. 1im. le 12  
nov.

1 le 24 avril au HA, 1im. le 10 juin en BA, 2 le 20 nov.  
à Quend-Plage.

MOUETTE TRIDACTYLE Rissa tridactyla

60 le 19 août en BS.

GUIFETTE NOIRE Chlidonias niger

BS-POM : 8 le 18 mai, 15 le 18 juin, 1 le 1er juillet, 4 le  
25 août, 2ad. 1im. le 28.

Le Hamel : 3 le 24 mai, 1 les 5 et 25 juin.

1 im. le 27 août à Fouencamps.

HA : 32 le 25 août, 12 le 4 sept., 20 le 5, 4 le 12, 1 le  
9 oct.

GUIFETTE LEUCOPTERE Chlidonias leucopterus

1 le 25 août au HA.

STERNE HANSEL Gelochelidon nilotica

1 le 24 avril en BS (P. Royer, F. et M. Sueur).

STERNE CASPIENNE Hydroprogne caspia

BS : 1 le 31 juillet (D. Masson, P. Royer), 3 le 21 août  
(J. Hédin).

STERNE PIERREGARIN Sterna hirundo

Migration postnuptiale notée dès le 15 juin.

STERNE NAINNE Sterna albifrons

1ères : 5 le 24 avril en BS.

POM : 10 le 3 juillet, 20 à 30 le 17 août.

Dernière : le 17 sept. en BS.

STERNE CAUGEK Sterna sandvicensis

BS-POM : 1ères le 25 mars, 40 le 24 avril, 10 les 24 et 30  
juin, +300 le 3 juillet, 65 le 8, 700 le 16 août,  
25 le 17 sept..  
40 le 19 juin au HA.

PINGOUIN TORDA Alca torda

10 trouvés morts le 23 janvier sur le littoral picard...

MERGULE NAIN Plautus alle

1 recueilli le 24 nov. à Corbie (P. Royer), mort deux jours  
plus tard. D'après N. Ranson, le plumage de cet oiseau pre-  
nant l'eau il aurait été mazouté puis nettoyé, nous pensons  
plutôt que l'oiseau dérouté par les tempêtes était dans un  
tel état de faiblesse physiologique qu'il n'entretenait plus  
son plumage.

GUILLEMOT DE TROIL Uria aalge

33 trouvés morts le 23 janvier sur le littoral picard...  
1 individu le 10 sept. à Cayeux-sur-Mer.

PIGEON COLOMBIN Columba oenas

Peu de données significatives. 1 chanteur le 3 janvier à  
Corbie, 1 autre le 15 août au POM...

PIGEON RAMIER Columba palumbus

Nicheur commun (POM...)  
19 en vol vers le SW (venant de la mer) le 13 nov. en BS.  
450 en vol vers le SW le 17 déc. à Péronne.  
Dortoir de 120 le 27 déc. à Cléry-sur-Somme.

TOURTERELLE DES BOIS Streptopelia turtur

1ère le 16 avril et dernière le 30 septembre au Hamel  
(G. Neveu).

TOURTERELLE TURQUE Streptopelia decaocto

3 couples avec pontes le 16 février à Amiens (Hôtel de  
Berny), 21 couples à Corbie, 80-90 individus le 6 nov.  
à Amiens (Quai de la Somme).

COUCOU GRIS Cuculus canorus

1ers : 2 dont 1 chanteur le 20 mars à Hangest-sur-Somme  
(GEPOP).  
Reproduction prouvée à Saint-Quentin-en-Tourmont.  
1 juv. nourri par 1 Pipit farlouse le 8 juillet au POM  
(P. Biet, M. Mannecart).  
1 le 15 sept. à Fouencamps.  
Dernier : 1 le 25 sept. à Corbie (R. Herbet, P. Sueur),  
tué au même endroit par un chat le 28, il  
s'agissait d'un juv. (F. Sueur).

HIBOU MOYEN-DUC Asio otus

1 chanteur (parades) le 8 mars à Sailly-le-Sec.  
1 trouvé mort le 14 oct. à Domart-sur-la-Luce.  
Noté aussi à Grivesnes et Querrieu.

HIBOU DES MARAIS Asio flammeus

BS-POM : 1 les 16 et 19 janvier, 1 les 29 et 30 mars, 1 le  
20 juin, 1 le 30 août.  
1 le 15 avril à Bosquel et à Loeuilly.

CHOUETTE CHEVECHE Athene noctua

Localités d'observation : Amiens (Longpré), Andechy (déc.), Corbie (mars), Damery (déc.), Daours (avril), La Chaussée-Tirancourt (2 chanteurs le 24 janvier), Le Hamel (mai), POM, Rue, Saint-Quentin-en-Tourmont, Saint-Valery-sur-Somme, Sailly-le-Sec (mars) et Vaux-sur-Somme (mars).

CHOUETTE HULOTTE Strix aluco

1 chanteur le 1er février à La Chaussée-Tirancourt et 1 autre à Vignacourt, 1 chanteur le 8 mars à Corbie.  
Saint-Quentin-en-Tourmont : 1 chanteur le 9 avril, 1 couple/ 3 juv. fin mai, 1 chanteur le 17 juin, 1 individu les 24 et 26 juillet.  
3 le 21 juillet à Rue, 2 le 22.  
1 chanteur 1 juv. le 1er oct. à Grivesnes, 1 chanteur 1 juv. le 7 au Hamel.  
Signalée aussi à Famechon, Guyencourt-sur-Noye, Sains-en-Amiénois, Saint-Gratien, Saint-Valery-sur-Somme et Velennes, Vignacourt.

CHOUETTE EFFRAIE Tyto alba

Localités d'observation : Amiens (Faubourg de Hem, Longpré), Fort-Mahon, Le Hamel, Rue, Saint-Vast-en-Chaussée et Velennes.

ENGOULEVENT D'EUROPE Caprimulgus europaeus

1 chanteur les 26 et 28 août au POM (J. Trouvilliez).

MARTINET NOIR Apus apus

1ers : 10 le 28 avril à Amiens (Hortillonnages).  
Derniers : le 27 août à Boves.

MARTIN-PECHEUR Alcedo atthis

Observé toute l'année, signalé nicheur à Famechon.

PIC NOIR Dryocopus martius

1 le 18 août à Saveuse (P. Thiery).  
1 le 9 oct. et le 24 déc. à Loeuilly (E. Corrado, J. Debergue, O. Hernandez, T. Rigaux).

PIC VERT Picus viridis

PIC EPEICHE Dendrocopos major

Pas de données significatives.

PIC EPEICHETTE Dendrocopos minor

Signalé à Cléry-sur-Somme (sept.), Corbie (janvier à mars), Fouencamps, Le Hamel (février et avril), POM (1 le 28 juin), Saint-Quentin-en-Tourmont et Vaux-sur-Somme (mars).

COCHEVIS HUPPE Galerida cristata

Migrateurs (espèce absente en période de nidification) : 2 le 29 mars à Vaire-sous-Corbie et 1 le 5 avril à Corbie.  
Espèce nicheuse à Amiens (Cité scolaire, Zone industrielle...) et sur le littoral.

ALOUETTE DES CHAMPS Alauda arvensis

1 ad./1 juv. peu volant le 25 avril à Amiens (G. Baudry).  
Nicheuse très commune (POM...).

ALOUETTE HAUSSECOL Eremophila alpestris

BS : 2 le 16 oct., 4 les 11 et 12 nov., 13 le 13, 4 le 11  
déc.

5 le 11 nov. à Cayeux-sur-Mer, 4 le 12 au Hourdel.

HIRONDELLE DE RIVAGE Riparia riparia

1ères : le 5 avril au POM ; un peu plus tardives à l'intérieur :  
2 le 9 avril à Brie.

BS : 300 le 28 août, 1 albinos les 4 et 9 sept.

HIRONDELLE DE CHEMINEE Hirundo rustica

1ère : le 19 mars à Albert (X. Commecy).

L'arrivée de cette espèce est plus nette entre le 26 et le 29  
mars mais l'Hirondelle de cheminée ne devient fréquente qu'à  
partir du 16 avril.

12 nids à la SICADA à Ailly-sur-Somme pour 1 seul en 1976.

1 jeune sortant pour la 1ère fois du nid le 1er oct. au Hamel  
(G. Neveu).

Des attardées en nov. : 1 le 1er à Fouencamps, 2 le 11 à Ault  
(Bois de Cise), 1 le 13 en BS.

HIRONDELLE DE FENETRE Delichon urbica

1ères : 2 le 23 mars à Boismont (J. Hédin).

Arrivée massive fin avril-début mai, constructions de nids  
notées dès le 30 avril.

Encore des pulli au nid le 1er sept. à la Cité scolaire à  
Amiens.

Dernières : le 12 oct. au Hamel.

PIPIT DES ARBRES Anthus trivialis

1er : 1 chanteur le 16 avril au Hamel.

PIPIT FARLOUSE Anthus pratensis

150 picorent sur un bassin de décantation de sucrerie à  
Rue le 10 janvier.

1 nourrit des pulli le 17 avril au Hamel (C. Delahoche,  
F. Sueur).

Signalé aussi nicheur à Daours et dans le Marquenterre.

PIPIT SPIONCELLE Anthus spinoletta

- sous-espèce non déterminée

1 le 8 mars à Daours.

- maritime A. sp. petrosus

signalé en nov. et déc. sur tout le littoral.

BERGERONNETTE PRINTANIERE Motacilla flava

- type M. fl. flava

1ères : 2 le 18 avril à Daours.

Defnières : 2 le 15 oct. à Hamelet, 1 le 16 en BS.

- flavéole M. fl. flavissima

Daours : 1M. le 18 avril, 2M. le 27.

BERGERONNETTE DES RUISSEAUX Motacilla cinerea

Notée jusqu'en mars et à partir de septembre le long de  
toutes les vallées.

Migration visible le 8 oct. au HA.

BERGERONNETTE GRISE Motacilla alba

- type M. a. alba

Nicheuse commune. Migration visible le 8 oct. au HA.

- de Yarrel M. a. yarrelli  
BS-POM : 1 du 13 février à juin, 1 en compagnie d'1  
alba nourrissant des pulli le 12 juin, 1 nourrit  
1 juv. non volant le 23, 1 de juillet à décembre,  
2 le 10 déc.  
1 le 9 avril à Quend-Plage.
- PIE-GRIECHE GRISE Lanius excubitor  
2 couples nicheurs probables au Hamel où l'espèce est obser-  
vée toute l'année.  
1 alarme le 21 juin à Villers-sur-Authie.  
Hivernage signalé à Boves, Cléry-sur-Somme, Moreuil et Rue.
- TROGLODYTE Troglodytes troglodytes  
ACCENTEUR MOUCHET Prunella modularis  
Nicheurs communs.
- TRAQUET TARIER Saxicola rubetra  
1er : 1M. le 15 avril.  
2 couples nicheurs probables au Hamel (1 couple observé  
avec des juv. volants en fin de période de nidification).  
Noté aussi le 25 juin à Boismont.  
Derniers : 2 le 16 oct. à Amiens.
- TRAQUET PATRE Saxicola torquata  
Hivernage en janvier-février : Corbie, Hamelet, Marquenterre,  
Rue et Velennes.  
Retour des migrateurs noté entre le 7 et le 25 mars.  
Nidification : 1F. nourrissant des pulli le 30 avril à  
Sailly-le-Sec, 1 couple/3 juv. volants le 23 mai à  
Cléry-sur-Somme, signalée aussi au POM (6-7 couples).  
Hivernage en décembre : Fouencamps (2M.), HA (2 le 10),  
Herbécourt (1M. le 17), POM (1 le 5), Rue (1 le 10),  
Saint-Fuscien (1M. le 20).
- TRAQUET MOTTEUX Oenanthe oenanthe  
Migrations pré-nuptiale du 20 mars (1F. à Rivery) au 25 mai  
(1 à Moreuil) et post-nuptiale du 17 août (1 au Hamel) au 16  
oct. (1 en BS).
- ROUGEQUEUE NOIR Phoenicurus ochruros  
1er : le 9 mars à Saveuse.  
Nicheur commun : 4 couples au Hamel, 1 couple à Vaire-sous-  
Corbie, 1 couple à Vaux-sur-Somme...  
1 hivernant le 20 déc. à la Cité scolaire à Amiens (T. Rigaux).
- ROUGEQUEUE A FRONT BLANC Phoenicurus phoenicurus  
1er : 1M. le 12 avril au Hamel.  
1 couple nicheur en juin dans un jardin au S d'Amiens.  
Dernier : 1M. le 15 oct. au Hamel.
- ROUGEGORGE Erithacus rubecula  
Nicheur commun. Période migratoire nette du 8 au 12 oct.
- ROSSIGNOL PHILOMELE Luscinia megarhynchos  
1ers : 2-3 chanteurs le 18 avril à Daours.  
Nicheur commun (POM...).
- GRIVE LITORNE Turdus pilaris  
Dernières : 10 le 19 avril à Boves.

3000 en vol migratoire le 13 nov. à Velennes (F. et G. Baudry)

MERLE NOIR Turdus merula

Nicheur très commun.

2 juv. emplumés mais non volants trouvés morts le 6 avril à Corbie, ponte du 1er oeuf vers le 10 mars (F. Sueur).

GRIVE MAUVIS Turdus iliacus

Dernières : le 16 avril au Hamel.

1ères : le 15 oct. à Sailly-Laurette.

GRIVE MUSICIENNE Turdus philomelos

Nicheuse commune.

GRIVE DRAINE Turdus viscivorus

Nicheuse beaucoup moins abondante que la précédente (Le Hamel ...)

BOUSCARLE DE CETTI Cettia cetti

Nicheuse commune sédentaire.

LOCUSTELLE LUSCINIOIDE Locustella luscinioides

1ère : 1 chanteur le 1er mai à Boves.

Signalée à Noyelles-sur-Mer (14 mai) et au POM où elle n'est que migratrice (1 chanteur le 4 juin, non entendu le reste du mois).

LOCUSTELLE TACHETEE Locustella naevia

1ère : le 11 avril à Fouencamps.

PHRAGMITE DES JONCS Acrocephalus schoenobaenus

1er : 1 chanteur le 31 mars à Rue.

Nicheur (POM...).

PHRAGMITE AQUATIQUE Acrocephalus paludicola

1 le 25 août à Noyelles-sur-Mer (J. Trouvilliez).

ROUSSEROLLE VERDEROLLE Acrocephalus palustris

2 couples (1 nid/2 oeufs) le 7 juin à Famechon (J.C. Robert).

2 " nicheurs probables au Hamel (G. Neveu).

2 " (1 nid/2 oeufs, 1 nid/3 oeufs) à Daours (E. Fourcy).

ROUSSEROLLE EFFARVATTE Acrocephalus scirpaceus

Au moins 10 couples nicheurs le long de la Somme en face de l'Ile Sainte-Aragonne à Amiens (X. Combecy).

Nidification prouvée aussi aux Hortillonnages à Amiens et au POM.

Dernières : min. 3 le 4 sept. à Boves (D. Masson).

ROUSSEROLLE TURDOIDE Acrocephalus arundinaceus

1ère : le 16 mai à Boves.

Signalée le 24 juin à Fouencamps.

HYPOLAIS POLYGLOTTE Hippolais polyglotta

Nidification signalée à Famechon.

FAUVETTE DES JARDINS Sylvia borin

1ère : le 16 avril à Corbie.

Nicheuse (Le Hamel...).

FAUVETTE A TETE NOIRE Sylvia atricapilla

1 M. le 20 février à Amiens.

1er chanteur le 20 mars à Condé-Folie.

Nicheuse (Le Hamel...).

FAUVETTE BABILLARDE Sylvia curruca

1ère : 1 chanteur le 30 avril au Hamel.

Signalée en juin à Bellancourt (1 couple/1 nid/2 pulli), au Hamel et au POM.

FAUVETTE GRISETTE Sylvia communis

1ère : le 18 avril à Daours.

FAUVETTE PITCHOU Sylvia undata

Signalée en juin au POM.

CISTICOLE DES JONCS Cisticola juncidis

Nidifications toujours notées à Noyelles-sur-Mer.

Espèce signalée à Sailly-Bray.

POM : 1 le 7 avril, pas de nidification, 1 chanteur du 20 au 25 juillet, 2 chanteurs le 26, 3 chanteurs en août (ces observations correspondent à la dispersion postnuptiale des nicheurs et de leurs progénitures).

2 chanteurs les 9 et 20 juin à Rue.

POUILLOT FITIS Phylloscopus trochilus

1ers : 2 chanteurs le 20 mars à Hangest-sur-Somme, 2 chanteurs le 21 à Corbie et 1 chanteur au Hamel, 1 chanteur le 25 à Amiens et 1 chanteur au Crotoy.

Nicheur (POM...).

Dernier : 1 chanteur le 19 sept. à Amiens (C. Delahoche).

POUILLOT VELOCE Phylloscopus collybita

Hivernage peu remarqué : 2 le 31 janvier dans le Marquenterre.

Le Hamel : construction d'un nid le 21 mars (F. Sueur), 1 individu nourrit des pulli le 17 avril (C. Delahoche).

Nicheur commun (Rue...).

POUILLOT DE BONELLI Phylloscopus bonelli

1 chanteur le 27 mai au Bois du Fau Timon à Boves (F. et G. Baudry, P. Royer).

POUILLOT SIFFLEUR Phylloscopus sibilatrix

Signalé le 13 août à Amiens (Ile Sainte-Aragonne).

ROITELET HUPPE Regulus regulus

ROITELET TRIPLE-BANDEAU Regulus ignicapillus

Notés essentiellement en hivernage.

GOBEMOUCHE NOIR Ficedula hypoleuca

Rare en migration prénuptiale : 1 le 3 mai au Hamel.

Beaucoup plus fréquent en migration postnuptiale du 16 août au 23 septembre.

GOBEMOUCHE GRIS Muscicapa striata

1er : le 6 mai à Corbie.

Signalé en période de nidification à Amiens (La Hotoie), Boves et au Hamel.

Dernier : le 9 oct. à Amiens.

MESANGE A MOUSTACHES Panurus biarmicus

Entendue le 13 février dans la Vallée de l'Avre.

Noyelles-sur-Mer : localité où cette espèce niche et a été observée du 14 mai au 26 octobre (max. 15 le 17 juillet).  
3-4 le 8 juillet au HA.

MESANGE A LONGUE QUEUE Aegithalos caudatus

Nicheuse assez commune.

MESANGE NONNETTE Parus palustris

Peu signalée.

MESANGE BORÉALE Parus atricapillus

Beaucoup plus commune que la précédente, nicheuse.

MESANGE HUPPEE Parus cristatus

Peu signalée : Amiens, Grivesnes (Ainval-Septoutre) et POM.

MESANGE NOIRE Parus ater

2 (dont 1 chanteur) le 4 juillet au POM.

MESANGE BLEUE Parus caeruleus

MESANGE CHARBONNIERE Parus major

Nicheuses communes.

SITTELLE TORCHEPOT Sitta europaea

Signalée en forêt de Crécy, à Amiens (Cimetière de La Madeleine) et à Vellennes.

GRIMPEREAU DES JARDINS Certhia brachydactyla

Signalé nicheur sédentaire à Amiens, Boves et au Hamel.

BRUANT PROYER Emberiza calandra

BRUANT JAUNE Emberiza citrinella

Nicheurs assez communs.

BRUANT A CALOTTE BLANCHE Emberiza leucocephala

1 F./im., d'origine incertaine, en compagnie de Bruants jaunes le 26 nov. au Hamel (F. Sueur).

BRUANT ZIZI Emberiza cirrus

Signalé du 29 mars au 29 septembre à Corbie : 1 couple nicheur probable.

1 chanteur le 31 mai à Amiens (Saint-Acheul).

1 M. chanteur le 17 juin près de Beaucourt-sur-l'Ancre, carte de Bapaume où il n'y avait jusqu'alors aucune donnée sur cette espèce en période de nidification (J. Magrez, Le Héron n°1/78 p.29 ; voir aussi L'Avocette n°1/77 p.14).

Hivernage à Amiens : 6 le 2 déc. (Saint-Leu), 20 le 5 (Cité Scolaire).

BRUANT DES ROSEAUX Emberiza schoeniclus

Nicheur assez commun (HA, Le Hamel...).

BRUANT DES NEIGES Plectrophenax nivalis

HA : 2 le 16 janvier, 25 le 6 février, 7 le 13 mars, 20 le 11 déc., 57 le 25.

2 le 27 février à Ault.



PINSON DES ARBRES Fringilla coelebs

Nicheur commun. Migration remarquée du 8 au 23 octobre.

PINSON DU NORD Fringilla montifringilla

Passages notés du 8 au 11 octobre.

VERDIER Carduelis chloris

Nicheur commun. Dortoir de 40 à 70 le 24 sept. au Hamel...

CHARDONNET Carduelis carduelis

Nicheur commun : 1 ad. nourrit 1 juv. volant le 24 sept. au Hamel...

TARIN DES AULNES Carduelis spinus

10 le 31 mars à Vaux-sur-Somme. Passages migratoires remarqués du 8 au 18 oct.

BS-POM : noté le 12 nov., 20 le 10 déc.

15 le 4 déc. à Boves.

LINOTTE A BEC JAUNE Carduelis flavirostris

BS : 1ères le 16 oct. (GEPOP), 25 le 5 déc., 17 le 25, 11 le 28. 130 le 11 nov. au HA (SO).

LINOTTE MELODIEUSE Carduelis cannabina

Nicheuse commune. 200 le 31 janvier en BS, 100 le 15 octobre au Hamel.

SIZERIN FLAMME Carduelis flammea

1 chanteur le 30 mars dans les dunes du Marquenterre.

Passages notés le 23 oct. à Famechon.

7 en déc. à Fouencamps.

SERIN CINI Carduelis serinus

Nicheur assez commun. 1 le 25 nov. à Boves.

BOUVREUIL PIVOINE Pyrrhula pyrrhula

Nicheur assez commun.

GROSBEC Coccothraustes coccothraustes

3 vers le 25 nov. à Amiens (Cimetière de La Madeleine).

MOINEAU DOMESTIQUE Passer domesticus

Nicheur très commun : 1 nid dans un buisson d'Aubépine

Crataegus monogyna au Hamel...

MOINEAU FRIQUET Passer montanus

Nicheur assez commun : 1 nid dans le même buisson d'Aubépine qu'un couple de Moineaux domestiques au Hamel...

100 le 10 janvier à Corbie.

ETOURNEAU SANSONNET Sturnus vulgaris

Nicheur commun. +2000 le 9 oct. à Flixecourt.

Passages de plusieurs milliers vers le S et le SW les 11 et 12 nov. en BS et au HA, ceux-ci cessent lorsque la tempête souffle, passages faibles le 13.

Dortoir de plusieurs milliers le 11 nov. à Noyelles-sur-Mer.

" repéré à Péronne le 11 déc., effectifs très supérieurs à 150 000 les 17 et 18, 500 000 ? encore plus ? (arrivée au dortoir dure plus de 30mn à un rythme soutenu).

LORIOT D'EUROPE Oriolus oriolus

1er : 1M. le 13 avril au Hamel (G. Neveu).

GEAI DES CHENES Garrulus glandarius

Nicheur. En septembre des passages de type invasionnel ont été notés (une note récapitulera les observations réalisées).

PIE BAVARDE Pica pica

Nicheuse sédentaire.

CHOUCAS DES TOURS Corvus monedula

Nicheur : Corbie (4-5 couples à l'Abbatiale, 1 colonie rupestre de 7 couples)...

30 en migration le 19 oct. à Corbie.

2000 en vol vers le dortoir le 3 déc. à Cléry-sur-Somme.

CORBEAU FREUX Corvus frugilegus

Nicheur : Amiens, clinique Bon Secours 2-3 couples

La Hotoie 13 "

rue Victor Hugo 9 "

square Saint-Denis 1 couple

19 couples à Boves, 11 couples à Famechon, 62 couples à Vaire-sous-Corbie...

600 le 26 nov. à Hamet, Vaire-sous-Corbie et au Hamel.

500 en vol vers le dortoir le 3 déc. à Cléry-sur-Somme.

CORNEILLE NOIRE Corvus corone

- type C. c. corone

Nicheuse assez commune.

- mantelée C. c. cornix

BS-POM : 1 le 17 mars, 1 le 26 oct., 30-40 le 13 nov.,  
30 le 10 déc.

\*\*\*\*\*

ADDITIONS

OBSERVATEUR : J.P. Huin (G.O.N.).

GRAND BUTOR Botaurus stellaris

1 chanteur tout l'été dans une petite phragmitaie près de la résidence Victorine Autier à Amiens (C. Delahoche), cette espèce est considérée comme n'habitant que les grandes phragmitaies.

BERNACHE CRAVANT Branta bernicla

4 volantes de la sous-espèce orientalis en août en baie de Somme. Il ne s'agit pas de celles du POM, les 2 adultes étant éjointés et il n'y avait plus à cette époque que 2 jeunes qui furent éjointés avant de pouvoir voler. Il peut s'agir de spécimens échappés de captivité mais 2 captures sont connues en Grande-Bretagne (1957 et 1958).

CANARD PILET Anas acuta

2 couples nicheurs à Noyelles-sur-Mer (renclôture Elluin).

BUSE VARIABLE Buteo buteo

1 couple nicheur dans la région de Poix.