



Avocette

NIDIFICATION DE L'AVOCETTE (*Recurvirostra avosetta*)

EN BAIE DE SOMME \*

par F. Sueur

La nidification de l'Avocette n'est connue en France qu'en Camargue, dans la région d'Hyères et en Vendée. En baie de Somme, l'espèce n'était connue qu'au passage, les effectifs maxima étant notés en mars-avril, voire mai, lors de la migration prénuptiale (100 à 300 ind.). Depuis quelques années 2 à 3 ind. hivernent. En 1974, des Avocettes furent même observées toute l'année.

Le 8 mai 1975, une Avocette est observée sur son nid dans une zone de "renclôture" du Marquenterre. Le 11, dans cette même zone saumâtre au peuplement herbacé dense mais ras, à 20 m environ du premier nid, un individu creuse une dépression dans le sol; cette tentative demeurera sans suites. Le 17 mai, c'est une petite colonie de 4 couples qui est installée. Le 27, éclosion de la première couvée qui comporte 4 poussins, le début de l'incubation remonte donc au 3 ou 4 mai. Le 31 mai, 5 couples continuent de couvrir ou de pondre. Le 14 juin, 3 couvées ont réussi et 7 autres sont en cours d'incubation. Le 24, 12 couples sont recensés dont 4 avec des jeunes. Entre les 3 et 8 juillet, les éclosions se succèdent; ce dernier jour, le seul jeune survivant de la première couvée, âgé de 42 jours, est observé volant (on admet généralement que les jeunes Avocettes volent vers 45 jours). Le 11 juillet, il ne reste plus que 2 couvées à éclore.

Les couples sont groupés en une colonie lâche. Le jour même de l'éclosion, les Avocettes accompagnées de leurs poussins quittent la zone de nidification; elles s'installent cependant à proximité, sur les bords des canaux et des mares, dans un rayon de 300 m maximum. Jusqu'au 11 juillet au moins, les différents couples restent fidèles à leur cantonnement. Le 22, ils (hormis 3 couples) sont maintenant dispersés sur un vaste secteur. Les nichées les plus âgées ne sont plus accompagnées que par un seul des parents.

Les Avocettes sont réputées se disputer souvent entre-elles, cependant je n'ai noté que quelques comportements agressifs intraspécifiques. Par contre, elles manifestent un comportement très agressif vis-à-vis de nombreuses espèces d'oiseaux (Hérons, Canards, Limicoles, Laridés, Passereaux). A noter toutefois qu'un couple d'Huîtriers-pies et un de Petits Gravelots ont réussi à mener à bien leurs couvées sur un flot occupé par 2 Avocettes et leurs poussins.

Auparavant de passage et hivernante, l'Avocette niche pour la première fois en baie de Somme en 1975 (12 couples). Les 10 premiers couples donnèrent 27 poussins à l'éclosion (1 couvée de 1, 2 de 2, 6 de 3, 1 de 4). 2 nouveaux points de nidification viennent d'être découverts dans la région Nord (Le Héron 1975/4).

Je tiens à remercier MM. Delcourt, Duhamel, Lefèbvre, Ridet et Royer pour les observations qu'ils ont bien voulu me communiquer

\*texte remanié d'une note publiée dans Alauda 1975, 43:482-483

