

CENTRALE ORNITHOLOGIQUE G.E.P.O.P.

SYNTHESE DES OBSERVATIONS 1980 DANS L' AISNE

Cette synthèse, par rapport aux précédentes, est plus étoffée. Plusieurs raisons à cela : une légère augmentation du nombre des observateurs et les sorties collectives effectuées dans le cadre de l'enquête F.I.R. Ces dernières ont permis de clarifier la situation des Rapaces et d'autres oiseaux.

L'année a été marquée par un printemps pluvieux et un mois de juillet très humide : 20 jours consécutifs de pluie. Les nichées ont eu du mal à se développer et elles ont été faibles.

La couverture du département est inégale :

- bonne en Thiérache,
- assez bonne en Vermandois (mise en réserve du marais de l'Isle à Saint-Quentin) et en Laonnois (sauf le marais de Saint-Boétien),
- faible pour la vallée de l'Aisne (les observateurs parisiens fréquentant ce secteur n'envoient pas leurs données),
- nulle pour le sud du département.

Quelques données retiennent l'attention :

- la découverte d'un noyau de Milans royaux nicheurs,
- l'hivernage d'un Pygargue,
- la nidification du Guêpier et de la Grive litorne,
- les données sur le Hibou petit-duc et le Bec-croisé des sapins.

Les Rapaces seront traités à part.

H. Dupuich

Abréviations

M. = mâle

F. = femelle

ind. = individu

im. = immature

juv. = juvénile

ASL = Aulnois-sous-Laon (bassins de décantation)

FCB = forêt de Coucy-Basse

FNT = forêt du Nouvion-en-Thiérache

FSG = forêt de Saint-Gobain

MISQ = réserve du marais d'Isle à Saint-Quentin

MSB = marais de Saint-Boétien (terme global correspondant à une zone de marais et d'étangs à l'est de Laon regroupant plusieurs communes)

Boué = secteur de nidification

Observateurs

G. Baudoin, P. Biet (P.O.M.), B. Blaise, S. Boutinot, N. Cocu, X. Combecy, C. Delahoche, E. Delval, P. Ducrot (C.O.C.A.), M. Duquef, A. Dupuis, H. Dupuich, O. Hernandez, L. Kérautret (G.O.N.), H. et S. Lefèvre, M. Marleux, E. Mercier, E. Nowack, J. Ostertag, P. Pigeon, E. Ranson, T. Rigaux, P. Royer, B. Taillez (G.O.N.), A., C., G. et J.C. Tombal (G.O.N.), P. Triplet et I. Veriere.

PLONGEON CATMARIN Gavia stellata

1 ind. du 5 au 11 novembre et 1 du 8 au 13 décembre au MISQ
(P. Pigeon).

GREBE HUPPE Podiceps cristatus

Beaucoup de données sur la nidification, résultant d'une meilleure prospection.

Boué : site nouveau, 1 couple qui se cantonne le 27 avril, 2 ad./3 pulli (de 8 à 12 jours) le 14 juin, 1 ad./2 juv. le 21 juillet puis 2 juv. seuls jusqu'au 12 août.

Chassemy : plusieurs gravières, 25 à 30 ad., 1 F./3 juv. le 7 mai.

Guignicourt : 2 ad. le 20 février, l'espèce a niché en 1979.

MISQ : 4 couples sur les 3 étangs

- étang 1 : 1 couple, 1 nid le 22 mai (détruit)
1 nid le 30 mai (détruit)
3ème nid, 3 juv. le 7 août

- étang 2 : 2 couples, 2 ad./2 juv. le 7 mai, 1 juv. en vie fin juillet
2 ad./1 juv. le 24 juin

- réserve : 1 couple, 2 ad./1 juv. le 13 juin

MSB : 1 couple cantonné le 2 mai.

Fort peu couverts, ces étangs doivent abriter une population importante, le biotope étant favorable.

Sery-les-Mézières : 1 F./1 nid/5 oeufs le 23 mars.

Saint-Nicolas-aux-Bois : 1 à 2 couples nicheurs.

Soissons : gravières à l'ouest, plusieurs ad. isolés et 1 ad./4 juv., 1 ad./3 juv., 2 ad./3 juv., 1 ad./2 juv. et 1 ad. au nid (date non précisée).

Tergnier et Vendeuil : signalé nicheur sur des ballastières.

Vermand : 4 couples nicheurs, encore 4 ind. le 30 octobre.

La prospection est toutefois toujours insuffisante, beaucoup de secteurs favorables étant peu ou pas prospectés :

- gravières de Venizel à Beaurieux : vallée de l'Aisne sauf à Chassemy,
- les marais dits de "Laon-Sissonne" (MSB) : la population doit être élevée (20 à 25 couples ?),
- vallée de l'Oise : gravières de La Fère, Tergnier, etc...,
- vallée de la Somme : étangs de Saint-Quentin à Ham,
- étangs du secteur d'Hirson.

Le bilan total des couples nicheurs devrait être plus élevé qu'il ne l'est actuellement. Une centaine de couples nicheurs pour l'Aisne est raisonnable.

En migration noté à ASL : 1 im. le 24 août, 15 le 14 septembre.

GREBE A COU NOIR Podiceps nigricollis

1 ind. en plumage d'hiver le 30 octobre à Boué (H. Dupuich).

GREBE CASTAGNEUX Podiceps ruficollis

Fort peu suivi durant la nidification.

ASL : 4 le 28 septembre, 1 le 16 novembre.

Boué : noté toute l'année, maxima de 6 en janvier et 9 en mars.

2 couples nicheurs d'avril à août, 1 ad./2 pulli le 14 juin, 3 juv. le 21 juillet, 1 ad./1 pullus le 6 août.

Puis 13 ind. le 21 juillet, 15 le 4 août, 16 le 12, 20 le 19, 12 le 27, 15 le 14 septembre, 15 le 5 octobre, 7 le 30.

On note 2 pics : un vers la mi-août (migration + jeunes

locaux) et un autre de mi-septembre à début octobre (migration).
Vermand : 1 F./4 oeufs le 8 avril.
Vierzy : 1 ind. en avril.
MSB : 2 ind. le 24 décembre.

GRAND CORMORAN Phalacrocorax carbo
8 ind. en migration le 8 avril à Vermand (S. Boutinot).

HERON CENDRE Ardea cinerea
Aucun indice sur une éventuelle nidification.
Boué : 1 ind. le 4 août, 4 le 6 et 2 le 12.
Saint-Quentin : régulier chaque mois, maxima de 3 le 3 juillet,
4 le 14 août et 4 en décembre.
Vermand : régulier.
Vallée de l'Oise entre Malzy et Englancourt : régulier toute
l'année, absent cependant du 9 mars au 15 juin.
Maximum par mois : 10 le 6 janvier, 6 le 9 mars, 1 le 15
juin, 2 le 26 août, 3 le 31 octobre, 7 le 9 novembre, 1
à 2 en décembre.
Noté le 12 janvier à Orainville, 1 le 23 mars à Margny et Plomion,
noté le 1er septembre à ASL, 1 le 24 décembre au MSB et 2 le 26
décembre à Craonne et 1 im. le 25 décembre à Condé-sur-Aisne.
On note uniquement des individus en hivernage et en dispersion
post-nuptiale.

HERON BIHOREAU Nycticorax nycticorax
1 ind. du 25 avril au 5 mai à Vermand (S. Boutinot).

BLONGIOS NAIN Ixobrychus minutus
Vermand : aucune donnée, niche-t-il toujours ?

GRAND BUTOR Botaurus stellaris
Chassemy : 1 chanteur le 7 mai à l'étang Romainville (B. Tailliez),
nicheur possible.
MISQ : 1 hivernant le 11 décembre (P. Pigeon)
Liesse : 1 chanteur le 4 septembre (P. Biet)
Vermand : aucune donnée.
Le bilan global est faible : absence de données ?
chute des effectifs ?

CYGNE TUBERCULE Cygnus olor
1 couple le 15 mai à Saint-Boétien, 1 ind. du 9 au 13 octobre
et du 9 au 10 décembre au MISQ.

OIE CENDREE Anser anser
Peu d'observations : 1 ind. le 21 février à Soissons, 1 ind. le
2 mars à Guignicourt et 1 ind. le 28 avril à ASL.

BERNACHE DU CANADA Branta canadensis
Pour montrer l'impact de l'introduction d'une espèce étrangère :
à Soissons, sur une ballastière, 2 ind. volants avec 2 ad.
éjointés ; les 2 volants proviennent du couple.

TADORNE DE BELON Tadorna tadorna
L'observation de mai sur les bassins de décantation d'ASL peut
laisser espérer une nidification prochaine.

ASL : 2 ad. le 15 mai, 3 ad. le 29 novembre et 2 le 25 décembre.
Boué : 1 M. 1 F. le 12 janvier, 1 F. le 13.

CANARD COLVERT Anas platyrhynchos

ASL : 3 couples le 16 mars, 5 M. le 28 avril, 1 F. le 14 septembre,
270 le 16 novembre, 35 le 29, 2 le 25 décembre.

Boué : environ 5 couples nicheurs plus ou moins sauvages.

Guignicourt : 70 (40 M.) le 12 janvier, 4 en février-mars.

ASL (Reneuil) : 9 pulli de 3 semaines le 28 avril.

Saint-Quentin : 20 à 25 couples dans la réserve (MISQ), 1ers
pulli début mai, derniers pulli le 6 juillet,
2 à 12 par couvée.

100 max. en septembre, 160 le 27 octobre, 200
le 10 décembre (d'après P. Pigeon).

MSB : aucune donnée, sûrement nicheur.

Vermand : nicheur sur les étangs.

Encore noté à Marle (2 le 11 mai), Pommiers (60 le 25 décembre)
et Condé-sur-Aisne (10 le 25 décembre).

Pour ASL (y compris Reneuil), P. Pigeon note le faible effectif
des couvées (maximum de 7 pulli par couvée) dont la plupart ne
volent pas avant le 20 juillet. Beaucoup de couvées tardives
sont détruites.

SARCELLE D'HIVER Anas crecca

ASL : 22 le 16 mars, 8 le 24 avril, 2 M. 1 F. le 15 mai, 15 le
25 août, 2 le 28 septembre, 45 le 16 novembre, 70 le 29.

Boué : 6 M. le 12 janvier, quelques-unes fin janvier.

Guignicourt : 2 le 20 février.

MSB : quelques couples y nichent toujours.

MISQ : 1 couple le 26 avril, pulli début juillet en amont de
la réserve (S. Boutinot)

1 couple du 1er mai au 3 juin dans la réserve (non
nicheur), 1 le 22 août, augmentation des effectifs
jusqu'en novembre, max. 80 en décembre (P. Pigeon).

ASL (Reneuil) : 60 le 29 novembre.

CANARD CHIPEAU Anas strepera

Peu observé : 1 M. 1 F. le 27 février à Orainville et 3 M. 3 F.
le 26 mars à Guignicourt.

CANARD SIFFLEUR Anas penelope

Peu observé : 2 M. 2 F. à Boué le 15 mars et 2 M. 3 F. à ASL
le 16.

CANARD PILET Anas acuta

ASL : 4 M. 2 F. le 16 mars, 1 M. le 28 septembre.

Guignicourt : 5 M. 3 F. le 20 février.

SARCELLE D'ETE Anas querquedula

1 couple le 9 mars au MISQ (en amont de la réserve), 1 M. le
29 avril à ASL, 1 M. le 15 mai à Bucy-le-Long, 3 le 26 août
à Marle.

CANARD SOUCHET Anas clypeata

ASL : 2 couples le 28 avril, 4 M. 2 F. le 29.

Boué : 1 M. le 22 mars, 1 M. le 1er mai, 3 ind. le 19 août.

Guignicourt : 1 couple le 26 mars, 2 M. 1 F. le 4 avril.
Vermand : 1 couple nicheur dès le 26 mars (S. Boutinot).
Liesse : passage le 4 septembre.

NETTE ROUSSE Netta rufina

1 F. le 14 septembre à ASL (P. Pigeon) et 1 M. sauvage avec un couple éjointé le 1er mai près de Soissons (B. Tailliez).

FULIGULE MILOUIN Aythya ferina

ASL : 1 M. 1 F. le 14 septembre, 3 M. 8 F. le 28, 60 le 16 novembre, 80 le 29.

Boué : 5 M. 1 F. le 9 mars, 6 M. 3 F. le 15, 21 M. 12 F. le 22, 1 M. le 10 mai, 5 M. 6 F. le 30 octobre, 3 M. le 10 novembre, 4 M. le 16, 9 le 30.

Guignicourt : 10 dont 6 M. le 9 février.

MISQ : 1 couple le 3 juillet, 1 M. le 16 juillet, 1 le 27 septembre, 4 M. 3 F. le 16 novembre, 4 M. 4 F. le 4 décembre, 3 M. 3 F. le 10, maximum de 12 M. 6 F. en décembre.

Saint-Nicolas-aux-Bois : 1 à 2 couples nicheurs.

Vallée de l'Aisne (gravières autour de Soissons) : 50 le 21 février à Soissons et 3 M. le 1er mai, 1 M. le 7 mai à Chassemy (nidification possible), 400 le 25 décembre à Pommiers.

Vermand : nicheur certain, il y avait 50 couples en 1978 (S. Boutinot).

FULIGULE MORILLON Aythya fuligula

Noté seulement en migration.

1 couple le 9 février à Guignicourt, 1 F. du 2 au 5 juin à Saint-Quentin, 3 F. le 10 novembre à Boué et 30 le 16 à ASL.

FULIGULE MILOUINAN Aythya marila

1 F. du 16 au 29 novembre à ASL (P. Pigeon).

GARROT A OEIL D'OR Bucephala clangula

1 M. le 27 février à Guignicourt.

HARLE PIETTE Mergus albellus

1 couple du 20 février au 8 mars à Guignicourt (P. Ducrot).

PERDRIX GRISE Perdix perdix

Quelques ind. notés sur les champs en mars et décembre.

Juvin-court : min. 7 couples sur 3,5 km² d'un vieil aérodrome le 11 mai.

CAILLE DES BLES Coturnix coturnix

Fort peu de données : 2 chanteurs le 11 mai à Hary.

On note une régression de l'espèce (pesticides).

FAISAN DE COLCHIDE Phasianus colchicus

Forêt du Nouvion : nicheur plus ou moins sauvage.

Signalé un peu partout en bois et forêts.

GRUE CENDREE Grus grus

55 à Orainville le 19 mars, 150 en vol vers le NE le 23 mars à Cuiry-les-Iviers et 1 le 26 mars à Guignicourt indiquent bien la remontée de printemps et que la partie est du département constitue la bordure W du canal migratoire (P. Ducrot, S. Lefèvre, P. Triplet et I. Veriere).

1 précoce du 20 au 26 août à Malzy dans une prairie humide
près de l'Oise avec des Hérons cendrés (H. Dupuich).
4 le 3 décembre en vol vers le SW à ASL (P. Pigeon).

RALE D'EAU Rallus aquaticus

Boué : min. 1 chanteur en mai et juin, 1 à 2 couples nicheurs.

MSB : 1 chanteur répond à la repasse le 11 mai, plusieurs
couples doivent se reproduire dans tout le marais.

Noté aussi en hivernage.

MISQ : 10 à 20 couples, 1 ad./3 pulli de 10 jours le 19 mai.
Hivernant.

Orainville (rappel) : 1 ind. le 27 octobre 1979.

Vermand : nicheur, S. Boutinot donne dans sa thèse une densité
de 4 couples/10 ha en 1979.

MARQUETTE PONCTUEE Porzana porzana

1 ind. en migration le 27 août à Boué (H. Dupuich).

POULE D'EAU Gallinula chloropus

Quelques données sur la nidification.

Boué : min. 10 couples, 1 ad./6 pulli le 10 mai et 1 ad./6
pulli le 15, 70 le 4 août et 80 le 19 (ad. et juv.).

Bucy-le-Long : 1 ad./6 pulli le 15 mai, 1 nid/7 oeufs, 1 nid
/5 oeufs/ 2 juv. le 10 juin.

MISQ : environ 25 couples, 2 à 4 juv. par couvée, 50 ind. en
décembre.

Vermand : 1 F./10 oeufs le 18 avril, 1 F./7 oeufs le 3 juin.

Signalée en période de reproduction également à Leschelles,
Englancourt et Saint-Boétien.

FOULQUE MACROULE Fulica atra

Des données sur la reproduction et la migration.

ASL : 3 le 16 mars, 35 le 24 août, 44 le 16 septembre, 50
le 28 et 10 le 16 novembre.

Boué : période prénuptiale, maximum par mois

62 le 12 janvier, 45 le 19 février, 54 le 15 mars.
nidification

40 ad. les 27 avril et 1er mai, 30 ad. le 24 mai,
50 ad. et juv. le 14 juin.

quelques données sur les nichées

1 ad./1 nid le 27 avril puis 7 oeufs le 1er mai
qui donnent 1 ad./7 pulli le 10 mai.

1 ad./1 nid/7 oeufs le 1er mai qui donnent 2 ad.
/7 pulli le 24 mai.

2 autres Ad./7 pulli, 1 ad./4 pulli, 1 pullus
seul le 24 mai.

1 ad./4 pulli et 1 ad./3 pulli le 14 juin.

environ 20 couples nicheurs.

période postnuptiale

90 le 2 juillet

110 ad. et juv. le 4, 140 le 12, 120 le 21 août

100 le 14 septembre

100 le 5 octobre, 180 le 30

85 le 10 novembre, 110 le 30

180 le 24 décembre

On note 2 passages migratoires : 1 le 30 octobre
et 1 le 24 décembre.

MISQ : 35 couples, 1 à 4 pulli/nid et 150 ind. début septembre,
80 fin novembre et 120 le 12 décembre.

Vermand : 1 F./5 oeufs le 2 avril.

Noté en période de reproduction à Englancourt et Saint-Boétien
et en décembre à Soissons et Pommiers.

HUITRIER-PIE Haematopus ostralegus

1 ind. en migration le 29 septembre à ASL (P. Pigeon).

VANNEAU HUPPE Vanellus vanellus

Des bandes sont notées jusque fin mars.

Nidification

ASL : 2 ind. avec comportement nicheur le 10 juin

Le Nouvion-en-Thiérache : 2 ad. (alarme)/1 juv. les 24 et
25 mai.

Premières bandes le 14 juin à Boué : 20 ind. puis de 50 à 100
le 15 juin entre Malzy et Sorbais (vallée de l'Oise).

ASL : 15 le 14 juillet, 200 le 24 août, encore 2 le 16 novembre.

PLUVIER ARGENTE Pluvialis squatarola

ASL : 1 ind. le 25 mai (P. Pigeon).

GRAND GRAVELOT Charadrius hiaticula

ASL : 1 ad. le 15 mai, 9 ind. le 25, 2 le 14 septembre.

PETIT GRAVELOT Charadrius dubius

ASL : 8 le 28 avril, 5 le 15 mai, 8 le 25, 1 nid/4 oeufs le
6 juin, 1 nid le 14 juillet (détruit ensuite) et 13
ind. le 24 août.

D'après P. Pigeon, aucune couvée n'est arrivée à terme.

Bucy-le-Long : 8 le 15 mai, 1 le 10 juin (nicheur possible).

Chassemy : 1 le 7 mai.

Marle : 2 ad./1 nid le 11 mai.

BECASSINE DES MARAIS Gallinago gallinago

ASL : 15 le 14 septembre, 35 le 28, 30 le 16 novembre et 1
le 29.

Marle : 2 le 26 août, 110 le 31 octobre.

MISQ : 1 le 2 octobre et le 25 novembre.

Enfin 1 à Boué le 27 août.

BECASSE DES BOIS Scolopax rusticola

Queue de Boué/Boué : 2 levées le 22 mars (nicheuses possibles).

Bois des Couleuvres/Pontavert : 1 croûle le 18 juin.

1 le 2 août à Saint-Nicolas-aux-Bois, 1 début novembre au
MISQ et le 7 décembre en forêt de Saint-Gobain.

L'écoute du chant permettrait de clarifier le statut de cette
espèce.

COURLIS CENDRE Numenius arquata

1 ind. en vol vers l'W à Malzy le 3 juillet.

BARGE A QUEUE NOIRE Limosa limosa

Seulement à ASL : 4 le 25 mai, 1 le 8 juillet, 1 le 14.

CHEVALIER ARLEQUIN Tringa erythropus

ASL : 1 le 28 avril, 8 le 29, 6 le 4 mai.

Marle : 5 le 26 août.

CHEVALIER GAMBETTE Tringa totanus

ASL : 11 le 28 avril, 50 le 29, 19 le 19 mai, 4 le 25, 25 le 14 juillet, 3 le 24 août, 9 le 14 septembre, 1 le 16 novembre.

Boué : 1 ind. le 22 mars, 1 le 28 avril, 1 le 1er mai, 1 le 27 août.

Encore 1 le 11 mai à Marle et 1 le 24 juillet à Chigny.

CHEVALIER ABOYEUR Tringa nebularia

ASL : 5 le 28 avril, 22 le 29, 5 le 25 mai, 12 le 14 juillet, 16 le 14 septembre.

Boué : 4 le 27 août, 1 le 29 août.

Encore 3 le 7 mai à Chassemy et 16 le 26 août à Marle.

CHEVALIER CULBLANC Tringa ochropus

ASL : 1 le 16 mars, 2 le 29 avril, 1 le 6 juin, 2 le 8 juillet, 6 le 16 novembre, 2 le 29.

Boué : 1 le 14 juin, 1 le 19 août.

Encore 1 le 22 mars à Corneaux et 2 le 26 août à Marle.

CHEVALIER SYLVAIN Tringa glareola

ASL : 7 le 6 juillet, 10 le 14, 2 le 24 août, 2 le 14 septembre.

CHEVALIER GUIGNETTE Tringa hypoleucos

ASL : 6 le 29 avril, 12 le 4 mai, 4 le 15, 5 le 6 juillet, 15 le 14, 4 le 24 août, 49 le 14 septembre, 8 le 28.

Boué : 1 le 27 avril, 1 le 4 août, 1 le 6, min. 12 le 27.

Marle : 10 le 11 mai, 20 le 26 août.

MISQ : passage prénuptial jusqu'au 27 mai, passage postnuptial du 8 juillet au 25 novembre (max. 3).

Soissons : 1 le 1er mai et min. 13 de Soissons à Voilly le 13 mai le long de l'Aisne.

BECASSEAU MINUTE Calidris minuta

ASL : 3 le 25 mai (P. Pigeon).

BECASSEAU VARIABLE Calidris alpina

ASL : 4 le 4 mai, 2 le 15, 6 le 25.

1 écrasé à Marcy le 23 mars.

BECASSEAU COCORLI Calidris ferruginea

2 dont 1 en plumage nuptial le 26 août à Marle (H. Dupuich).

COMBATTANT Philomachus pugnax

ASL : 12 M. 25 F. le 29 avril, 2 M. 10 F. le 4 mai, 5 le 25, 12 le 14 juillet, 16 le 14 septembre.

AVOCETTE Recurvirostra avosetta

1 le 28 avril à ASL (P. Pigeon).

MOUETTE RIEUSE Larus ridibundus

Elle est notée en erratisme et hivernage dans maintes localités.

ASL : 4 le 28 avril, 8 le 29, 25 le 4 mai, 100 le 9 juin, 50 le 6 juillet, 10 le 14, 5 le 24 août.

Boué : 81 le 26 janvier, 1 le 27 août, 2 le 29, 5 le 10 novembre.

Chigny : 15 dont 3 juv. le 24 juillet.

Plomion : 40 en vol vers l'W le 23 mars.

MISQ : de février à mai puis d'octobre à décembre (maximum de 30 individus).

Soissons : hivernage le long de l'Aisne, dortoir proche ?
La nidification est constatée en trois localités.

Bucy-le-Long : 200 ad., 1 nid/3 oeufs, 1 nid/2 oeufs le 15 mai.

80 ad. en vol, 1 ad. mort, 12 pontes : 2 de 4 oeufs, 6 de 3, 3 de 2, 1 de 1 oeuf ; 7 pulli morts, 26 vivants hors des nids le 10 juin.
Estimation : minimum 30 couples nicheurs (relevés effectués par B. Tailliez).

La mention de 205 nids publiée dans Le Passer 1981 n°18 semble très curieuse.

Vermand : colonie de 90 nids (S. Boutinot), hivernage régulier.

Vierzy : 1 petite colonie qui existait déjà en 1979 (A. Tombal).

MOUETTE PYGMÉE Larus minutus

1 juv. le 8 juin à Bucy-le-Long.

GUIFETTE NOIRE Chlidonias niger

Notée au passage prénuptial.

ASL : 14 le 29 avril, 2 le 4 mai.

Boué : 1 le 24 mai, 2 le 25.

Bucy-le-Long : 1 le 15 mai.

GOELAND CENDRE Larus canus

MISQ : 1 im. le 20 mai (1ère mention dans les synthèses de l'Aisne), 1 im. le 12 décembre).

PIGEON COLOMBIN Columba oenas

3 le 18 mai en FSG.

4 à Saint-Boétien le 24 décembre et 6 sur la carte I.G.N. de Craonne le 26.

PIGEON RAMIER Columba palumbus

Nicheur bien répandu (dès mars) en FNT.

1er chant le 7 février à Margival.

Laonnois : gros hivernage en décembre notamment à Chivres avec plusieurs milliers le 24.

Soissonnais : grosses bandes en décembre.

TOURTERELLE DES BOIS Streptopelia turtur

1ères le 1er mai à Saint-Boétien.

En mai à Boué, Le Nouvion-en-Thiérache, Chassemy...

FNT : nicheuse assez commune.

MISQ : 5 à 8 couples nicheurs, espèce notée jusque fin septembre.

ASL (Reneuil) : 2 juv. de 12 jours le 24 août.

TOURTERELLE TURQUE Streptopelia decaocto

Elle est commune comme nicheuse partout. Elle pénètre de plus en plus en forêt.

COUCOU GRIS Cuculus canorus

1ers : 2 le 15 avril en FCB.

Noté ensuite en avril et mai à Presles, Vermand, Boué; ASL

(Reneuil), Missy-les-Pierrepont, Verneuil, Passuicourt, Agnicourt-Séchelles.

2 ind. parquent le 11 mai à Priscoes.
MISO : 3 à 4 couples nicheurs, le dernier ind. est noté fin août.

HIBOU MOYEN-DUC Asio otus

1 ind. trouvé écrasé le 23 mars à Marcy.
Taillefontaine : 1 couple nicheur en mai (A. et G. Tombal).
MISO : 5 à 10 ind. au dortoir en décembre.

HIBOU PETIT-DUC Otus scops

Donnée très intéressante : 2 à 3 M. chanteurs au printemps à Mont-Bonny/Mont-Notre-Dame. Cela faisait quelques années que l'espèce n'avait pas été notée dans l'Aisne (information C. Riols). Boutinot la donne comme absente du Vermandois depuis 1959 et Yeatman ne donne qu'un indice de nidification possible pour le secteur de Château-Thierry entre 1970 et 1975.

A noter aussi que l'espèce a été entendue en juin près de la forêt d'Ermenonville (Oise), à peine plus au sud.

CHOUETTE CHEVECHE Athene noctua

Peu observée en Thiérache où elle niche : 1 ind. le 7 avril à la Rue Charles. Un recensement serait utile pour connaître la densité de cette espèce.

CHOUETTE HULOTTE Strix aluco

Quelques données sur la nidification et les chanteurs.

FCB : 2 ind. le 23 janvier, 1 nid/2 oeufs le 26 mars, 3 oeufs le 30, le nid est à 1,80 m du sol. La couvée est détruite par la suite (E. Novak).

FNT : nicheuse, chante en janvier.

FSG : 13 chanteurs entendus dans la nuit du 23 au 24 janvier, 1 nid/2 oeufs le 27 mars, notée en décembre.

MISO : 1 ind. chante à partir du 8 septembre, 3 im. en septembre, entendue en novembre et décembre.

Soissonnais : 3 chanteurs le 9 janvier à Nanteuil-la-Fosse
1 chanteur le 25 janvier à Soissons puis 1 le 4 mai
2 chanteurs minimum les 19 et 20 mars à Presles et Boves puis 1 le 4 juin.

CHOUETTE EFFRAIE Tyto alba

Fort peu observée, un recensement dans les clochers et vieux bâtiments nous renseignerait fort.

ENGOULEVENT D'EUROPE Caprimulgus europaeus

Forêt de Retz/Cabaret : 1er chanteur le 28 mai, 2 chanteurs en 800 m en juin. Ne chante pas avant 22 h (A. et P. Tombal).

Il serait à rechercher en FSG, dans le camp de Sissonne, etc...

MARTINET NOIR Apus apus

1er le 27 avril à Boué puis 10 le 1er mai.

Noté ensuite à Soissons le 28 avril, à ASL le 29.

MISO : 200 à 300 en juillet quand il pleut ; le dernier est noté le 22 août.

MARTIN-PECHEUR Alcedo atthis

Boué : 2 peradent le 23 mars, noté en août.

MISQ : 1 à 2 de fin août à novembre.

C'est bien faible pour ce bel oiseau.

GUERIER D'EUROPE Merops apiaster

Une colonie existe dans l'Aisne dans le Laonnois depuis 1977.

Par précaution nous ne citons pas la localité : l'espèce a occupé un secteur début juin puis un couple a été retrouvé dans une sablière un peu plus loin. Le 31 juillet, 1 couple nourrit et 3 ind. volants non nicheurs. 1 seul couple a donc niché sur tous les individus observés (P. Pigeon).

L'espèce avait déjà niché sporadiquement de 1968 à 1973 près de Soissons. Elle y est peut-être revenue.

HUPPE FASCIEE Upupa epops

ASL : 1 ind. le 4 mai.

Marchais : 1 nid/3 pulli au printemps (P. Pigeon).

Mont-Notre-Dame : notée au Mont-Bonny en mai.

Elle n'est plus observée en Thiérache. Elle semble en régression sur sa bordure nord-ouest.

PIC VERT Picus viridis

Bien observé, surtout des chanteurs au printemps et des hivernants.

FCB : 1 le 23 janvier, 1 couple le 26 mars, 1 le 6 décembre.

FSG : noté en décembre.

MISQ : 1 couple nicheur sédentaire.

Soissonnais : 1 les 3 janvier et 17 mars à Pommiers
noté en mars à Vauregis et en décembre à Condé-sur-Aisne.

Thiérache : noté en mars-avril, surtout des chanteurs à Autreppes, Boué, Malzy, La Rue Charles, Renneval, en forêt du Regneval, de la Haye d'Aubenton et en FNT.
1 parade le 27 avril à Autreppes.

PIC NOIR Dryocopus martius

FSG : 1 M. le 18 mai, contacté plusieurs fois ensuite. Nicheur quasi-certain d'après P. Pigeon.

Marchais : 1 M. crie le 31 juillet. Il nicherait d'après le garde.

Il serait à rechercher en forêt d'Hirson et en forêt de Retz où il a déjà niché (nombre de couples ?).

PIC GREICHE Dendrocopos major

Quelques données éparses.

FNT : 1 ind. en mars-avril (tambourine).

FCB : 1 ind. le 1er janvier, 1 ind. dans un Chêne le 1er avril,
1 couple (parades) le 10 mai, 1 autre couple (parades) le 16.

MISQ : 2 couples nicheurs sédentaires.

Thiérache : des tambourineurs en mars-avril à Autreppes, Guiry-les-Iviers et La Rue Charles.

FSG : hivernants en décembre.

PIC GREICHETTE Dendrocopos minor

MISQ : 1 M. tambourine à Rouvroy le 9 mars, 1 couple probable sédentaire.

FSG : en décembre.

COCHEVIS HUPPE Galerida cristata

Soissons : noté de janvier à avril, chanteurs en mai.

Prisces : noté en mai.

L'espèce doit être plus répandue qu'il n'y paraît.

ALQUETTE DES CHAMPS Alauda arvensis

Présente dans les champs.

Juvincourt : 20 couples sur 5 km² le 2 mai soit 0,4 couple/10 ha pour ce secteur du sud du Laonnois.

S. Boutinot donne une densité de 0,5 couple/10 ha pour le Vermandois.

Noté en migration en bocage : 1 le 23 février à Chigny et 1 le 24 mai à Malzy.

HIRONDELLE DE CHEMINEE Hirundo rustica

1ères le 3 avril à Soissons.

Dernières le 13 octobre à Saint-Quentin.

HIRONDELLE DE FENETRE Delichon urbica

1ères le 10 avril à Folembay.

Dernières : 30 le 14 octobre à Saint-Quentin.

HIRONDELLE DE RIVAGE Riparia riparia

Aucune donnée sur les colonies existant les années précédentes.

Nomanpteuil : 1 colonie.

Dernières : 60 le 13 octobre à Saint-Quentin.

PIPIT DES ARBRES Anthus trivialis

1er chant le 16 avril à Presles.

Noté un peu partout.

PIPIT FARLOUSE Anthus pratensis

Noté comme hivernant en FCB (janvier), à Condé-sur-Aisne (décembre).

Nicheur possible à Juvincourt, Prisces...

BERGERONNETTE PRINTANIERE Motacilla flava

ASL : 10 le 28 avril.

1 le 4 avril à Guignicourt.

Noté en mai à Juvincourt, Ponsericourt.

1 flavissima à Marle le 26 août.

BERGERONNETTE DES RUISSEAUX Motacilla cinerea

En mars à Renneval.

Mondrepuis : 2 juv. fin juin.

Saint-Quentin : 2 en décembre.

BERGERONNETTE GRISE Motacilla alba

Notée à Dagny et Iviers en mars ainsi qu'à Condé-sur-Aisne le 25 décembre.

Boué : notée en avril-mai puis des juv. observés ensuite.

MISQ : 2 couples nicheurs, espèce notée jusqu'en novembre.

Vermand : 1 nid/6 oeufs le 3 juin.

PIE-GRIECHE ECORCHEUR Lanius collurio

On note le retour de cette espèce dans le nord de l'Aisne.

Englancourt : 1 M. bien cantonné le 24 juillet (H. Dupuich), pas revu par la suite mais nicheur possible.

FCB : 1 couple le 17 mai, 1 M. chante le 29, 2 ad./2 juv. à
l'envol le 20 juillet (E. Novak)
FSG : 1 ind. le 18 mai (P. Pigeon)

PIE-GRIECHE GRISE *Lanius excubitor*

Peu de données pour cette espèce.

Dagny : 2 individus distants de 50 m dont 1 alarme le 23 mars.

Guignicourt : 1 le 2 mars.

Plomion : 1 le 23 mars.

MSB : 3 le 24 décembre.

Sissonne : 1 le 25 août dans une pâture près d'une peupleraie,
peut-être un nicheur local ?

Une recherche de l'espèce en Thiérache pourrait apporter
quelques renseignements.

LORIOT D'EUROPE *Oriolus oriolus*

Les premiers début mai : 1 chanteur en FCB le 5, puis 2 couples
avec M. chanteurs le 7 à Chassemy, 1 le 10 mai à Bois et 3
le 11 en Forêt de Marfontaine.

Bois du Hauty (orée est) : 4 chanteurs du 27 juin à début
juillet (camp G.O.N.).

MISQ : 4 à 6 couples.

ETOURNEAU SANSONNET *Sturnus vulgaris*

De grosses bandes en hivernage. Dortoir en décembre au marais
Saint-Boétien.

Vernand : 1 nid/1 oeuf puis 6 le 12 avril.

Nicheur courant.

CINCLE PLONGEUR *Cinclus cinclus*

Noté au printemps au Pas Bayard/Hirson sur l'Oise. Un recensement
le long de l'Oise et des ruisseaux affluents en Forêt de Saint-
Michel renseignerait sur le statut de cet oiseau.

TROGLODYTE *Troglodytes troglodytes*

1ers chants le 20 février en FNT.

ACCENTEUR MOUCHET *Prunella modularis*

Aucune donnée intéressante.

TRAQUET MOTTEUX *Oenanthe oenanthe*

1 le 11 mai dans le secteur de Ponséricourt.

TRAQUET TARIER *Saxicola rubetra*

Noté en migration.

5 le 4 mai à ASL, plusieurs le 26 août à Mâhecourt dans les
champs.

Aucune donnée de nidification.

TRAQUET PATRE *Saxicola torquata*

Noté en mars à Saint-Clément, 1 M. le 18 mai en FSG.

Peu de données par ailleurs.

ROUGEQUEUE NOIR *Phoenicurus ochruros*

Hivernage : 1 M. fin janvier à Dagny-Lambercies.

Noté en mars : 1 M. à Brunehamel, 1 F. à Cuiry-les-Iviers et
1 M. à Le Hocquet.

Soissons : 1 chanteur le 28 mars.
Englancourt : 1 le 26 août.
Boué : 1 le 27 août.

ROUGEQUEUE A FRONT BLANC Phoenicurus phoenicurus

Beaucoup de M. cantonnés en mai et juin. On note une augmentation du nombre des données.

Bosmont : 1 M. le 11 mai.

Boué : 1 M. le 1er mai.

Chassemy : 1 M. chanteur le 13 mai.

Pommiers : 1 M. chanteur le 25 avril.

Soissonnais : 1 M. cantonné le 8 avril et en mai dans le quartier Gouraud, 1 M. chanteur le 29 avril au Bois de Bresles.

ROUGEGORGE Erithacus rubecula

Nicheur courant.

Vermand : 1 nid/pulli de 3 à 4 jours le 6 mai.

ROSSIGNOL PHILOMELE Luscinia megarhynchos

1ers le 15 avril en FCB.

Noté en avril à Margival, Vermand, ASL et en mai à Boué, Verneuil, Ponséricourt et au Nouvion-en-Thiérache.

MISQ : 20 à 30 couples nicheurs.

GRIVE LITORNE Turdus pilaris

Notée en hivernage jusque fin mars en Thiérache.

Etang du Pas-Bayard/Hirson : min. 2 couples, transport de nourriture (Le Héron 1980 n°4, p. 31 à 41).

Le Moulin-Lointain/Le Nouvion-en-Thiérache : 1 ad. le 1er mai, pas noté en juin (absence d'observateurs), 1 ad. le 29 juillet au même endroit (H. Dupuich) ; nicheuse probable.

La Folie/Boué : 1 ad. seul le 10 mai, pas revu par la suite. Toutes ces observations confirment l'installation de l'espèce en Thiérache. Le biotope est bien typé : bordures d'étangs avec haies ou bois proches.

Cette arrivée de l'espèce dépend du même noyau de Grives litorne que l'Avesnois tout proche.

Cette progression sera à surveiller en 1981.

MERLE NOIR Turdus merula

Nicheur courant et précoce.

Vermand : couvée la 1ère quinzaine de mars, 1 nid/4 oeufs le 25 mars, pulli le 1er avril.

Reueuil/ASL : 1 nid/4 oeufs le 28 avril.

GRIVE MAUVIS Turdus iliacus

Hivernage jusque fin mars et à partir de novembre en Thiérache et au MSB.

GRIVE MUSICIENNE Turdus philomelos

Bien notée en hivernage en Thiérache.

Vermand : 1 nid/3 oeufs le 30 mars (S. Boutinot).

FCB : 4 nids en avril puis 10 nids, aucun ne résiste aux prédateurs.

MISQ : 3 à 5 couples nicheurs.

GRIVE DRAINE Turdus viscivorus

Notée en mai à Bosmont.

Vermand : envol de jeunes le 18 avril.

MISQ : 2 couples nicheurs.

Notée en hivernage.

BOUSCARLE DE CETTI Cettia cetti

Quelques chanteurs sont notés.

Boué : 1 chanteur en mars, 2 le 27 avril, 3 en mai puis 2 fin mai. 2 à 3 couples probables. L'espèce n'a pas disparu après le coup de froid de janvier 1979.

Chassemy : 1 chanteur le 7 mai.

MISQ : 2 à 3 couples nicheurs.

Reneuil/ASL : 1 chanteur le 28 avril, retour depuis l'hiver 1978-79.

Saint-Boétien : 2 chanteurs en mai.

On note un léger retour de l'espèce après le dur hiver 1978-79.

LOCUSTELLE LUSCINIOIDE Locustella luscinioides

Quelques chanteurs entendus.

MISQ : 1 chanteur, 1 couple nicheur ?

Reneuil/ASL : 1 le 28 avril.

Verneuil : 2 le 3 mai.

LOCUSTELLE TACHETEE Locustella naevia

Saint-Boétien : 2 chanteurs le 2 mai.

Boué : 1 chanteur le 10 mai.

PHRAGMITE DES JONCS Acrocephalus schoenobaenus

Boué : 1er chanteur le 27 avril, 1 parade le 1er mai, noté jusque fin août, min. 4 couples nicheurs.

MISQ : nicheur commun.

Reneuil/ASL : 1ers le 28 avril.

Verneuil : chanteurs en mai.

ROUSSEROLLE VERDEROLLE Acrocephalus palustris

MISQ : 2 couples nicheurs.

Happencourt et Artemps : 2 couples le 5 mai.

ROUSSEROLLE EFFARVATTE Acrocephalus scirpaceus

Boué : 1ers chants le 1er mai, nombreux couples nicheurs.

MISQ : retour le 24 mai.

Reneuil/ASL : notée le 4 mai.

Aucune donnée par ailleurs.

ROUSSEROLLE TURDOIDE Acrocephalus arundinaceus

Vermand : nicheuse en 1979 et 1980.

Aucune donnée par ailleurs.

HYPOLAIS ICTERINE Hippolais icterina

1 chanteur le 15 juin en forêt du Nouvion-en-Thiérache. Cette observation semble marquer la limite sud de l'espèce en Avesnois et Thiérache. Elle se situe plus au sud que les Hypolais icterines signalées par J.C. Tombal dans Le Héron.

L'espèce a toujours été présente en forêt du Nouvion.

HYPOLAIS POLYGLOTTE Hippolais polyglotta

1 M. chanteur en juin-juillet au Bois de Hauty (J.C. Tombal).
1 chanteur le 11 mai à Bosmont (C. Delahoche).

CISTICOLE DES JONCS Cisticola juncidis

1 chanteur le 24 août à Bucy-le-Long (G. Baudoin).

FAUVETTE DES JARDINS Sylvia borin

Observée assez couramment en forêts, bocages et parcs.
1ères le 1er avril en FCB.

FAUVETTE A TETE NOIRE Sylvia atricapilla

Notée en mars à Boué. Nicheuse commune.

FAUVETTE GRISETTE Sylvia communis

1ères (dont 1 chanteur) le 25 avril à Soissons.
Nombreuses en mai dans les biotopes favorables.

FAUVETTE BABILLARDE Sylvia curruca

1ères le 29 avril à Vermand.
Notée ensuite à Priscès, Chassemy (mai).
MISQ : 1 chanteur du 1er au 25 juin, ensuite plus rien...

POUILLOT FITIS Phylloscopus trochilus

1ers le 3 avril à Soissons.
Noté ensuite à Boué.
FNT : 1 ad./5 juv. le 15 juin.

POUILLOT VELOCE Phylloscopus collybita

Retour le 16 février au Nouvion-en-Thiérache.
Noté le 27 février à Guignicourt puis près de Soissons et à Vermand en mars. Courant dès avril.
Vermand : pulli le 3 juin, envol le 18.

POUILLOT SIFFLEUR Phylloscopus sibilatrix

Marfontaine : 2 le 11 mai.
Bois Morin/Chassemy : 2 chanteurs le 5 juin.

ROITELET HUPPE Regulus regulus

Hivernant commun.
Marle : le 27 août en forêt.

ROITELET TRIPLE-BANDEAU Regulus ignicapillus

Bois du Hauty/Mondrepuis : 2 chanteurs en juin-juillet, c'est un site éventuel de nidification.

GOBEMOUCHE NOIR Ficedula hypoleuca

1er(migrateur) le 4 mai à Reneuil/ASL.
Aucune donnée de nidification.

GOBEMOUCHE GRIS Muscicapa striata

1er le 4 mai à Reneuil/ASL.

MESANGE NONNETTE Parus palustris

Notée en divers lieux. Peu de données intéressantes.

MESANGE BOREALE Parus atricapillus

Peu de données sur l'espèce.

MESANGE HUPPEE Parus cristatus

FCB : notée en hivernage, abondante en avril et mai.
Pommiers : notée en avril.

MESANGE BLEUE Parus caeruleus

FCB : nicheuse (nid découvert).
Espèce commune.

MESANGE NOIRE Parus ater

Surtout notée en hivernage : plusieurs ind. en FCB en janvier.
1 ind. le 9 mars à Saint-Quentin.

MESANGE CHARBONNIERE Parus major

Courante. 1 oeuf le 16 avril à Vermand.

MESANGE A LONGUE QUEUE Aegithalos caudatus

FCB : en janvier et avril-mai (max. de 10 ind.).

FNT : 2 ad./5 juv. le 22 juillet.

Vermand : 1 nid le 25 mars.

Notée en mars à Ringeot, Saint-Clément, Plomion et en décembre au MSB.

SITTELLE TORCHEPOT Sitta europaea

Des chanteurs signalés en FCB, en forêt de Marfontaine, à Margival, Nanteuil-la-Fosse, Presles, Boves et Soissons.

Rouvroy/Saint-Quentin : 1 nid à 1,5 m de haut, entrée rétrécie,
envol des juv. le 3 juin (S. Boutinot).

GRIMPEREAU DES JARDINS Certhia brachydactyla

FCB : en janvier.

MISQ : 1 à 2 couples.

Des chanteurs sont signalés à Presles et Boves (mars), Saint-Clément, Soissons (février) et en forêt de Marfontaine.

BRUANT PROYER Emberiza calandra

Assez bien répandu dans les régions agricoles comme à Saint-Clément, Priscoes...

Juvincoirt : cantons notés le 1er mai.

ASL : 2 couples le 28 avril.

BRUANT JAUNE Emberiza citrinella

Noté en période de nidification à ASL, Autreppes, Boué, Dagny (2 M.), Margeval, Malzy, Le Nouvion-en-Thiérache, Priscoes, Renneval.

A noter, 1 ind. avec une tête blanche et le reste jaune le 4 août à Boué.

BRUANT ZIZI Emberiza cirius

Aucune donnée. L'espèce doit pourtant nicher dans le sud de l'Aisne.

BRUANT DES ROSEAUX Emberiza schoeniclus

Observé en mars à Dagny et Boué.

Boué : quelques couples nicheurs.

FCB : 5 M. 1 F. le 26 mai dans une clairière en milieu sec.

Juvincoirt : 1 le 2 mai en milieu cultivé.

MISQ : 1 couple nourrit le 4 juin.

Ponséricourt : 1 canton en milieu cultivé le 11 mai.

PINSON DES ARBRES Fringilla coelebs

Bien répandu en hivernage et en nidification dans les lieux propices.

PINSON DU NORD Fringilla montifringilla

Quelques bandes : 100 le 15 mars à Dagny, 300 le 23 mars à Cuiry, 8 à Ringeot, 30 à Saint-Clément.

FCB : 1 M. tardif le 26 mai (E. Novak).

VERDIER D'EUROPE Carduelis chloris

Noté en février, avril et mai en Thiérache et en FCB.

Vermand : 1 nid, 1 nid/3 pulli le 6 avril.

CHARDONNERET Carduelis carduelis

Noté en janvier à Saint-Simon, en mars à Carneaux.

Individus cantonnés en mai à Boué, Priscès, Ponséricourt et en FCB.

TARIN DES AULNES Carduelis spinus

Derniers le 7 avril à Brunehamel : 15 ind.

Bande en hivernage : 60 le 24 décembre au MSB.

LINOTTE MELODIEUSE Carduelis cannabina

Notée régulièrement tous les mois.

SIZERIN FLAMME Carduelis flammea

6 ind. en hivernage le 24 décembre au MSB (L. Kérautret).

SERIN CINI Carduelis serinus

1 M. chanteur le 23 mars à Vermand, 1 M. chanteur le 3 avril à Soissons.

2 ind. le 24 décembre dans le secteur 4 carte IGN 1/50 000e de Craonne.

BEC-CROISE DES SAPINS Loxia curvirostra

FCB : 1 M. le 1er avril, 1 M. 1 F. le 28 mai (E. Novak).

Il semble que l'espèce soit observée actuellement en forêt de plaine (Somme, Marne).

BOUVREUIL PIVOINE Pyrrhula pyrrhula

Bien noté en janvier en FCB.

Noté en mai à Boué, Priscès, Ponséricourt.

MOINEAU DOMESTIQUE Passer domesticus

Rien à signaler.

MOINEAU FRIQUET Passer montanus

Noté en mai à Boué, Ponséricourt...

GEAI DES CHENES Garrulus glandarius

Noté en hivernage dans les massifs forestiers. Nicheur commun.

PIE BAVARDE Pica pica

Nicheuse commune.

MISQ : 3 juv. peu volants le 13 mai.

CHOUCAS DES TOURS Corvus monedula

MISQ : 2 à 3 nids.

Le Nouvion-en-Thiérache : 1 colonie.

CORBEAU FREUX Corvus frugilegus

Quelques colonies

Cuiry-les-Iviers : 100 à 150 nids

Athies-sous-Laon : 30 nids

Dagny : 15 nids

MISQ : 21 nids

Verneuil : 5 nids

CORNEILLE NOIRE Corvus corone

- type C. c. corone

400 le 23 mars à Cuiry-les-Iviers
commune en Thiérache

MISQ : 2 à 3 couples

- mantelée C. c. cornix

1 avec des Corbeaux freux le 25 décembre à Pernant (J.C.
et C. Tombal).

Corneille mantelée

