

## L'AVOCETTE Recurvirostra avosetta DANS LA SOMME

par F. SUEUR

L'Avocette est un oiseau de la famille des Recurvirostridés appartenant au groupe des Limicoles (petits Echassiers se nourrissant dans la vase) dont la taille est d'environ 42cm et l'envergure de 75cm. Cet oiseau blanc, avec le dessus de la tête et la nuque noirs ainsi que l'extrémité des ailes, une barre alaire et deux bandes sur le dos, est tout de suite reconnaissable à ses grandes pattes bleu-clair mais surtout à son long bec fin et noir retroussé vers le haut.

L'Avocette niche en Europe jusqu'au sud de la Suède et dans le sud de l'Asie ainsi qu'en Afrique du Nord. En hiver, une grande partie des individus quitte les régions les plus nordiques et quelques individus peuvent même atteindre le Sénégal (MOREL et ROUX, 1973).

En baie de Somme, l'Avocette n'était connue jusqu'il y a quelques années, qu'au passage. En 1975, une colonie de 12 couples s'est installée pour la première fois dans le Marquenterre (SUEUR, 1975). Depuis celle-ci n'a pas cessé de s'accroître : 26 couples en 1976, 31 en 1977 et 52 en 1978 (SUEUR, 1979).

Chaque hiver, depuis quelques années, des Avocettes peuvent être observées en baie de Somme mais elles sont peu nombreuses (1 à 5 individus) et l'hivernage est rarement complet (observé seulement en 1973-74 et 1976-77). La migration commence dès le début de mars, bat son plein début avril et se termine mi-mai. Dès leur arrivée sur les lieux de nidification, les Avocettes paradent et on assiste alors à des joutes entre couples.

Une phase spectaculaire de cette excitation pré-nuptiale est une figure où 4 individus, rarement plus, forment un cercle, leurs becs croisés dirigés vers le centre. Des accouplements peuvent être notés de fin mars à mi-mai (dates extrêmes dans le Marquenterre : 31 mars et 15 mai 1979); les premières pontes, comportant généralement 4 oeufs et plus rarement 5, sont déposées dans la deuxième quinzaine d'avril dans des nids qui sont de simples dépressions dans le sol, parfois garnis de brindilles ou de coquillages. Les éclosions s'échelonnent pendant une période s'étalant de mi-mai à mi-juillet. Les poussins se nourrissent seuls et ils utilisent lorsqu'ils le peuvent, de préférence les flaques en cours d'assèchement où la nourriture animale du fait de l'évaporation est plus concentrée que dans les grands canaux d'eau saumâtre. A cette époque, comme pendant l'incubation, les Avocettes adultes sont très agressives, elles poursuivent aussi bien les espèces prédatrices potentielles (Busard des roseaux, Goëland argenté, Corneille noire...) que les espèces les plus inoffensives (Gravelots, Chevaliers, Bécasseaux, Bergeronnette grise...), les couples voisins peuvent collaborer à cette "défense" des oeufs ou des poussins. A la fin de la période d'élevage, ces derniers ne sont le plus souvent accompagnés que par un seul adulte; les jeunes sont volants vers l'âge de 42-45 jours. Pendant quelque temps encore, un ou deux adultes peuvent les accompagner. Après la période de nidification, les Avocettes quittent rapidement la région; ainsi il ne reste plus que 14 individus le 23 août 1978 en baie de Somme et dans le Marquenterre (SUEUR, 1979). Les passages migratoires d'automne sont très peu notés.

Pour GEROUDET (1967), la nourriture de l'Avocette se compose de petits Crustacés, d'Insectes et d'Annélides; sur le littoral picard, les proies suivantes ont été relevées : Crustacés, petits Gastéropodes, petits Lamellibranches, Annélides Néréidés (MADON, 1935).

Le seul prédateur de l'Avocette, reconnu avec certitude dans le Marquenterre, est le Goëland argenté qui détruisit 22 pontes en mai 1976 (ANONYME, 1977).

L'Avocette, actuellement en expansion en France, a niché pour la première fois dans le Marquenterre en 1975, elle y prospère depuis. Surtout inféodée aux zones salées ou saumâtres, elle est assez peu observée à l'intérieur des terres dans la Somme.

#### BIBLIOGRAPHIE :

ANONYME (1977) Nidification de l'Avocette. Ass. Marq. Nat., Bull. ann., 9-10

GEROUDET P. (1967) Les Echassiers.- Neuchâtel (Delachaux et Niestlé), 288 p.

MADON P. (1935) Contribution à l'étude du régime des oiseaux aquatiques. *Alauda* 7 (1) 60-84

MOREL G. et ROUX F. (1973) Les migrateurs palé-arctiques au Sénégal : notes complémentaires. *Terre et Vie* 27 (4) 523-550

SUEUR F. (1975) Nidification de l'Avocette *Recurvirostra avosetta* en baie de Somme. *Alauda* 43(4) 482-483

SUEUR F. (1979) Données complémentaires sur l'avi-faune nicheuse de la Somme *ORFO* 49(1)39-43

