

Recensement national des laridés hivernants en France (hiver 2004-2005).

Résultats en Picardie.

Par Xavier COMMECY

C'est pendant l'hiver 1996-1997 qu'a été organisé un premier recensement national des laridés hivernants avec la collaboration de l'ensemble des associations ornithologiques de France (CREAU et DUBOIS 1997). Les résultats pour les trois départements picards de cette précédente enquête ont été présentés dans cette revue (COMMECY et SPINELLI 1996). Pour cet hiver, un appel relayé par la revue de la L.P.O. (Ornithos) a été lancé afin de renouveler l'expérience. Le réseau de Picardie Nature a répondu à la demande et par le biais d'informations données lors d'une réunion de ce réseau, par des messages dans *La petite Avocette* notre bulletin de liaison et sur notre liste de discussion *ObsPicardie*, nous avons organisé ces comptages concertés.

Chaque observateur picard motivé s'est ainsi engagé à suivre un ou plusieurs des dortoirs qu'il connaissait et à effectuer un comptage à la mi-décembre. Des repérages sur les anciens sites occupés afin de vérifier leur fonctionnement cet hiver ainsi que la recherche de nouveaux sites occupés et l'observation des voies d'arrivées en fin d'après midi ont été effectués par beaucoup en novembre et début décembre.

On peut estimer que la couverture régionale a été bonne pour ce recensement car tous les dortoirs connus ont été visités à la date choisie.

Modalités de recensement :

La méthodologie employée est simple, il faut compter en fin de journée les laridés au dortoir, de préférence par comptage direct ou par comptage des oiseaux au fur et à mesure de leur arrivée. Toutes les espèces de goélands et mouettes, mais aussi les labbes, sternes et guifettes étaient concernées. Nous avons demandé, au niveau picard de centrer les recherches sur le week-end des 11 et 12 décembre 2004, ou à défaut, à des dates les plus proches de celles ci comprises entre le 11 décembre 2004 et le 15 janvier 2005 comme cela était préconisé au niveau national. C'est effectivement ce qui a été fait.

Les résultats :

Nous présentons ci après les résultats obtenus. Pour chaque site on trouvera la localisation précise du site : commune puis lieu-dit, le type de milieu accueillant les oiseaux, la date du comptage, les noms des observateurs, la qualité estimée du comptage et les effectifs comptés de chaque espèce. Nous ferons ensuite un bilan département et régional et les comparerons avec les résultats obtenus lors du précédent recensement et éventuellement avec les bilans nationaux actuellement publiés.

AISNE (02)

Courtemont-Vareennes, dans une gravière en exploitation, compté le 13/12/04 par A. BOUSSEMARY. La qualité du comptage est médiocre, l'ensemble du site (privé) ne pouvant être vu entièrement à partir d'un point.

Mouettes rieuses : 3000.

Neuville-sur-Ailette, le plan d'eau de l'Ailette, un grand lac artificiel, a été compté le 14/12/04 par D. BAVEREL. La qualité du comptage est bonne.

Goéland cendré : 1 ; Mouette rieuse : 2850.

Pommiers, la Croisette, dans une gravière ancienne et réhabilitée, a été compté le 18/12/04 par R. KASPRZYK. La qualité du comptage est bonne.

Goéland cendré : 1 ; Mouette rieuse : 1840.

Tergnier à La frette, une gravière, compté le 18/12/04 par A. BOUSSEMARY et L. GAVORY (B. SEIGNIEZ y avait effectué un comptage quelques jours auparavant avec des effectifs estimés légèrement moindres). La qualité du comptage est bonne.

Goéland brun : 25 ; Mouette rieuse : 1875.

Saint-Quentin, le bassin de Gavany a été compté le 23/12/04 par Y. LE SCOUARNEC (D. BAVEREL avait réalisé un rapide passage quelques jours auparavant et a validé l'estimation donnée). La qualité du comptage est moyenne (accessibilité du site difficile) ;

Mouette rieuse : 800.

Bilan département :

5 dortoirs accueillant : 10365 Mouettes rieuses, 2 Goélands cendrés, 25 Goélands bruns.

OISE (60)

Bailleul-sur-Thérain, sur un étang (ancienne gravière de plus de 30 ans), compté le 21/12/04 par F. BOUCHINET. La qualité du comptage est bonne.

Goéland brun : 2 ; Goéland argenté : 59 ; Mouette rieuse : 1800.

Beauvais, Base nautique du Canada, une ancienne gravière réhabilitée, compté le 20/12/04 par F. BOUCHINET. La qualité du comptage est bonne.

Goéland brun : 10 ; Goéland argenté : 111 ; Goéland leucophaée : 4 ; Mouette rieuse : 2500.

Pontpoint, Moru, sur une gravière, compté le 19/12/04 par T. DAUMAL. La qualité du comptage est bonne.

Mouette rieuse, 1250.

Bilan département :

3 dortoirs accueillant : 5550 Mouettes rieuses, 170 Goélands argentés, 4 Goélands leucophaées, 12 Goélands bruns.

Somme (80)

Péronne, Sainte-Radegonde, un étang périurbain, compté le 15/12/04 par X. COMMECY. La qualité du comptage est bonne.

Goéland brun : 11 ; Mouette rieuse : 1960.

Saint-Valéry-sur-Somme, c'est l'estuaire de la Somme, compté le 11/12/04 par X. COMMECY, E. FOURNIER, H. ISEMBRAND et T. RIGAUX. Ce site qui regroupe de nombreux oiseaux revenant en fin de journée en suivant la rivière Somme après leur journée à l'intérieur des terres à la recherche de nourriture sur les plateaux cultivés et les décharges (pour certains jusqu'à Amiens – Saint Fuscien à plus de 70 kilomètres). Les oiseaux stationnant en journée sur le littoral picard ont été ajoutés, il a été vérifié en soirée qu'ils ne rejoignent pas leur dortoir pas les voies surveillées et comptés. Les oiseaux rejoignant le littoral par la vallée de la Bresles gagnent en totalité ou en grande partie le dortoir de la baie de Somme en coupant au dessus des terres au niveau de Gamaches et sont comptés au niveau de Saint-Valéry-sur-Somme ; ceci a été vérifié début décembre et début janvier (X. COMMECY et T. RIGAUX). La qualité du comptage est moyenne en raison du grand nombre d'oiseaux passant simultanément au niveau de Saint-Valéry-sur-Somme d'une absence de compteur le long du littoral au sud du dortoir (les oiseaux y ont été comptés dans la journée et cette voie d'arrivée draine généralement peu d'oiseaux) ainsi que par une imprécision dans le nombre de Goélands stationnant de jour dans la réserve naturelle de Baie de Somme. Malgré toutes ces restrictions, le bilan chiffré est impressionnant. Goéland marin : 178 ; Goéland brun : 180 ; Goéland argenté : 9820 (dont 4560 arrivant à Saint-Valéry-sur-Somme) ; Goéland cendré : 6230 (dont 5770 arrivant à Saint-Valéry-sur-Somme) ; Mouette rieuse : 5640

(dont 4260 arrivant à Saint-Valéry-sur-Somme) ; Sterne caugek : 1 ; Labbe parasite : 1.

Les deux dernières espèces ont été observées de jour et non au dortoir. Leur présence en hiver devant nos côtes est inhabituelle.

Bilan département :

2 dortoirs accueillant : 178 Goélands marins ; 191 Goélands bruns ; 9820 Goélands argentés ; 6230 Goélands cendrés ; 7600 Mouettes rieuses, 1 Sterne caugek ; 1 Labbe parasite.

Bilan régional :

* 10 dortoirs comptés contre 12 en 1996. Les sites de Bucy-le-long et Vermand dans l'Aisne, sites mineurs en 1996, ne sont semble-t-il plus utilisés ; le site de Pommiers, relativement proche de Bucy-le-Long, est nouveau. Le site de Saint-Maximin ne semble plus actif en décembre 2004, contrairement à l'époque du précédent recensement alors qu'il est utilisé de jour par les laridés d'après T. Daumal ; un nouveau site avec la base nautique de Beauvais. Dans la Somme, le site d'Estrées-Mons n'est plus utilisé : ce dortoir sur les toits d'une usine agro-alimentaire fait l'objet de tirs d'effarouchement par les gardes de l'O.N.C.F.S. après autorisation préfectorale. Le tableau suivant résume les données chiffrées par espèce obtenues cette année et fournit une comparaison avec les comptages de 1996. On peut remarquer une remarquable stabilité pour toutes les espèces.

	Goéland marin	Goéland brun	Goéland argenté	Goéland leucophee	Goéland cendré	Mouette rieuse	Sterne caugek	Labbe parasite	Total Laridés
1996	250	115	10000	5	6000	21000	0	0	37371
2004	178	228	9990	4	6232	23515	1	1	40149

Tableau 1 : Bilans régionaux 1996 et 2004.

Commentaires

Durant l'hiver 1996/1997 avaient été comptés 1 751 996 laridés en France avec une estimation à 2 millions d'oiseaux (CREAU et DUBOIS 1997). La Picardie n'est donc pas une région majeure pour ces espèces puisqu'en accueillant à l'époque un peu moins de 2%. Pour les espèces les plus abondantes chez nous, le constat est le même : environ 1.2 millions Mouettes rieuses comptées en France soit 1.7% en Picardie,

230000 Goélands argentés comptés en France soit 4.3% en Picardie ; 73500 Goélands cendrés comptés en France soit 8% en Picardie, les pourcentages étant encore plus marginaux pour les autres espèces.


Remerciements

Tous les observateurs ayant participé à l'enquête sont nommément cités dans le texte et j'espère n'avoir oublié personne. Je me permets de tous les remercier chaleureusement ; ils montrent la force d'une association reposant sur un réseau d'observateurs étoffé qui seule permet par des actions collectives de mener à bien de tels recensements.

BIBLIOGRAPHIE

- COMMECY X. et SPINELLI F. (1996) : Recensement des laridés hivernants en Picardie – Hiver 1996 1997. *L'Avocette* 1996 – 20 (1-2) p. 29.
- CREAU Y. et DUBOIS P. J. (1997) : Recensement des laridés hivernant en France. Hiver 1996/97. *Ornithos* 4(4) : 174 – 183.

Répartition des dortoirs de laridés en Picardie (enquête : hivers 2004-2005)



Xavier COMMECY
 4 place Godailler Decaux
 80380 GENTELLES
xavier.commecy@wanadoo.fr