

Hivernage d'un Bécasseau minute

Calidris minuta au Hâble d'Ault

lors de l'hiver 2004 – 2005

par Patrick DECORY

Les données de Bécasseau minute *Calidris minuta* recueillies sur le littoral picard, au cours de l'hiver 2004-2005, sont les suivantes:

date	Nombre d'individus	lieu	observateurs
23/10	30	Hâble d'Ault	P. DECORY
06/11	3	Hâble d'Ault	P. DECORY
11/11	1	Hâble d'Ault	P. DECORY
19/12	1	Hâble d'Ault	P. DECORY
24/12	1	Hâble d'Ault	P. DECORY
15/01	1	La Mollière sud	P. DECORY X. COMMECY
27/01	1	Hâble d'Ault	J. PICHENOT
08/02	1	Hâble d'Ault	M. ZUCCA
26/02	1	Hâble d'Ault	P. DECORY
10/03	1	Hâble d'Ault	P. DECORY
20/03	1	Hâble d'Ault	P. DECORY
26/03	1	Hâble d'Ault	P. DECORY
09/04	1	Hâble d'Ault	P. DECORY

Tableau 1 : Dates, nombres et lieux d'observations des Bécasseaux minutes au cours de l'hiver 2004 – 2005.

Discussion

Après la fin de la migration post-nuptiale en novembre, un Bécasseau minute est resté sur place et a continué à fréquenter le sud de la plaine maritime picarde et en particulier le hâble d'Ault, où on le trouvait lorsque les niveaux d'eau n'étaient pas trop importants, au secteur dit de « la mare aux limicoles ».

Lors des différentes observations, cet oiseau était toujours en compagnie de quelques Bécasseaux variables *Calidris alpina* et à La Mollière Sud (commune de Cayeux sur Mer) site peu éloigné du hâble d'Ault, il était également accompagnés de Bécasseaux sanderling *Calidris alba* et de grands Gravelots *Charadrius hiaticula*.

La continuité de ces observations au cours de l'hiver montre que cet individu a su utiliser différents sites du littoral au sud de la baie de Somme et principalement le hâble d'Ault pour y passer un hiver complet.

Il semble bien que ce soit la première fois, en Picardie, que l'on arrive à recueillir une

série continue de données sur une saison hivernale complète pour cette espèce.

Toutefois ce constat correspond aux connaissances actuelles sur l'hivernage de l'espèce au niveau national. En effet :

- DUBOIS et *al.* (2000) précisent que l'effectif hivernant en France, très variable (entre 600 et 2450 dans les années 1990), est surtout localisé sur le littoral méditerranéen et également sur la côte atlantique. Occasionnellement, quelques individus se retrouvent plus au nord (Pas de Calais) ou à l'intérieur des terres;

- LE DREAN-QUENEC'H DU et *al.* (1999) confirment que l'espèce atteint en Bretagne sa limite nord de son aire régulière d'hivernage et que quelques individus fréquentent également les côtes normandes et occasionnellement la Picardie;

- SUEUR et TRIPLET (1999) indiquent, quant à eux, que les données hivernales demeurent rares en baie de Somme.

Conclusion

Un Bécasseau minute a donc bien effectué un hivernage complet lors de la saison 2004 – 2005 sur la côte picarde avec comme point d'attache le hâble d'Ault. Cette donnée démontre la possibilité d'hivernages complets dans le nord de la France, en manche orientale.

Bibliographie

DUBOIS P.J., LE MARECHAL P., OLIOSSO G. ET YESOU P. (2000) – Inventaire des oiseaux de France. Nathan, 397 p.

LE DREAN-QUENEC'H DU S. et MAHEO R. *in* ROCAMORA G. et YEATMAN-BERTHELOT D. (1999) – Oiseaux menacés et à surveiller en France. Société d'Etudes Ornithologiques de France et Ligue pour la Protection des Oiseaux, 598 p

SUEUR F. et TRIPLET P. (1999) – Les oiseaux de la baie de Somme. SMACOP, Groupe Ornithologique Picard, 509 p.

Patrick DECORY
80210 Tours-en-Vimeu