

apprenez à les reconnaître



LES BECASSEAUX

par P. ROYER
P. TRIPLET

dessins PASCAL ETIENNE

Bécasseau maubèche (Calidris canutus)

On reconnaîtra le Bécasseau maubèche à sa taille importante, à son aspect trapu et court de pattes. L'été, il revêt un plumage roux dont le dessus est taché de noir, l'hiver, il devient gris avec le dessus écaillé et le dessous blanchâtre. Ce Bécasseau fréquente nos rivages au cours des passages migratoires et aussi en hiver; on peut donc l'observer avec les deux formes de plumage. Il niche dans les toundras arctiques.

Bécasseau cocorli (Calidris ferruginea)

Ce limicole possède également un plumage roux vif en été qui deviendra gris en hiver. On le distinguera du Bécasseau variable en livrée hivernale par le bec très fin et arqué et par le croupion blanc très apparent en vol. Il niche dans des contrées arctiques et n'apparaît chez nous qu'aux passages pré et post nuptiaux.

Bécasseau variable (Calidris alpina)


En livrée nuptiale, le dos roux vif et la tache noire à la poitrine ne permettent aucune confusion avec un autre Bécasseau. L'hiver, il devient gris, le bec légèrement arqué, la poitrine et les flancs rayés permettent de le distinguer; à cette époque, seule une expérience sur le terrain permet de le différencier des autres proches cousins. Le variable reste un des plus communs de nos Bécasseaux, on l'observe de passage sur nos côtes, mais il peut former des bandes importantes d'hivernants sur notre littoral (plusieurs milliers d'individus)

Bécasseau sanderling (Calidris alba)


C'est souvent l'hiver qu'on voit ce limicole trotter sur les plages de sable comme un jouet mécanique. Encore une fois, le roux distingue la parure nuptiale contrastant avec le ventre blanc pur. C'est aussi un nicheur de l'arctique qui apparaît chez nous pendant ses migrations et aussi en hiver lorsqu'il forme des troupes qui courent le long des vagues qui meurent sur le sable, il apparaît alors gris blanchâtre avec une tache noire à l'épaule caractéristique.

Bécasseau minute (Calidris minuta)


Sa taille réduite, son bec court et droit, le roux sur le dos permettent de le reconnaître l'été. A la mauvaise saison, le gris est de rigueur, marqué par deux V blanchâtres sur le dos roux et noir, c'est aussi un nicheur de l'arctique de passage sur notre littoral.




BECASSEAU
MAUBECHÉ



BECASSEAU
COCORLI




BECASSEAU
VARIABLE




même les
becasseaux ont des
taches de mazout

BECASSEAU
SANDERLING



hiver



BECASSEAU
MINUTE

E.P