


NIDIFICATIONS DE L'ÉCHASSE BLANCHE

Himantopus himantopus EN PICARDIE EN 1995

par Gérard Deloison

1995 a été une année exceptionnellement favorable pour la nidification de l'Échasse blanche en Picardie.

Sept couples se sont installés sur quatre sites et ont produit treize jeunes à l'envol.



Caruette et al. ont brossé en 1994 le statut de l'Échasse blanche en Picardie : cette espèce niche occasionnellement dans la région, surtout sur le littoral. Jusqu'en 1994, le maximum de couples nicheurs avait été noté dans l'Aisne, en 1958 (Boutinot, 1980 in Caruette et al. 1994). Fait exceptionnel, en 1995, sept couples nicheurs se sont installés sur quatre sites et ont produit treize jeunes à l'envol.

Pendant la période de reproduction 1995 sept sites où au moins une observation d'échasse a été faite, ont été suivis dans le département de la Somme, ainsi qu'un site dans le département de l'Aisne. Quatre de ces sites ont vu l'Échasse nicher avec succès, les autres n'ont permis à l'espèce que de stationner ou de se cantonner sans suite. Cette note se propose de faire la synthèse des observations recueillies sur cette espèce.

RÉCAPITULATIF DES OBSERVATIONS PAR SITES

Bassins de décantation de Grand-Laviers (80) :

Le premier couple arrive le 16 avril. Le 6 mai, douze oiseaux sont présents. Les jours suivants, quatre couples s'installent et les premiers couveurs sont observés le 2 juin. Les pre-

miers jeunes naissent le 5 juillet et, le 8 juillet, ce sont huit jeunes qui sont vus avec les adultes.

La dernière observation de la saison a lieu le 17 août, date à laquelle il ne reste plus sur le site qu'un adulte et cinq jeunes, dont quatre sont parfaitement volants (le détail des effectifs et des dates est indiqué dans le tableau ci-contre). Dès le début de la période de nidification le choix de l'emplacement des nids semble avoir été assez laborieux. Dans un premier temps les couples se cantonnent de façon assez dispersée et alarment sur trois des bassins du site (qui en comprend huit). Le 30 mai, un couple commence la préparation d'un nid qui est abandonné deux jours plus tard suite à un dérangement humain.

Puis, dès le 5 juin, les Échasses fréquentent de plus en plus assidûment un quatrième bassin très peu visité jusque-là. À partir du 12 juin, les quatre couples sont installés sur ce dernier bassin, au sein de la colonie de Mouettes rieuses *Larus Ridibundus* qui comprend 250 à 300 couples.

Le "facteur dérangements" a été déterminant quant à l'installation assez tardive des Échasses au sein de cette colonie de Mouettes qui leur a permis de bénéficier de plus de tranquillité. En effet, le bassin choisi par les Échasses, les Mouettes Rieuses et quelques couples d'Avocettes *Recurvirostra avosetta* est le bassin le moins fréquenté par les promeneurs et les ramasseurs de vers de vase utilisés pour la pêche. Les dérangements occasionnés par d'autres oiseaux ont été rares et seuls des Goélands argentés *Larus argentatus* (2 observations) et Faucon crécerelle *Falco tinnunculus* (1 observation) ont du être éloignés.

Les bassins de décantation de Grand-Laviers avaient déjà permis à l'Échasse blanche de se reproduire en 1993, année où un couple a produit au moins trois jeunes (Bawedin, 1994). En 1994, l'espèce sera seulement notée en stationnement.

Marais du Crotoy (80) :

La première observation a lieu le 26 avril : un couple parade et prépare le nid (X. Commeccy, com. pers.).

Le 1^{er} mai, la femelle couve. Le 14 mai, un deuxième couple est observé sur le site en compagnie des Échasses déjà installées, il ne sera pas revu. Durant tout le mois de mai, le mâle et la femelle se succèdent sur le nid, jusqu'au 30, date à laquelle les Échasses ne sont plus sur le site. Les 3 et 5 juin un mâle est à nouveau observé.

Le 8 juin la femelle couve, à une dizaine de mètres de l'emplacement du précédent nid.

ÉVOLUTION DES EFFECTIFS DE LA COLONIE D'ÉCHASSES BLANCHES SUR LES BASSINS DE DÉCANTATION DE GRAND-LAVIERS EN 1995

Dates	Adultes	Ad. couveurs	Jeunes
16 avril	2		
4 mai	4		
6 mai	12		
7 mai	2		
8 mai	4		
11 mai	6		
14 mai	2		
18 mai	3		
23 mai	7		
30 mai	8		
2 juin	9	1	
5 juin	7	2	
8 juin	8	1	
12 juin	10	4	
18 juin	8	3	
25 juin	9	2	
3 juillet	3		
5 juillet	6		1
10 juillet	13		8
16 juillet	9		8
2 août	2		6
11 août	2		3
17 août	1		5

Le couple est observé régulièrement jusqu'au 18 juin avec l'un ou l'autre des oiseaux couvant. Le 24 juin, la femelle est seule sur le site et ne couve pas. Toute tentative de nidification semble alors compromise, pourtant un couple avec deux pulli est observé le 12 juillet (P. J. Dubois, com. pers.).

Il s'agit donc de la première nidification de l'Échasse sur le marais du Crotoy.

Renclôtures de Noyelles-sur-Mer et de Boismont (80) :

Noyelles-sur-Mer :

Le 25 juin, un couple avec 3 poussins est observé (L. Gavo-ry et S. Flipo, com. pers.).

Le 30 juin, le couple est accompagné de deux jeunes âgés environ de deux semaines.

Le 5 juillet, un mâle est toujours présent et alarme.

Mollières de Pinchefalise :

- deux couples le 8 avril ;

- trois Échasses le 28 avril.

En 1994, deux couples avaient déjà niché sur ce site produisant 6 poussins.

Prairie Beauvisage :

- le 8 mai un adulte est présent (sexe indéterminé).

- le 9 mai le même (?) oiseau, cette fois identifié comme étant un mâle, alarme. Trois visites supplémentaires le même mois ne permettront pas de recontacter l'Échasse sur ce site.

Commune de Noyelles-sur-Mer (80) :

Un mâle est observé les 18, 21 et 23 mai sur une prairie inondée à la périphérie du village. Malgré trois autres visites il ne sera pas revu.

Cette observation semble devoir être rapprochée de l'observation faite sur la renclôture de Boismont, prairie Beauvisage (voir ci-dessus), site géographiquement proche (1 km) et pourrait concerner un oiseau qui a cherché à se cantonner, sans succès.

Bassins de décantation de la sucrerie d'Éppeville à Ham (80) :

Le 28 mai, un couple alarme en vol. Le 18 juin, observation identique cette fois en présence d'une autre Échasse (une femelle très probablement). Le 19 juillet, un jeune parfaitement volant est observé avec le couple et le troisième adulte. (C. Dancoisne, N. de la Perche, P. Moronville, S. Willefert, com. pers.).

En 1989, un couple qui avait tenté de nicher a dû abandonner le site suite à un dérangement.

Parc ornithologique du Marquenterre (80) :

Le premier adulte est vu le 12 avril. Un couple est présent le 8 mai et un accouplement est observé. Le 25 mai cinq adultes sont notés. Puis, les 24 et 27 juillet, un adulte et un juvénile volant sont observés.

Le 30 juillet, un couple est contacté en présence d'un juvénile. Ce dernier sera vu le 7 août en compagnie de quatre adultes. Un mâle est présent du 1^{er} au 5 septembre. Malgré la présence d'un juvénile sur le site la nidification n'a pu être prouvée.

Le dernier cas de nidification connu au Parc ornitholo-

gique remonte à 1989 avec un couple élevant trois jeunes (Anonyme, 1996).

Bassins de décantation d'Aulnois-sous-Laon (02) :

2 Échasses le 20 avril, un couple le 1^{er} mai (O. Bardet et L. Gavory, com. pers.). Elles ne seront plus revues ensuite. Ces deux données sont une première pour ce site. La dernière mention pour le département de l'Aisne remonte à juillet 1989 : un couple cantonné sans suite à Guignicourt (L. Kerautret in P. Caruette et al. 1994) et la seule nidification connue remonte à 1958 : six couples à Bohain dans le Vermandois (Boutinot, 1980 in P. Caruette et al. 1994).

COMMENTAIRES

Les résultats exceptionnels de la saison de nidification 1995 de l'Échasse blanche en Picardie peuvent s'expliquer par la conjonction de plusieurs facteurs :

- les conditions météorologiques en Espagne, fief de l'espèce, qui a subi à cette période une importante sécheresse ;

- la raréfaction des sites de nidification, toujours en Espagne, due à d'importantes modifications des milieux naturels au profit de l'agriculture intensive ;

- un hiver et un début de printemps très pluvieux en Picardie, qui ont bien préparé les sites en créant des niveaux d'eau élevés, multipliant les surfaces de milieu favorable.

Il faut aussi signaler que les deux années précédentes (93 et 94) l'espèce a fréquenté un peu plus régulièrement la Picardie. En 1993 un couple nichait dans la Somme et en 1994 quatre couples étaient recensés (trois dans la Somme et un dans l'Oise) (P. Caruette et al. (1994). La fréquentation deux années de suite de sites de nidification, potentiels ou déjà occupés, à certainement permis à des oiseaux qui avaient stationné sur ces sites, de se cantonner durablement la troisième année.

Fait notable pour cette saison 1995, pour la première fois une Échasse s'attarde jusqu'en septembre dans la région, au Parc ornithologique du Marquenterre. Les dates maximales de présence de l'espèce en Picardie étaient jusqu'alors comprises entre avril et août.

REMERCIEMENTS

Je tiens à remercier Xavier Commecy et Laurent Gavory qui ont bien voulu relire et amender ce texte.

BIBLIOGRAPHIE

- ANONYME (1996) : Chronique ornithologique en 1995, Bulletin 1995 de l'association Marquenterre Nature, p. 46.
- V. BAWEDIN (1994) : Nidification de l'Échasse blanche dans l'Abbeville (80) en 1994. L'Avocette - 18 (3-4), p. 69.
- P. CARRUETTE, C. DANCOISNE, L. GAVORY (1994) : L'Échasse blanche nicheuse en Picardie en 1989. L'Avocette - 18 (3-4), p. 71.
- J.-B. MOURONVAL et P. TRIPLET (1991) : Oiseaux d'eau nicheurs en plaine maritime picarde, APCGE Somme, ONC, Conseil général de Picardie, 217 p.
- SUEUR F. et COMMECY X. (1990) : Guide des oiseaux de la baie de Somme. EDF, DRAE, GEPOP Amiens, 192 p.
- D. YEATMAN-BERTHELOT, G. JARRY (1994) - Nouvel atlas des oiseaux nicheurs de France, 1985-1989 - Société ornithologique de France, 775 p.