

Le FOU DE BASSAN

par Laurent GAVORY

Ce trimestre, nous vous présentons un Oiseau qu'il peut paraître suprenant de voir figurer dans l'avifaune picarde. En effet, on associe plus facilement le Fou de Bassan aux côtes rocheuses de Scandinavie ou de Bretagne plutôt qu'à la côte sableuse de Quend-Plage. Et pourtant on peut l'y observer ainsi qu'à Ault, Cayeux sur Mer, au large de la Baie de Somme ou à Fort Mahon. Hélas, la plupart du temps cette espèce se tient assez loin du rivage, en mer, ce qui rend difficile son observation. Cependant, il arrive que des individus plus complaisants se rapprochent de la côte (notamment par temps de brouillard).

Description


C'est un oiseau de grande taille, (longueur 87 à 100 cm, envergure 165 à 180 cm) qui possède un corps fuselé ainsi que des ailes longues étroites et pointues. Sa queue est courte et pointue.


Les adultes sont de couleur blanche avec l'extrémité des ailes noire. En période de reproduction, la tête et la nuque sont jaunes. D'après J. FERGUSSON, LEES et coll. (1983), on peut distinguer le mâle de la femelle par la présence d'une ligne sur les pattes, ligne qui est jaune-vert chez le mâle et bleu-vert chez la femelle.

Chez les jeunes le plumage varie suivant leur âge. En effet, les jeunes Fous prennent leur plumage d'adulte vers l'âge de cinq ans (ainsi vont-ils passer par différents plumages avant d'acquérir celui d'adulte définitif).

L'Oiseau de première année est de couleur brun-noir moucheté de blanc avec un V blanc à la base de la queue. Après une mue complète de mars à avril le Fou acquiert un plumage de deuxième année où la tête les couvertures alaires secondaires et un V à la base du cou sont blancs, le reste restant foncé. Puis le plumage s'éclaircit, après une mue de juillet à décembre (période où désormais l'individu muera chaque année). L'Oiseau de troisième année a la tête, le corps, la queue et l'aile secondaire blancs avec quelques plumes noires éparses. Enfin, la quatrième année il est comme l'adulte mise à part la tête et la nuque qui ne sont pas jaunes et la présence de quelques plumes noires sur l'aile et la queue (voir dessins).

Cet Oiseau est très facilement reconnaissable, pourtant on peut éventuellement le confondre à grande distance avec un grand Goéland. Ce qui les distingue alors c'est le vol puissant, direct et soutenu aux battements réguliers que possède le Fou de Bassan et que n'ont pas les grands Goélands.





Reproduction

Nous ne nous attarderons pas sur ce point, l'espèce ne nichant pas dans la région. Cependant, il faut savoir que le Fou niche en colonie dense sur les corniches, dalles rocheuses, aplombs... des côtes rocheuses. Il pond un oeuf sur un amoncellement d'algues ou à même la pierre. L'incubation dure 44 jours et le jeune quitte le nid au bout de 90 jours. Il est à noter que le Fou couve son oeuf sur les pieds.

BIBLIOGRAPHIE

COMMECY X. et SUEUR F. (1983). L'Avifaune de la Baie de Somme et de la Plaine Maritime Picarde. GEPOP (235 pages). Disponible au local au prix de 70 Frs.

DIF G. (1982) Les Oiseaux de mer d'Europe. Paris ARTHAUD (445 P.).

FERGUSON. LEES J. et Coll. (1983) The Shell Guide to the Birds of Britain and Ireland. London MICHAEL JOSEPH (335 P.).

TUCK G et Coll. (1985) Guide des Oiseaux de Mer. Neuchâtel-Paris DELACHAUX et NIESTLE (310 p.).

Synthèses d'observations parues dans l'Avocette (1979-1980-1981-1982).

