

DES OIES DES NEIGES Anser caerulescens DANS LE MARQUENTERRE

par F. Sueur

Début décembre 1977, 23 Oies des neiges (un groupe de 18 individus et un autre de 5) ont été observées en baie de Somme et dans le Parc Ornithologique du Marquenterre (M. Mannecart). La date du 10 décembre (Anonyme 1978) ne peut être retenue car avant cette date un article relatant cette observation (min. 18 individus) était déjà paru dans un journal local (Dhenin 1977). Deux individus peu après sont amenés blessés au POM : l'un mort ensuite à été naturalisé, nous avons pu l'examiner, il s'agit d'un subadulte de la phase bleue de la sous-espèce caerulescens ; l'autre lâché dans le parc était un immature (bec noir) de la phase blanche. Il fut rejoint par 2 autres individus, également immatures de la phase blanche, que nous avons pu observer les 10 et 11 décembre. A cette époque, l'individu blessé était incapable de voler et les 2 autres, comme c'est le cas général chez cette espèce à l'inverse des Oies grises, étaient très peu farouches. Ces 3 individus purent être observés jusqu'au 28 avril 1978, le 30 c'est 4 individus qui sont présents.

Dans la Somme nous ne connaissons que deux mentions antérieures pour cette espèce :

- 3 individus parmi un rassemblement de 4 à 5000 Oies pendant l'hiver 1963 dans les prés bordant la baie d'Authie, cette observation est mentionnée comme peu sûre par son auteur (Hédouin 1973).
- 1 individu, considéré comme échappé de captivité, le 7 juillet 1973 au POM (Anonyme 1978), curieusement dans ce même bulletin c'est un petit groupe qui est mentionné à l'automne 1973 en baie de Somme (Anonyme 1974) et l'auteur de "l'observation" d'un individu (Y. Ridet) m'avait indiqué en 1975 en avoir observé deux ans auparavant un petit groupe avec des individus en phase blanche et d'autres en phase bleue.

Ces deux mentions ne peuvent donc être retenues.

Pour la France, Mayaud (1936) indique la sous-espèce hyperboreus (= caerulescens) comme très accidentelle en hiver, la dernière mention de l'Oie des neiges (sous-espèce non précisée) est celle d'un adulte en phase blanche le 11 novembre 1972 dans l'estuaire de la Seine (Cruon et Vielliard 1975).

Voici d'après Scott (1970) et Géroudet (1972) le statut des deux sous-espèces d'Oie des neiges :

- A. c. caerulescens (phase blanche et phase bleue) niche sur la Terre de Baffin, l'île Southampton, sur la côte arctique de l'Amérique du Nord à l'ouest de la baie d'Hudson et dans le nord-est de la Sibérie ; elle hiverne dans le golfe du Mexique principalement en Louisiane (surtout phase bleue) ainsi qu'en Californie (surtout phase blanche), elle s'égare parfois en Grande-Bretagne et jusqu'en France et en Belgique où elle est très rare.
- A. c. atlanticus (phase blanche uniquement) niche dans le nord-ouest du Groenland et sur la Terre d'Ellesmere, migre par l'embouchure du Saint-Laurent et le Cap Tourmente pour hiverner sur la côte atlantique des Etats-Unis de la baie de Chesapeake à la

Caroline du Nord, elle est observée en très petit nombre et de manière irrégulière en Irlande et en Grande-Bretagne. Pour ces deux sous-espèces, certaines observations en Europe peuvent correspondre à des individus échappés de captivité.

Nous tenons à remercier toutes les personnes qui par leurs renseignements ont permis d'apporter ces précisions quant à cette première observation d'Oies des neiges sur le littoral picard.

#### BIBLIOGRAPHIE

- Anonyme (1974) Oiseaux migrateurs dans le Parc (extrait des observations) - Ass. Marq. Nat., Bull. ann., 1p.  
- (1978) Des oies des neiges ! - Ass. Marq. Nat., Bull. ann., p.9.  
Cruon R. et Vielliard J. (1975) Notes d'ornithologie française XI - Alauda 43(1)1-21.  
Dhenin M. (1977) Victime d'une erreur de navigation ? L'oie des neiges stationne sur nos rivages - La Voix du Nord, 8 déc. 1977, (10394)4.  
Géroudet P. (1972) Les Palmipèdes - Neuchâtel (Delachaux et Niestlé), 284p.  
Hédouin J. (1973) Notre baie qui êtes à eux... in ouvrage collectif, La Baie de Somme.  
Mayaud N. (1936) Inventaire des Oiseaux de France - Paris (S.E. O. et A. Blot), 211p.  
Scott P. (1970) Atlas en couleur des Anatidés du monde - Paris (Le Béliet-Prisma), 96p.