

Plumage nuptial hivernal chez la Mouette rieuse *Larus ridibundus*

François SUEUR

Chez la Mouette rieuse *Larus ridibundus*, le plumage nuptial est acquis entre janvier et mars, mais surtout au cours de ce mois (SUEUR, 1993). Ce plumage est surtout caractérisé par le capuchon brun chocolat. L'évolution vers le plumage internuptial a lieu entre juillet et octobre mais en août la plupart des adultes ont perdu au moins une partie du capuchon. De ce mois à octobre, les oiseaux arborant celui-ci au complet sont le plus souvent des subadultes. Entre novembre et février, la Mouette rieuse ne présente que rarement un capuchon complet ou presque mais ce type d'observation n'est toutefois pas exceptionnel comme le montre cette série de données récentes (novembre 1998 à décembre 1999) :

- 1 adulte avec capuchon complet (sur 32 oiseaux) le 21 novembre 1998 à Rue (Somme) ;
- 1 adulte avec capuchon complet et 1 adulte avec capuchon incomplet (sur 59 oiseaux) le 26 décembre 1998 à Rue ;
- 2 individus avec capuchon incomplet (sur 59 oiseaux) le 31 décembre 1998 à Rue ;
- 5 adultes avec capuchon complet (sur 118 oiseaux) le 16 février 1999 à Rue ;
- 1 adulte en plumage nuptial le 27 novembre 1999 au Parc Ornithologique du Marquenterre, Saint-Quentin-en-Tourmont (Somme) ;
- 1 adulte avec capuchon presque complet et 1 adulte avec capuchon partiel (sur 4 oiseaux) le 4 décembre 1999 à Woignarue (Somme) ;
- 1 adulte avec capuchon presque complet (sur 85 oiseaux) le 18 décembre 1999 au Hâble d'Ault (Somme), 1 adulte avec capuchon presque complet et 1 adulte avec traces de capuchon importantes (sur 50 oiseaux) à Woignarue.

Une recherche plus exhaustive des données déjà obtenues sur une période plus longue permettrait de signaler des capuchons complets chez la Mouette rieuse entre novembre et février. Il semble qu'à cette époque ce puissent être les adultes ayant perdu précocement le plumage nuptial (en raison d'un échec de leur nidification ?) qui acquièrent le capuchon nuptial plus tôt que la très grande majorité des oiseaux pour qui ce phénomène se produit plutôt en mars.

Bibliographie

SUEUR F. (1993) *La Mouette rieuse*. Saint Yrieix (Eveil Editeur), 72 p.

François SUEUR
9 rue du Champ neuf
Le Bout des Crocs
80120 Saint-Quentin-en-Tourmont