

# Nouvelles données sur la consommation des baies d'Argousier *Hippophae rhamnoides* par les oiseaux

François SUEUR & Philippe CARRUETTE

Dans deux travaux précédents, nous avons signalé la consommation de baies d'Argousier *Hippophae rhamnoides* par 19 espèces aviennes dans le Marquenterre (SUEUR, 1988 & 1990). D'autres observations ont également été synthétisées dans un récent ouvrage (SUEUR & TRIPLET, 1999). La présente note a pour but d'apporter quelques compléments.

## Liste systématique

### Faisan de Colchide *Phasianus colchicus*

De fortes présomptions existaient quant à la présence de ces baies dans le régime de cet oiseau. Ce fait est prouvé en décembre 1997 au Parc Ornithologique du Marquenterre avec l'observation d'un mâle s'alimentant ainsi.

### Mésange à longue queue *Aegithalos caudatus*

SUEUR (1990) signale cet aliment en février 1988 dans la diète de cette espèce. Depuis, de nouvelles données ont été acquises en février 1990 et novembre 1996.

### Mésange boréale *Parus montanus*

Le seul cas connu de consommation de ces baies par cet oiseau, plutôt rare dans le Marquenterre, est celui de 2 oiseaux en février 1990.

### Mésange noire *Parus ater*

SUEUR & TRIPLET (1999) signalent l'observation de 2 individus mangeant ces baies en janvier 1997. Des mentions plus complètes existent : 2 oiseaux en janvier 1990, de même en février 1990, 3 individus en janvier 1997 et 2 oiseaux en février 1997.

### Mésange charbonnière *Parus major*

La consommation des baies d'Argousier par cet oiseau était connue en décembre et février (SUEUR, 1990), mois auxquels janvier peut être désormais ajouté.

### Pie bavarde *Pica pica*

SUEUR (1988) signale l'ingestion des fruits de l'Argousier par la Pie bavarde en novembre et décembre 1986. De nouvelles observations ont été réalisées en janvier 1994, décembre 1996, mars 1997 et septembre 1999.

**Corneille noire** *Corvus corone corone*

La consommation des baies d'Argousier par cet oiseau était signalée de novembre à février (SUEUR, 1990). Elle a depuis été notée en août 1998.

**Corneille mantelée** *Corvus corone cornix*

En décembre était clairement répertorié comme mois ayant fait l'objet d'observations concernant la consommation de baies d'Argousier (SUEUR, 1990). Deux oiseaux sont notés s'en alimentant en novembre 1980 au Parc Ornithologique du Marquenterre.

**Chardon d'Europe** *Carduelis chloris*

Cet oiseau est signalé comme ingérant ces baies en janvier et novembre (SUEUR, 1990 & 1996). Énormément, des observations ont été réalisées de novembre à mars.

**Bouvreuil pivoine** *Pyrrhula pyrrhula*

Ces oiseaux ont été observés se nourrissant de baies d'Argousiers en janvier 1990 au Parc Ornithologique du Marquenterre.

## Bibliographie

- JEUR F. (1988) La consommation des baies d'Argousier *Hippophae rhamnoides* par les oiseaux. *L'Oiseau et R.F.O.*, 58 : 156-158.
- JEUR F. (1990) Nouvelles données sur la consommation des baies d'Argousier *Hippophae rhamnoides* par les oiseaux. *L'Oiseau et R.F.O.*, 60 : 63-65.
- JEUR F. (1996) Régimes alimentaires de quelques fringilles dans la Somme. *Avifaune picarde*, 2 : 98-102.
- JEUR F. & TRIPLET P. (1999) *Les oiseaux de la Baie de Somme. Inventaire commenté des oiseaux de la Baie de Somme et de la Plaine Maritime Picarde*. SMACOP, GOP, Conservatoire Littoral, RNBS, 510 p.

François SUEUR

9 rue du Champ neuf  
Le Bout des Crocs  
80120 Saint-Quentin-en-Tourmont

Philippe CARRUETTE

Cantereine  
80120 Rue