


## Apprenez à les reconnaître : LES GUIFETTES ET LES STERNES

Par Pierre ROYER

Dans un dernier article, nous avons vu les Mouettes et les Goélands qui fréquentent notre littoral picard et les eaux douces à l'intérieur des terres. Apparentées à ces derniers, les Sternes et les Guifettes s'en distinguent par leur faible palmure très échanquée et la tête plate. Les Sternes sont taillées pour évoluer avec aisance dans l'espace aérien, les longues ailes claires leur permettent un vol rapide mais on les voit plus souvent vagabonder au dessus des eaux d'un vol nonchalant. Elles parcourent les grèves de nos rivages ou les eaux calmes des étangs à la recherche de petites proies qu'elles capturent en plongeant la tête la première après avoir replié leurs ailes; les Guifettes ont plutôt tendance à picorer à la surface de l'eau et plongent moins souvent. Les courtes pattes de ces espèces les distinguent des autres Laridés (famille des Mouettes et Goélands) lorsqu'il sont posés. Les Sternes sont pratiquement incapables d'effectuer des déplacements à pied, d'autre part elles nagent et se posent rarement sur l'eau comme leurs proches cousins. Découvrons les différentes espèces qui fréquentent notre région :



### LA GUIFETTE NOIRE (Chlidonias niger)

Petites sternes des eaux douces, les Guifettes noires revêtent un plumage sombre lorsqu'elles passent au dessus de nos étangs au début de Mai; on les voit évoluer au dessus des eaux libres lorsqu'elles picorent des larves et des petits insectes. Leur vol souple et capricieux les distingue des Mouettes, elles exercent des va-et-vient permanents, effleurant la surface de l'eau, s'élevant dans les airs d'une manière ondulante.

Elles ne nichent pas chez nous, certaines se reproduisent en Belgique, d'autres en Vendée, dans les Landes. Le passage post-nuptial s'effectue dès Septembre mais elles ont changé de plumage à cette époque, considérablement éclairci, les Guifettes noires conservent une calotte noire tandis que le reste a blanchi.

### LA GUIFETTE LEUCOPTERE (Chlidonias leucopterus)

Son aire de répartition se situe beaucoup plus à l'Est de l'Europe. On l'observe parfois lors de ses migrations mais toujours en très petit nombre. Elle se distingue des autres Guifettes par un plumage noir typique avec épaules et queue blanches. Le plumage d'hiver se caractérise par un collier blanc complet, par l'absence de tâches pectorales noires (comme chez la G. noire) et le croupion blanc. La Guifette leucoptère reste rare au passage.



LA GUIFETTE MOUSTAC (*Chlidonias hybrida*)

Observée principalement lors des migrations pré et post-nuptiales la Guifette moustac apparaît plus claire que ses proches cousines en été. Les côtés du cou blancs, la calotte noire et le dessous gris foncé la distinguent des autres, mais l'hiver moustac et leucop-  
tèressant difficilement identifiables.

LA STERNE HANSEL (*Gelochelidon nilotica*)

Observée quelquefois sur le littoral picard, elle reste rare. Cette sterne des côtes de sable et des marais salants possède une calotte et un bec massif noirs qui la caractérisent.

STERNE CASPIENNE (*Hydroprogne caspia*)

Sterne

Ses apparitions restent épisodiques sur le littoral picard; sa taille proche de celle d'un goéland argenté et son énorme bec rouge vermillon la rendent facilement discernable des autres sternes.

STERNE PIERREGARIN (*Sterna hirundo*)

STERNE ARCTIQUE (*Sterna paradisea*)

STERNE DE DOUGALL (*Sterna dougalli*)

Ces trois espèces se ressemblent beaucoup et seuls quelques détails permettent de différencier les adultes en plumage nuptial, les immatures, eux, restent difficilement discernables.

- La Sterne pierregarin possède un bec rouge dont la pointe est noire (mais pas toujours).

Posée, la queue ne dépasse pas la longueur des ailes et en vol une tâche pâle apparaît en arrière du poignet de l'aile.

- La Sterne arctique possède un bec rouge sang sans tâche noire, une queue plus longue que les ailes lorsqu'elle est posée et des rémiges transparentes en vol.

- La Sterne de Dougall apparaît beaucoup plus claire avec de longs filets à la queue qui dépassent largement les ailes.


La distinction des jeunes individus chez ces trois espèces reste complexe et nous n'approfondirons pas ces détails.

Les Sternes arctiques et pierregarin constituent les deux espèces les plus communément observées aux passages de printemps et d'automne. Des rassemblements de plusieurs centaines d'individus peuvent être notés en Baie de Somme principalement aux passages post-nuptiaux.

LA STERNE NAIN (*Sterna albifrons*)


Si la Sterne caspienne se distingue par sa taille de géant, la Sterne naine apparaît toute petite, à peine plus grosse qu'un Merle avec un bec jaune à pointe noire et un front blanc. Au passage, c'est sur les plages de sable et de galets qu'on peut l'observer. C'est principalement en Avril et en Août qu'elle traverse notre pays sur le littoral.






Sterne Caugek

Guifette noire  
(plumage d'hiver)



- A Sterne Pierregarin  
B Sterne Arctique  
C Sterne de Dougall.



**LA STERNE GAUGEK** (*Sterna sandvicensis*)

Plus grande que la pierregarin et l'arctique, son bec noir à pointe jaune chez l'adulte son plumage gris clair, permettent de la reconnaître aisément. Bien souvent elle se distingue par un cri caractéristique, un "Kirrek" sec qu'elle pousse en vol et qui la rend très bruyante. Chez nous, la gaugek s'observe en migration sur la côte picarde. Elle passe par petits groupes sur le littoral et se rassemble parfois à marée haute sur les bancs de sable de la Baie de Somme qui accueillent plusieurs dizaines d'individus.

**CRITERES DE DETERMINATION DES STERNES ADULTES**

ESPECES	BEC	TAILLE	PLUMAGE (couleur des ailes et de la queue)
<u>Sterne hansel</u>	noir	d'une mouette	queue grise
<u>Sterne caspienne</u>	gros bec rouge vermillon	d'un Goéland argenté	gris dessus, blanc dessous
<u>Sterne pierregarin</u>	rouge à pointe noire	d'une Mouette rieuse	queue de la même longueur que les ailes
<u>Sterne arctique</u>	rouge vif		queue dépassant légèrement les ailes
<u>Sterne de Dougall</u>	noir à racine rouge		filets de la queue très longs dépassant les ailes
<u>Sterne naine</u>	jaune à pointe noire	d'un merle	front blanc
<u>Sterne gaugek</u>	noir à pointe jaune	un peu plus grande que pierregarin, arctique, de Dougall	queue blanche; gris clair dessus, blanc dessous