



Si l'espacement des arbres est plus important, une végétation arbustive pourra se développer. Aux premiers rangs de celle-ci on trouvera l'Aubépine et le Sureau. En plus du Lorient et de quelques rares espèces profitant également du cas précédemment décrit beaucoup d'autres oiseaux seront alors contactés : Troglodyte, Rouge-gorge, Rossignol, Merle noir, Grive musicienne, Fauvette des jardins, Fauvette à tête noire, Pouillot fitis, Mésange boréale. Quand le sol est très humide, la Locustelle tachetée parvient à s'implanter.


Enfin une des premières conséquences sera l'interdiction de chasser qui surviendra d'ici quelques années, ce qui on s'en doute ne manquera pas de provoquer divers conflits.

#### conclusion :

Déjà amputé par le camping municipal, le marais du Crotoy risque de ne plus constituer ce site exceptionnel qu'il représentait auparavant.



BILAN DE L'ANNEE 1982



Voici la synthèse des activités du centre de soins, avec quelques anecdotes. Cette année 1982 a été bénéfique pour le centre puisqu'une subvention a permis de refaire nos enclos, ils en avaient besoin, et qu'en matière de soins notre expérience s'améliore.

#### UN SAUVETAGE PEU BANAL

Le 1 Septembre 1982, une habitante de Saint-Sauflieu m'avertit qu'elle avait recueilli un pigeon dont le plumage était très souillé par de l'huile de friture. Effectivement, quelqu'un avait trouvé commode de déverser sa vieille huile de friture dans la mare et l'oiseau, en venant boire, s'était englué.

J'ai donc utilisé la technique employée pour démaquiller les oiseaux: aucun résultat! L'huile oxydée formait une gangue durcie adhérent au plumage. Les moyens chimiques ayant échoué, et l'oiseau se trouvant en période de mue, la seule solution était d'accélérer le renouvellement du plumage en arrachant les plumes. En effet les plumes nouvelles poussent à la place des anciennes qui sont tombées une à une et de manière symétrique. Cette mue dure près d'un mois. Si les vieilles plumes restaient collées, les nouvelles ne pourraient pas pousser ou se tordraient.

Aussi, chaque jour, j'arrachais une ou deux plumes à chaque aile et quelques plumes de couverture en les tirant assez fermement mais sans brusquerie. Le pigeon ne semblait pas souffrir de ce procédé barbare!

Le résultat est que maintenant son plumage est entièrement renouveau à l'exception de six ou sept plumes à chaque aile. Il vole de nouveau et va bientôt quitter la volière pour retrouver la liberté.

Esèce	Date	Lieu	Blessure	Cause	Avenir
Mouette rieuse le 20/1 Amiens			fracture aile dr.	?	ne vole plus, mis au P.O.M.
Hibou moyen-duc le 13/2 Amiens			fract. ouverte aile dr. + oeil crevé.	?	a du être euthanasié
Tadérne de Belon le 24/2 B. de Somme			fract. aile dr. + oeil crevé	fusil 6 plombs	amputation de l'aile mort le 10/3
Buse variable le 24/2 Beauvais			fracture aile dr. assez ancienne	?	ne vole plus gardée au centre
Mouette rieuse le 13/3 Amiens			mauvaise fract. aile dr.	ligne elect.	ne vole plus, mis au P.O.M.
Faucon crecerelle le 30/4 Cuts (Oise)			pas de blessure apparente	épuisée	relâchée le 28/8
Chouette hulotte le 24/4 Amiens			jeune en duvet perdue en ville		relâchée le 3/7 observée le 6/7
Chouette hulotte le 3/5 Amiens			idem, de la même famille.		relâchée le 3/7
Chouette hulotte le 3/5 Amiens			idem		la plus jeune des 3 trop faible, morte le jour même.
Faucon crecerelle le 11/6 Clermont			fract. aile dr. + bec cassé	?	a été relâché après s'être assuré qu'il pouvait déchiqueter de la viande.
Huïtrier-pie le 14/8 B. de Somme			fract. aile g. assez ancienne	?	mort le 24/8
Héron cendré le 19/8 Conty			petite plaie au cou	hameçon + fils	opéré par un vété- rinaire, relâché le 24/8
Héron cendré (jeune) le 30/8			grosse fract. base aile dr.	fusil 2 plombs	mort après l'anes- thésie.
Pigeon le 1/9 St-Sauflieu			"mazouté"	huile sur la mare.	arrachage délicat des plumes pour activer la mue.
Héron cendré le 5/9 Sailly- Laurette.			fract. aile dr. + les 2 pattes	fusil 8 plombs	euthanasié.

P.O.M. = parc ornithologique du Marquenterre, il possède un îlot réservé aux goélands et aux mouettes, nous n'avons confié au POM que des goélands et des mouettes non volants.


Espèce	Date	Lieu	Blessure	Cause	Avenir
Héron cendré	le 3/10	Bourdon	: extrémité de : l'aile dr. coupée	: ?	: confié au parc : zoologique d'Amiens
Grèbe huppé (jeune)	le 3/11	Saleux	: aucune	: brouillard	: relâché à la Hotoie : à Amiens.
Epervier d'Europe	le 4/11	Ault	: aile dr. luxée : nombreuses : plumes cassées	: clôture : grillagée	: le 20/11 toujours au : centre, si ne vole plus : mis au FIR pour repro- : duction.
Héron cendré	le 15/11	Monsure près de Conty	: fract. ouverte : en 2 endroits	: fusil : 3 plombs	: le 20/11 toujours au : centre, vu la blessure : il a peu de chance de : revoler.
Guillemot	le 19/11	Cayeux	: mazouté	: mazout	: Le 20 toujours au : centre, tentative de : réimperméabilisation : en cours.

REMARQUES

non à l'expérimentation animale

L'arrachage des plumes est une technique particulière pour activer la mue et surtout le renouvellement des plumes des ailes et de la queue. Au centre, il nous arrivait assez souvent de soigner des rapaces aux plumes cassées ou coupées, jamais nous n'avons essayé cette technique de peur de faire saigner ou de prolonger la période de captivité encore plus que si l'on n'avait rien fait.

Ce pigeon nous a donc permis de maîtriser ce procédé dont nous profiteront à l'avenir.



Le faucon crecerelle du 30/4 est arrivé au centre avec un plumage très abîmé et une insuffisance respiratoire sévère. Cet état était probablement du au long séjour qu'il a passé chez un particulier dans un clapier, en effet il faut savoir que le ciment use les plumes, que le manque d'aération, lié à une alimentation mal adaptée, favorise les affections respiratoires comme l'aspergillose (mycose pulmonaire). des antibiotiques associés à l'iodure de potassium (traitement de l'aspergillose) ont sauvé ce rapace.

Le héron du 3/10 ne nous paraissait pas relâchable puisqu'il lui manquait huit grandes plumes à l'aile droite, il a été confié au zoo d'Amiens. C est avec surprise que nous avons appris qu'il volait et actuellement tout le monde peut le voir sur le bassin rond du parc de la Hotoie.

Le grèbe huppé du 3/11 a été trouvé à Saleux alors qu'il cherchait à décoller de la route. D'après le temps qu'il faisait ce jour là nous en avons déduit qu'il avait confondu la route avec une rivière.

P. THIERY