

PREMIERE OBSERVATION DE BECASSEAUX FALCINELLES *Limicola falcinellus* DANS L'OISE

Par Marc et Pierre Sengez.

Le 18 mai 2000, nous découvrons deux Bécasseaux falcinelles *Limicola falcinellus* sur les bassins de décantation de la sucrerie de Vauciennes (60). Il s'agissait de deux adultes. Cette donnée constitue la première mention de l'espèce dans l'Oise.

Observés le matin à 9h30, les oiseaux étaient revus le soir vers 18h30 par nous mêmes et Cédric LOUVET. Leur présence a ensuite été communiquée au "Répondeur du Coin des Branchés" de la LPO afin que d'autres ornithos puissent observer cette espèce toujours rare, surtout à l'intérieur des terres.

Cette donnée a été soumise au Comité d'Homologation National.

Le matin du 19 mai, 5 ornithos ont pu les observer dans de bonnes conditions; les deux oiseaux "vedettes" étaient toujours présents le soir vers 19h00. Le 20 mai, Alain Rouge a pu également les observer avant qu'ils ne décollent vers 18 h00 en compagnie de Grands Gravelots *Charadrius hiaticula*. Ils ne seront plus revus ensuite.

Des clichés ont pu être effectués par J.Y. FREMONT (Ornithos Vol.7 - n°2), tandis qu'Alban

LAROUSSE - que nous remercions ici très chaleureusement - a pu les dessiner tout à loisir.

Quelques jours auparavant, le 14 mai, c'est un Bécasseau de Temminck *Calidris temminckii* et 3 Echasses blanches *Himantopus himantopus* qui stationnaient sur ce même site.

DESCRIPTION :

Les observations ont été faites à moins de 50 mètres au télescope en compagnie de Grands Gravelots. Temps couvert, bon éclairage.

Taille, silhouette : sans doute inférieure au Bécasseau variable *Calidris alpina* et apparemment inférieure aux Grands Gravelots et supérieure aux Petits Gravelots *Charadrius dubius* présents sur le site.

Parties nues : Bec assez long, droit avec juste l'extrémité incurvée vers le bas, gris-brun plus foncé à l'extrémité. Pattes assez courtes verdâtres. (bec et pattes pouvant être sales).

Croquis de terrain d'Alban LAROUSSE



Tête : rappelle fortement une Bécassine des marais *Gallinago gallinago*. Sourcil blanchâtre unique à la racine du bec, puis se divisant en deux derrière l'œil (bande supérieure blanche plus étroite que l'inférieure). Bandes noires. Tâche de couleur plus roussâtre derrière l'œil (parotiques).

Plumage : Dessous blanc. Poitrine striée (bande pectorale) avec quelques tâches en forme de flèches se prolongeant sur les flancs. L'un des deux oiseaux est de teinte générale plus claire et avec moins de stries visibles, sans doute plus proche du plumage hivernal.

Dessus deux bretelles blanchâtres sur le manteau brun foncé. Plumes brunes foncées liserées de blanc et quelques-unes plus rousses.

En vol : Bords du croupion blancs, raie médiane noire. Pas de barre alaire observée.

Les principaux guides de déterminations (BEAMAN & MADGE, 1998 ; GEROUDET, 1982 ; HAYMAN, 1986 ; MULLARNEY et al., 1999) ont été consultés pour confirmer la détermination.


Comportement : Les deux oiseaux ont été observés toujours ensemble sur un bassin où étaient également présents des grands et petits Gravelots ;

ils alternaient des séances de nourriture, de toilettage et de longues périodes de repos. Des Chevaliers gambettes *Tringa totanus* et un Pluvier argenté *Pluvialis squatarola* fréquentaient des bassins proches.

STATUT :

Nicheur en Scandinavie et Sibérie, le Bécasseau falcinelle hiverne dans le golfe persique, sur les côtes orientales d'Afrique et surtout en Asie du Sud-Est. Les oiseaux scandinaves migrent vers le sud-est, principalement par les Mers Noire et Caspienne et l'Est de la Méditerranée, la population de Sibérie se dirige plutôt vers la Chine, l'Inde et la Nouvelle-Zélande (GEROUDET, 1982).

En France, l'espèce est observée occasionnellement lors de ses migrations. La plupart des données proviennent du littoral méditerranéen, notamment de la Camargue (environ la moitié des données); les côtes atlantiques et de la Manche regroupent les autres observations, les mentions à l'intérieur des terres étant très marginales (DUBOIS et YESOU 1981).



Croquis de terrain Alban LAROUSSE

Cette espèce est soumise à homologation nationale et pour la période 1981-1998 dans les départements proches on relève les mentions suivantes, d'après la compilation de H. MICHEL :

- en Picardie, département de la Somme (80) :

1 le 25/08/86 à St-Quentin-en-Tourmont (G. Flohart)

- en Normandie, département de la Seine Maritime (76) :

1 le 13/08/83 en Baie de Seine (A. GUILLEMONT, P. SABINE & Y. TREMOUILLE).

1 le 05/05/85 en baie de Seine/Le Havre (A. GUILLEMONT, J. POURREAU & al.).

1 le 14/08/87 au marais du Hode / Le Havre (G. BETEILLE).

1 le 07/05/88 au marais du Hode/Le Havre (G. BAUDOIN & P. DUBOIS).

1 le 10/05/92 au marais du Hode/Gonfreville-l'Orcher (O. BENOIST & al.).

1 ad le 02/05/93 au marais du Hode/Gonfreville-l'Orcher (O. BENOIST).

1 ad le 12/05/97 au marais du Hode/Sandouville (O. BENOIST).

- en région Nord Pas-de-Calais, département du Pas de Calais (62) :

1 le 19/05/89 en baie d'Authie (D. COUSIN).

2 le 28/08/89 en baie de Canche (M. GUERVILLE).


4 ad le 20/09/96 au Platier-d'Oye/Oye-Plage (D. ROSAIR).

1 les 26 et 27/05/98 au Platier d'Oye/Oye-Plage
(A. DRIENCOURT & G. FLOHART).

1 les 24 et 25/07/98 au Platier d'Oye/Oye-Plage
(G. FLOHART).

- département du Nord (59) :

1 ad les 26 et 27/05/96 à Grand-Fort-Philippe
(P.J.DUBOIS, G.FLOHART & al.).




Depuis sa création (1981), et jusqu'en 1998, le Comité d'Homologation National a homologué pour toute la France, 97 données concernant 127 individus. Les données de la migration pré-nuptiale montrent un pic sur la seconde décennie de mai (voir graphique).

Les observations concernent surtout des individus isolés, mais des petits groupes sont parfois notés, surtout au printemps (maxi de 12 en Camargue le 10/05/89 A.ROUGE).

La donnée de l'Oise correspond tout à fait à ce calendrier, rappelant ces autres observations faites sur des sites non côtiers :

1 ad les 18 et 19 mai 1989 à Pithiviers-le-Vieil (Loiret) (CHAVIGNY, SPANNEUT & al)

1 les 17 et 18 mai 1991 au Lac de Madine (Meuse) (BELLARD, ROBERT & al.)



Croquis de terrain Alban LAROUSSE

BIBLIOGRAPHIE :

BEAMAN M. et MADGE S. (1998). *Guide encyclopédique des oiseaux du Paléarctique occidental*. Nathan, Paris. 872 p.

DUBOIS Ph.J. et YESOU P. (1991). *Les Oiseaux rares en France*. Chabaud. Bayonne ; 364 p.

GEROUDET P. (1982). *Limicoles, gangas et pigeons d'Europe*. Delachaux et Niestlé, Neuchâtel Paris. 240p.

HAYMAN P. & al. (1986). *Shorebirds. An identification Guide*. Croom Helm. Londres.

SVENSSON L. MULLARMEY K., ZETTERSTROM D., GRANT P. J.. (1999). *Le Guide ornitho*. Delachaux et Niestlé. Lausanne Paris ; 400p.

Compilation des données CHN de 1981 à 1998 par Hervé Michel sur le site Internet :

<http://perso.wanadoo.fr/michelhp/oiseaux-chn/oiseaux-rares.html>.

Marc SENGEZ et Pierre SENGEZ

8, rue du chauffour

60129 ORROUY

marc.sengez@wanadoo.fr