

Première nidification du Héron cendré  
*Ardea cinerea* dans l'Oise (60).

par Y. LECOMTE

La découverte du nid s'est faite le 26 Novembre 1986 à la chute des feuilles; il est haut perché dans un grand Peuplier. Cette découverte n'est pas une surprise pour nous, des oiseaux ayant été observés cantonnés dans le secteur depuis 2 ans et des juvéniles volants ayant été observés au cours de l'été. Plusieurs fois nous avons repéré le couple de Hérons perché sur cet arbre mais nous ne soupçonnions pas alors sa reproduction si loin de toute colonie (près de 100 kilomètres pour celles de la Somme).

La commune où cette nidification s'est déroulée, Villers Saint-Sépulcre est située à 12 Kilomètres de Beauvais et est proche de Bailleul/Thérain.

Le territoire de ces oiseaux est constitué par la plaine alluviale du Thérain, de ses bras, des rus et ruisseaux ainsi que du bras mort de Villers Saint Sépulcre; de même les bords du ruisseau la Trye qui prend sa source à l'abbaye de Froidmont et qui se jette dans le Thérain à Hermes sont exploités (voir carte). Dans la vallée, les Hérons cendrés se rencontrent aussi sur les grands étangs issus de ballastières aménagées (chasse ou pêche) ou encore en exploitation.

Le bras mort semble très important pour les Hérons; placé à environ 200 mètres du nid il servait de réservoir alimentaire principal et était ainsi bien placé pour le nourrissage des jeunes. Au printemps ce bras accueille le ponte de nombreux Batraciens et ensuite le frai des poissons. Ces ressources ont probablement servi de nourriture de base. Faisant



vis à vis mais de l'autre côté du Thérain, une queue du Grand Etang offre les mêmes avantages et il est aussi bien fréquenté.

La découverte du nid de 1986 nous a incité à exercer une attention soutenue dans ce secteur en 1987. Le couple est vu à chaque sortie pendant la période de Février à Avril, posé dans les champs, prairies et pâtures au Nord-Est de Villers Saint Sépulcre. Pendant ce dernier mois, un oiseau a été observé par deux fois avec une branchette dans le bec.

En Mai et en Juin les oiseaux sont peu visibles, à cause de la végétation très fournie et probablement aussi à cause de la discrétion du couple dans le périmètre du nid.

A partir de Juillet, l'observation de 2 jeunes en vol avec les parents est régulière. En Septembre nous avons observé : 3 fois les 4 individus ensemble, 7 fois 3 ensemble, 8 fois un solitaire.

La partie Ouest du territoire est souvent exploitée par le trio alors que la partie Est l'est plutôt par l'individu seul.

Pour la période de Septembre à début Décembre, 17 observations dont 2 fois 2 individus ensemble, principalement entre Hermes et Hondainville. Pendant l'hiver le nid souffre énormément de tempêtes et se désagrège en grande partie.

Début Mars, 2 observations de 2 adultes près du nid mais depuis, plus de contacts! Etant donné l'état du nid les oiseaux ont-ils abandonné ce secteur?

Par contre en ce printemps 1988, une observation plus constante qu'antérieurement est faite dans le secteur de Rochy-Condé. A suivre...