

NOTE SUR L'OBSERVATION DE BECS-CROISES DES SAPINS  
(*Loxia curvirostra*) DANS LA SOMME AU COURS DE L'ETE 1983.

par L. Gavory

INTRODUCTION

Le Bec-croisé des Sapins (*Loxia curvirostra*) est observé de manière irrégulière dans la Somme ( 14 données en à peu près un siècle) . Cette irrégularité est à mettre en relation avec le phénomène d'éruption que connaît cette espèce. Ce phénomène très complexe est variable dans le temps comme dans l'espace d'où l'étalement des observations et les variations d'effectifs.

Voici en détail les données recueillies:

Au siècle dernier MENEGAUX (1911) fait état de deux captures : 1 femelle juvénile le 18 Septembre 1868 et 1 femelle adulte le 17 Octobre 1887 au Crotoy.

CHOQUART et DAMADE (1913) relatent la destruction d'un femelle en Octobre 1910 à Plachy-Buyon où l'espèce aurait niché.

De nombreuses bandes sont signalées fin Septembre 1927 dans la région de Ault par CHABOT (1928).

En 1935, les 19 et 20 Septembre, LABITTE (1935) note une petite troupe à Saint Valery-sur-Somme et fait état d'un jeune mâle le 20 Septembre en collection.

Plus récemment, ROBERT (1979 b) observe une femelle à Amiens le 14 Octobre 1966.

Dans les années 70, 4 données:

2 individus à Noyelles-sur-mer le 15 Août 1974 et 2 autres à la pointe de Saint Quentin le 1 Novembre 1974 (HOVETTE 1978)

1 est noté par A. BONNEL au P.O.M. en Juillet 1975 puis le 3 Octobre 1976, 9 sont observés dans le Marquenterre (ROYER et SUEUR 1977)

Enfin le 22 Juin 1981 M. CZAJKOWSKI, A. et G. DUHAMEL observent à Quend-plage 1 couple et 2 jeunes, preuve de nidification.

OBSERVATIONS

Au cours de l'été 1983, nous faisons 3 nouvelles observations :  
Le 18 Juin 1983 nous notons 7 individus (femelles ou jeunes et au moins 3 mâles adultes. Ils étaient stationnés dans un petit bois mixte sur la commune de Saint-Sauflieu.

Le 20 Juin, nouvelle observation en compagnie de F.ROUSSET d'une dizaine d'oiseaux (femelles ou jeunes et des mâles adultes) dans un bois de conifères au lieu dit "Camp de César" à la Chaussée-Tirancourt. Ils semblaient venir des environs et étaient d'une approche difficile.

Le 6 Juillet 1983, dernière observation de la série: un couple à la cime d'un épicéa (*Picea* sp.) au cimetière de la Madeleine à Amiens. La femelle est afférée à décortiquer un cône, la tête en bas.

#### DISCUSSION

Ces 3 observations, très rapprochées dans le temps, trahissent l'arrivée plus ou moins massive dans notre région de cette espèce. Cet afflux entre en fait dans le cadre d'une invasion qui touche la Belgique et la France (Anonyme 1983) où la région Nord l'est particulièrement (KERAUTRET 1983). D'après cet auteur, elle a débuté en Juin 1983 et s'est poursuivie au cours de l'automne. Elle a été intense puisqu'en Belgique les effectifs contactés surpassent ceux connus depuis 1975 (Anonyme 1983) et que pour la Somme on constate qu'ils font partie des plus importants jamais enregistrés.

Pour ce qui est des anciennes données : elles sont en majorité effectuées sur le littoral; peut-être est ce du à une pression d'observation plus grande, à une voie d'invasion ou à la présence de nombreux conifères. Elles entrent dans l'intervalle de temps relatif à ce phénomène qui d'après GEROUDET (1974) et YEATMAN (1976) va de Juin à l'automne. De plus on constate que la majeure partie d'entre elles sont de Septembre-Octobre, ce qui coïnciderait avec le pic d'intensité signalé par YEATMAN.

#### CONCLUSION

Pour conclure, nous signalons que le Bec-croisé des Sapins est un oiseau qui peut se reproduire en toute saison et en tout lieu lors de ces invasions et qu'une nouvelle nidification faisant suite à celle de 1981 n'est pas à exclure.

#### REMERCIEMENTS

Nous tenons à remercier Monsieur F. SUEUR pour les éléments de bibliographie qu'il a mis à notre disposition ainsi que pour ses conseils très précieux.

## BIBLIOGRAPHIE

- Anonyme (1983) European news British Birds 76. (12) 566-571
- Chabot F. (1928) Passages de Becs-croisés Loxia curvirostra en 1927. R.F.O. 12-18
- Choquart F. et Damade M. (1913) Extrait des procès verbaux. Bull. Soc. Lin. Nord France 21 (412) 329-333.
- Géroudet P. (1974) Les passereaux d'Europe III. Des Pouillots aux moineaux. Neuchâtel. (Delachaux et Niestlé), 287 p.
- Hovette C. (1978) Données avifaunistiques en Baie de Somme de 1973 à 1976. Documents zoologiques 1 (2) 11-19.
- Kérautret L. (1983) Informations Le Héron (3) 8-10.
- Labitte A. (1935) Sur l'invasion de Bec-croisés de 1935. Nouveaux renseignements. Alauda 7 (4) 573.
- Robert J.C. (1979b) L'avifaune de la vallée des Evoissons. Approche écologique (suite) Documents zoologiques 2 (1) 45-56.
- Royer P. et Sueur F. (1977) Centrale ornithologique G.E.P.O.P. Synthèse des observations 1976. L'Avocette 1 (3-4) 37-60.
- Triplet P. (1981) Les passereaux rares de la Somme. L'Avocette 5 (3-4) 64-68.
- Yeatman L. (1976) Atlas des oiseaux nicheurs de France. Paris (S.O.F.) 283p.

### Note de la rédaction

Notre ami GAVORY avait vu juste dans sa conclusion en laissant supposer l'éventualité d'une nidification suite à cette invasion. H. DUPUICH nous a signalé que son collègue J. LEULLIER avait observé au printemps 1984 un couple de Becs-croisés construisant un nid dans une forêt du sud de l'Oise. Il semble que le nid ait été abandonné par la suite.