

CENTRALE ORNITHOLOGIQUE G.E.P.O.P.

SYNTHESE DES OBSERVATIONS DE L' AISNE EN 1978

Pour la première fois, nous pouvons parler de synthèse de l'Aisne, ayant reçu en nombre des observations couvrant à peu près tout le département de l'Aisne.

Toutefois, certains biotopes restent peu prospectés. La Thiérache est désormais bien couverte, ainsi que Le Laonnois. Les marais de Saint-Boétien sont peu visités, c'est dommage, étant donné leur richesse. Le Vermandois, pourtant prospecté, est absent de cette synthèse.

Nous avons noté plusieurs faits intéressants cette année : en particulier la nidification de la Cigogne blanche dans la vallée de l'Aisne, ainsi que les observations du Petit Chevalier à pattes jaunes près de Laon, du Cincle plongeur sur la vallée de l'Oise, du Pygargue, de la Mouette tridactyle à l'intérieur des terres, enfin celles du Grèbe à cou noir, du Torcol et du Bruant zizi en Thiérache.

L'année 1978 s'avère donc être intéressante. Nous espérons dans les années à venir avoir encore plus de données concernant l'Aisne.

H. Dupuich et F. Sueur

OBSERVATEURS :

J. Bellard (Calidris), P. Biet, R. Blackburn (G.O.N.), S. Boutinot, X. Combecy, C., F. et H. Dupuich, M. Dutoit (G.O.N.), A. Goulliart (G.E.M.O.), P. Grangé (C.O.C.A.), M. Jeanson (P.O.M.), L. Kérautret (G.O.N.), P. Luce, M. Mannecart (P.O.M.), E. Mercier (M.E.P.), E. Novak, P. Pigeon, Y. Ridet (P.O.M.), A. M. Rouvillain, F. et M. Sueur, B. Venet, J. L. Wiart, L. Eloy.

ABREVIATIONS :

M. = mâle
F. = femelle
ad. = adulte
im. = immature
juv. = juvénile
ind. = individu

=====

GREBE HUPPE Podiceps cristatus

Aulnois-sous-Laon : 1 le 1er avril.

Boué : 1 le 5 avril, 2 le 2 août.

Vailly-sur-Aisne et Vénizel : nidification : environ 10 couples
(2 ad./min., 2 grands (juv., 1 ad./1 nid/1 oeuf) le 2 juillet.

Guignicourt : 4 ad. et juv. le 2 juillet, noté le 21 oct.

Villers-en-Prayères : 15 (1 couple parade) le 21 avril, 5 le 14 août.

GREBE A COU NOIR Podiceps nigricollis

1 juv. le 7 août à Boué (H. Dupuich)

GREBE CASTAGNEUX Podiceps ruficollis

Aulnois-sous-Laon (bassins de décantation) : 2 le 25 juin, pas de nidification cette année, 3 le 18 août, 1 le 22 août.

Boué : 1 couple nicheur suivi régulièrement, 5 ind. le 4 avril, 4 le 10, 3 le 29, 2 le 14 mai, 2 les 17 et 18 juin, 1 les 1er et 5 juillet, 2 ad. + 1 im. le 8 août : les plongées sont chronométrées.

Plongée n°	Grèbe 1 (ad.)	Grèbe 2 (ad.)	Grèbe 3 (im.)
1	13 s.	13 s.	7 s.
2	7 s.	8 s.	6 s.
3	13 s.	7 s.	8 s.
4	13 s.	13 s.	6 s.
5	20 s.	4 s.	
6	10 s.	8 s.	

2 ad. + 4 juv. le 9 août, 3 le 14 sept., 9 le 14 oct., 10 le 11 nov., 15 le 17, 11 le 25 nov., 2 les 16 et 27 déc.

Mondrepuis : 1 le 13 avril, Guignicourt : en juillet et en octobre.

HERON CENDRE Ardea cinerea

Aulnois-sous-Laon : 1 le 25 juin, 1 le 10 août.

1 fin sept. à Boué et 1 à Etreu.

1 le 13 juillet à Maizy.

1 le 24 déc. à Le Nouvion-en-Thiérache.

Villers-en-Prayères : 1 le 21 avril, 10 le 14 août.

HERON POURPRE Ardea purpurea

1 le 15 sept. à Saint-Simon (P. Biet).

CIGOGNE BLANCHE Ciconia ciconia

Passages notés au printemps à Montcornet et en avril au Nouvion-en-Thiérache.

1 couple nicheur sur la carte de Craonne : 4 juv. bagués au nid le 13 juillet (voir "L'Avocette" 1978/Nos 2-3-4 p. 75), disparition d'un jeune quelques jours plus tard (P. Pigeon).

OIE CENDREE Anser anser

4 posées le 12 février près de Saint-Quentin.

100 le 20 nov. au Nouvion-en-Thiérache, 25 en vol vers le S. le 1er déc.

TADORNE DE BELON Tadorna tadorna

Boué : 1 de début janvier (présent depuis novembre 1977) jusqu'à fin février, où il fut tué (réf. P. Luce, "viva voce"), 1 ad. le 14 oct., 1 F. le 14 nov.

Aulnois-sous-Laon : 1 M. 1F. les 18 mars et 1er avril, 1 le 21 mai,

1 M. le 12 août, 1 M. 1 F. le 20 nov. (P. Pigeon).

Le nombre des observations à l'intérieur des terres tend à augmenter, ce qui confirme l'efficacité d'une bonne protection.

Remarquons également, qu'il est fait mention d'un couple nicheur sur un bassin de décantation à l'ouest de Saint-Quentin (Aisne) : observation d'1 couple/10 pulli en juin par S. Boutinot (in Alauda).

CANARD COLVERT Anas platyrhynchos

Aulnois-sous-Laon : 25 (dont 3 couples) le 18 mars, 6 (dont 1 couple) le 21 avril, 2 M. 1F. le 6 mai, 1 F. le 25 juin, 4 F. le 26 août, 40 le 5 nov., 3 le 18 déc., 10 le 22.

Boué : nicheur. Observé de janvier à avril, 1 F./12 pulli le 29 avril, 1 F./pulli le 18 juin, 50 le 5 juillet, 34 le 7, 15 le 15 août, 10 le 25 sept., 60 le 29 oct., 25 le 23 déc.

1 M. volant à Englaucourt le 3 avril, 20 le 2 juillet à Bucy-le-Long, 13 le 13 à Maizy, 18 le 14 août à Villers-en-Prayères, présent en déc. à Montceau-sur-Oise (nombreux tirs de chasseurs).

SARCELLE D'HIVER Anas crecca

Passage prénuptial et postnuptial, hivernage remarqué.

Aulnois-sous-Laon : 21 le 18 mars, 130 le 19, 45 le 1er avril, 1 M. 1F. le 15, 30 le 16, 1 le 16 août, 6 le 22, 4 le 26, 8 le 28, 60 le 5 nov. 55 le 28, 70 le 18 déc., 50 le 22.

En l'absence de données, peut-être encore nicheuse sur le Vermandois.

CANARD CHIPEAU Anas strepera

Passage prénuptial faible.

1 F. le 26 mars à Boué (H. Dupuich).

SARCELLE D'ETE Anas querquedula

Passage postnuptial.

Aulnois-sous-Laon : 11 le 16 août, 9 le 28.

2 le 2 août à Boué.

En l'absence de données, peut-être encore nicheuse sur le Vermandois et le Laonnois.

CANARD SOUCHET Anas clypeata

Aulnois-sous-Laon : 2 M. 2 F. le 1er avril, 1 M. le 15, 1 M. 1 F. le 6 mai.

Boué : 1 M. 2 F. du 28 mars au 8 avril, 1 M. les 21 et 22 nov.

Maizy : 1 le 13 juillet.

Marle : 1 M. 1 F. les 2 et 16 avril.

En l'absence de données, peut-être encore nicheur sur le Vermandois et le Laonnois.

FULIGULE MILOUIN Aythya ferina

Aulnois-sous-Laon : 3 M. 1 F. le 18 mars, 1 M. le 20 nov.

Boué : 6 le 18 juin, 1 les 4 et 5 juillet, 2 M. le 27 déc. (hivernant).

FULIGULE MORILLON Aythya fuligula

Passage prénuptial et postnuptial.

Aulnois-sous-Laon : 1 M. 1 F. le 15 avril, les 1er et 6 mai.

Boué : 3 le 9 août, 4 (dont 2 tués) début nov.

Villers-en-Prayères : 1 M. 1 F. le 21 avril.

FULIGULE MILOUINAN Aythya marila

Espèce peu commune à l'intérieur des terres, soit 1 observation :

1 M. le 18 déc. à Boué (P. Luce).

GARROT A OEIL D'OR Bucephala clangula

1 F. le 22 déc. à Aulnois-sous-Laon (P. Pigeon).

BUSE VARIABLE Buteo buteo

Laonnois-Soissonnais :

Forêt de Saint-Gobain : 2 couples le 20 mars, 4 ind. le 17 avril.

1 ind. le 21 avril entre Maizy et Beaurieux.

1 ind. le 30 nov. à Erlon, 1 ind. le 18 déc. à Aulnois-sous-Laon.

Thiérache :

Forêt d'Hirson : 2 ind. les 13 avril et 6 mai.

Forêt du Nouvion-en-Thiérache :

- contacts en avril : à retenir 1 ind. trouvé mort le 30 avril (plumes sectionnées : tir), 1 ind. de la variété claire le 5 avril (parade).

- contacts en mai : à retenir 1 parade le 21 mai.

- contacts en juin : à retenir 3 ind. le 18 juin à l'étang de Boué dont 1 ind. avec une envergure plus petite (1 jeune avec ses parents?), 5 ind. le 25 juin dont 1 couple (1 phase claire + 1 phase foncée) avec comportement de défense de territoire : proximité d'une aire?

- contacts en juillet, août, septembre : 5 le 19 sept., 4 le 29.

- contacts en octobre, nov., déc.

Possibilité de 3 couples nicheurs sur la Queue de Boué malgré des individus tirés durant l'année en dépit de leur protection.

A noter : contacts en nov., déc. à Chigny, Buironfosse, Engancourt (également en avril), La Capelle, Leschelles, Le Grand Wez et présence notée en forêt de Saint-Michel, en forêt de la Haye d'Aubenton et en forêt de Coucy-Basse.

EPERVIER D'EUROPE Accipiter nisus

Localités d'observation :

Aulnois-sous-Laon : mars.

Boué : noté toute l'année, quelques plumées trouvées (dont un ramier en février près de l'étang de Boué et un ramier le 13 avril dans une bétulaie).

1 ind. tué durant l'automne (réf. P. Luce, "viva voce").

1 M. et 1 F. hivernant fin décembre en forêt du Nouvion-en-Thiérache.

Dohis : juin.

Monceau-sur-Oise : observé le 9 déc.

AUTOUR DES PALOMBES Accipiter gentilis

Toujours des ind. migrateurs.

Lerzy : 1 ind. observé en avril (M. Dutoit).

Forêt de Saint-Gobain : 1 ind. le 20 mars (P. Pigeon).

Complément : 1 ind. tué en forêt du Nouvion-en-Thiérache à l'automne 77 (P. Luce).

MILAN ROYAL Milvus milvus

Passages notés en avril et en mai en Thiérache sur Le Nouvion, La Capelle (réf. B. Venet, J. L. Wiart, "viva voce").

MILAN NOIR Milvus migrans

1 ind. le 18 juin à Boué (H. Dupuich).

PYGARGUE A QUEUE BLANCHE Halieetus albicilla

1 im. hivernant à partir du 22 déc. à l'étang de Caulaincourt (S. Boutinot).

BONDREE APIVORE Pernis apivorus

Beaurieux et Maizy : 1 le 13 juillet, d'après ses allées et venues, il semble s'agir d'un nicheur local (J. Bellard, A. Goulliard, M. Jeanson, M. Mannecart, Y. Ridel et F. Sueur).

Forêt de Coucy-Basse : 1 le 13 sept. sur un nid de guêpes (E. Novak).

Forêt du Nouvion-en-Thiérache : 1 les 13 mai et 28 juin (H. Dupuich).

Saint-Simon : 1 le 3 août (P. Biet).

BUSARD DES ROSEAUX Circus aeruginosus

Verneuil-sur-Serre : 2 couples le 16 avril.

raibies données sur cet oiseau.

BUSARD SAINT-MARTIN Circus cyaneus

Aulnois-sous-Laon : 1 M. le 23 août.

Leschelles : 1 M. 1 F. le 26 nov., espèce observée régulièrement en déc. près de Leschelles et Esquéhéries.

Forêt de la Haye d'Aubenton : 1 F. le 18 juin.

Forêt de Saint-Gobain : 1 couple le 15 avril.

Guignicourt : 1 M. le 12 déc.

Cette espèce était peut-être nicheuse à Lerzy en 1977.

BALBUZARD PECHEUR Pandion haliaetus

2 ind. observés durant la migration (pas de date) au Marais de Saint-Boëtien, d'après certaines données, passage noté tous les ans.

FAUCON EMERILLON Falco columbarius

Hivernant toujours rare.

1 le 16 déc. à Boué (H. Dupuich).

FAUCON CRECERELLE Falco tinnunculus

Localités d'observation :

Aulnois-sous-Laon (mars, déc.), Barenton-Cel (nov.), Beautor, Boué (avril, mai, juillet), Buironfosse, Clairefontaine (avril), Chigny (avril, nov.), Esquéhéries, Hermès, La Capelle (avril), Lerzy (3 le 7 déc.), forêt du Nouvion-en-Thiérache (toute l'année), Laon, Origny-Sainte-Benoîte (janvier), forêt de Saint-Gobain (avril), Tergnier, Guignicourt.

Espèce nicheuse en Thiérache, observée régulièrement.

FAISAN DE COLCHIDE Phasianus colchicus

Nicheur sédentaire en forêt du Nouvion-en-Thiérache.

Observation de pulli et de juv. peu volant en juillet.

GRUE CENDREE Grus grus

I le 15 nov. à Montceau-sur-Oise (P. Luce).

4 en vol vers le SW le 28 nov. à Aulnois-sous-Laon (P. Pigeon).

POULE D'EAU Gallinula chloropus

Aulnois-sous-Laon (bassins de décantation) : 4 couples.

Boué :

Cette localité est le siège d'un important stationnement hivernant : 170 le 14 octobre, 180 le 11 nov., min. 400 le 26 nov.

FOULQUE MACROULE Fulica atra

Aulnois-sous-Laon (bassins de décantation) : 2 les 21 avril et 6 mai, 2 ad./1 pullus d'environ 10 jours le 25 juin, 1 le 6 août, 3 le 12, 14 les 16 et 18, 18 le 28, 2 le 3 nov., 3 le 18 déc.

Boué : nicheur certain sur l'étang.

1 ad. au nid le 14 mai, 1 ad./1 pullus le 11 juin, 1 ad./juv./pulli le 1er juillet, 41 le 9 août, 50 le 19 sept., 30 le 19 octobre, 27 le 25 nov., 35 le 16 déc., 20 le 27 déc.

Englancourt : le 3 avril, Guignicourt : en juillet et en octobre.

OUTARDE CANEPETIERE Otis tetrax

1 seule observation : 2 ind. le 1er mai à Flavy-le-Martel (H. Dupuich) dans un champ nu.

Rien ne confirme sa nidification dans le Saint-Quentinois.

VANNEAU HUPPE Vanellus vanellus

Aulnois-sous-Laon : peu noté au printemps : 1 les 19 mars et 1er avril, beaucoup plus abondant lors de la migration postnuptiale : 36 les 26 juin et 10 août, 150 le 12 août, 80 le 22 août, 30 le 5 nov., 60 le 28 nov.

Nicheur à Bercy-le-Long, 30 le 2 juillet.

80 le 30 nov. à Dercy et 120 à Barenton-Cel.

600 le 5 mars à Vaux-Andigny.

GRAND GRAVELO Charadrius hiaticula

Migrateur peu commun.

Aulnois-sous-Laon : 4 le 10 août, 2 le 12, 1 les 26 et 28.

GRAVELOT A COLLIER INTERROMPU Charadrius alexandrinus

Aulnois-sous-Laon : 2 les 26 et 28 août (P. Pigeon).

PETIT GRAVELOT Charadrius dubius

Observations bien suivies. Nicheur dans le Laonnois.

Aulnois-sous-Laon : 3 (les 1ers) le 1er avril, 3 couples le 12, 1 nid/2 oeufs le 6 mai, 1 nid détruit par la pluie le 21, 5 ind. le 3 juin, 1 nid/3 oeufs et 2 pulli d'environ 1 semaine le 25, 3 le 8 août.

Marle : 3 (1ères parades) le 2 avril, 1 couple le 16.

Boué : 1 les 10 et 11 avril.

Bucy-le-Long : 2 alarment le 2 juillet.

BECASSINE DES MARAIS Gallinago gallinago

Migration pré-nuptiale et surtout post-nuptiale.

Aulnois-sous-Laon : 1 le 21 mai, 1 le 6 août, 7 le 10, 4 le 12, 8 le 16, 5 le 18, 18 le 22, 13 le 26, 5 le 28, 60 les 3 et 5 nov., 5 le 12, 2 les 20 et 28.

Boué : 20 le 25 sept., passage important à la fin de ce même mois. 4 le 23 nov., 7 le 27 déc.

Englancourt : 2 le 27 nov.

Marle : 2 le 2 avril, 1 le 16.

Mondrepuis : 1 le 13 avril.

Villers-en-Prayères : 1 le 21 avril.

BECASSINE SOURDE Lymnocryptes minimus

Migratrice assez rare.

1 le 12 avril à Aulnois-sous-Laon (P. Pigeon).

BECASSE DES BOIS Scolopax rusticola

1 le 29 oct. à Guivry.

1 le 26 nov. en forêt du Nouvion-en-Thiérache.

COURLIS CENDRE Numenius arquata

Aulnois-sous-Laon : 1 ind. le 1er avril.

En l'absence totale de données, rien ne confirme sa présence comme nicheur dans les marais de Saint-Boétien.

CHEVALIER ARLEQUIN Tringa erythropus

Boué : 1 le 13 avril.

Aulnois-sous-Laon : 5 le 30 avril, 4 le 6 mai.

CHEVALIER GAMBETTE Tringa totanus

Aulnois-sous-Laon : 2 les 21 et 30 avril, 2 le 6 mai, 15 le 21, 10 le 10 août, 3 le 12, 1 les 16 et 22;

Boué : 1 le 10 avril, 2 les 11 et 12.

Marle : 1 le 2 avril, 10 le 16.

CHEVALIER ABOYEUR Tringa nebularia

Aulnois-sous-Laon : 4 le 21 mai, 5 le 10 août, 2 le 12, 4 le 16, 2 le 22.

Boué : 1 les 12 et 13 avril, 1 le 25 sept.

Maizy : 1 le 13 juillet.

PETIT CHEVALIER A PATTES JAUNES Tringa flavipes

Observation exceptionnelle :

soit 1 ind. identifié le 3 juin par P. Pigeon sur un bassin de décantation de la sucrerie d'Aulnois-sous-Laon (existence d'un document photographique).

Il s'agit de la 7ème mention pour la France.

CHEVALIER CULBLANC Tringa ochropus

Aulnois-sous-Laon : 2 le 18 mars, 2 le 1er avril, 1 les 12 et 15,
2 les 21 et 30, 2 le 1er mai, 7 le 25 juin, 2 le 6 août,
3 le 8, 4 le 10, 3 le 12, 1 le 22, 3 les 5 et 12 nov.,
5 le 20, 1 le 28.
Boué : 1 les 11 et 12 avril, 8 le 13, 2 les 20 et 21 nov.
Marle : 9 le 2 avril, 7 le 16.
1 le 2 juillet à Bucy-le-Long, 1 sur une gravière dans la vallée
de l'Aisne à l'Est de Soissons,

CHEVALIER SYLVAIN Tringa glareola

Aulnois-sous-Laon : 4 le 6 août, 8 les 10 et 12, 6 le 18, 5 le 22.
Boué : 2 le 25 septembre.

CHEVALIER GUIGNETTE Tringa hypoleucos

Aulnois-sous-Laon : 2 le 30 avril, 5 le 1er mai, 3 le 6, 6 le 21,
1 le 25 juin, 45 le 6 août, 30 le 8, 35 le 10, 15 le 12,
12 le 16, 10 le 18, 8 les 22, 26 et 28.
Boué : 6 le 5 avril, 5 les 11 et 12, 1 le 29, 2 le 21 mai.
Villers-en-Prayères : 1 le 14 août.
Dernière observation : le 25 nov. à Boué.

BECASSEAU VARIABLE Calidris alpina

Aulnois-sous-Laon : 3 le 3 juin, 1 le 25, 1 le 16 août.

COMBATTANT Philomachus pugnax

Aulnois-sous-Laon : 1 le 30 avril, 4 le 6 mai, 1 M. 1 F. le 6 août,
1 les 10 et 16, 1 M. 1 F. le 12 nov.
Marle : 1 M. le 2 avril.

AVOCETTE Recurvirostra avosetta

Aulnois-sous-Laon : 1 le 6 mai (P. Pigeon).
Boué : 1 le 29 mars (P. Luce).

MOUETTE RIEUSE Larus ridibundus

Aulnois-sous-Laon : observée après la période de nidification,
9 le 3 juin, 45 le 25, 8 le 6 août, 3 le 16.
Boué : notée en mars et en avril.
Des mouvements de retour au dortoir observés en fin de jour-
née (vers W ou SW) en septembre et novembre. S'agit-il du
dortoir de Cléry-sur-Somme (80) ? d'un dortoir plus proche ?
2 le 10 déc. dans le sens inverse à
Encore notée en avril le long de l'Aisne : 20 le 21 entre Beau-
riex et Maizy. Guignicourt : alarme le 2 juillet : pulli ?

MOUETTE TRIDACTYLE Rissa tridactyla

1 trouvée morte à Lesquielles-Saint-Germain et naturalisée
(réf. P. Luce, "viva voce").

GUIFETTE NOIRE Chlidonias niger

1 le 21 mai à Boué, 2 le 12 août à Aulnois-sous-Laon.
Peu nombreuse en migration.

PIGEON RAMIER Columba palumbus

Aulnois-sous-Laon : 550 le 28 nov.
Forêt du Nouvion-en-Thiérache : présent toute l'année, très
abondant le 28 oct.

TOURTERELLE DES BOIS Streptopelia turtur

Aulnois-sous-Laon : 6 (Ières) le 6 mai, 40 le 6 août.

TOURTERELLE TURQUE Streptopelia decaocto

Nicheuse commune dans tout le département.

COUCOU GRIS Cuculus canorus

Iers observés : I le 13 avril à Mondrepuis, I le 15 avril en forêt de Saint-Gobain, min: de 8 chanteurs sur 6 kms de voie ferrée et I ind. à l'étang de Boué le 14 mai.
Guignicourt : 3 ind. notés le 2 juillet.

HIBOU MOYEN-DUC Asio otus

I le 16 avril à Aulnois-sous-Laon.

CHOUETTE CHEVECHE Athene noctua

Signalée dans la vallée de l'Oise (avril).
I nid/3 oeufs dans un vieux pommier le 21 mai à Aulnois-sous-Laon.
I le 16 nov. entre Hirson et Landouzy-la-Ville.

CHOUETTE HULOTTE Strix aluco

Présente en forêt du Nouvion-en-Thiérache où elle niche.
Entendue pendant tout le printemps.

CHOUETTE EFFRAIE Tyto alba

Signalée au Nouvion-en-Thiérache.
Mais encore peu de données.

MARTINET NOIR Apus apus

30 (Iers) le 1er mai à Aulnois-sous-Laon.

MARTIN-PECHEUR Alcedo atthis

Localités d'observation :
Maizy (juillet), Guignicourt : I ind. le 21 oct.
Boué (août, nov.)
Peu de données.

HUPPE FASCIÉE Upupa epops

I le 12 avril à Hirson.
Signalée : sud d'Hirson durant le printemps. Peut-on penser à l'existence d'un petit noyau dans cette région.?

PIC VERT Picus viridis

Nicheur en forêt du Nouvion-en-Thiérache.

PIC NOIR Dryocopus martius

I loge dans un hêtre mort le 15 avril en forêt de Saint-Gobain,
I autre loge creusée dans le même arbre le 19, cris entendus dans les environs ce jour-là (P. Pigeon).

PIC EPEICHE Dendrocopos major

signalé en forêt du Nouvion-en-Thiérache : I M. I F. en comportement territorial et poursuite le 13 avril.

PTC EFFICHETTE Dendrocopos minor

Cette espèce non indiquée par "l'Atlas des Oiseaux nicheurs de France" sur la carte de Guise est notée par deux groupes d'observateurs le 13 avril en forêt du Nouvion-en-Thiérache dont I F. bien cantonnée.

Non indiquée auparavant sur la carte d'Hirson, une observation le 13 avril à Mondrepuis en bordure de la forêt d'Hirson.

Dans les deux cas, il peut s'agir de nicheurs possibles voire probables.

TORCOL FOURMILIER Jynx torquilla

I le 30 avril au Nouvion-en-Thiérache.

ALOUETTE DES CHAMPS Alauda arvensis

peu commune dans le bocage de la Thiérache.

Commune sur les champs et les régions cultivées.

HIRONDELLE DE RIVAGE Riparia riparia

Ières : 2 le 21 avril entre Beaurieux et Maizy.

Plusieurs le 21 mai à Boué.

Plusieurs colonies dans les gravières de la vallée de l'Aisne à l'est de Soissons, à Guignicourt (juillet).

HIRONDELLE DE CHEMINEE Hirundo rustica

Ières : le 29 mars à Boué.

Aperçu du déroulement de la migration prénuptiale donné par quelques dénombrements à Aulnois-sous-Laon (bassins de décantation) :

8 le 12 avril, 40 le 15, 100 le 1er mai.

Dernière observation notée : début nov. au Nouvion-en-Thiérache.

HIRONDELLE DE FENETRE Delichon urbica

Ières : le 27 mars à Boué.

Dernières : le 29 septembre à Boué.

PIPIT DES ARBRES Anthus trivialis

Iers : 10 le 17 avril en forêt de Saint-Gobain.

Espèce commune en forêt du Nouvion-en-Thiérache.

PIPIT FARLOUSE Anthus pratensis

Bien plus rare que l'espèce précédente en Thiérache.

Début d'hivernage à Boué : 1 les 11 et 17 nov., 1 le 16 déc.,

1 le 27.

BERGERONNETTE PRINTANIERE Motacilla flava

Ières : le 2 avril à Marle.

Espèce commune à Boué, Guignicourt (M. + juv. le 2 juillet).

BERGERONNETTE DES RUISSEAUX Motacilla cinerea

Non indiquée sur la carte de Guise par "l'Atlas des Oiseaux nicheurs de France", signalée comme nicheuse possible dans deux localités : Boué et Mondrepuis; deux autres localités étaient indiquées en 1977 (voir l'Avocette 1978/nos 2-3-4 page 68).

BERGERONNETTE GRISE Motacilla alba

M. a. alba : nicheuse présente toute l'année.

M. a. yarrelli : I le 5 avril à Boué (H. Dupuich).

PIE-GRIECHE GRISE Lanius excubitor

I le 15 mai à Tergnier.

Nicheuse en forêt du Nouvion-en-Thiérache (non indiquée sur la carte de Guise par "l'Atlas des Oiseaux nicheurs de France").

I im. de la sous-espèce excubitor trouvée morte le 18 nov. au Nouvion-en-Thiérache. 1 ind. très clair le 26 Déc. Nouvion en Thiérache.

PIE-GRIECHE ECORCHEUR Lanius collurio

2 le II juin à Dohis (P. Grangé).

I ind. en juillet en forêt de Coucy-Basse, peut-être s'agit-il d'un nicheur local ?

CINCLE PLONGEUR Cinclus cinclus

Observé au printemps en forêt d'Hirson (Prud'homme).

Hivernant sur la vallée de l'Oise en limite des départements de l'Aisne et du Nord.

D'où probabilité d'une nidification dans ce secteur.

TROGLODYTE Troglodytes troglodytes

Espèce présente toute l'année, très commune en forêt du Nouvion-en-Thiérache.

ACCENTEUR MOUCHET Prunella modularis

Espèce présente toute l'année.

Nicheur noté

TRAQUET PATRE Saxicola torquata

Ier : le 18 mars à Aulnois-sous-Laon.

Dernier : le 26 sept. à Boué.

TRAQUET MOTTEUX Oenanthe oenanthe

Ier : I M. le 19 mars à Aulnois-sous-Laon.

Migration de printemps jusqu'au 16 avril : I M. à Marle.

Migration d'automne à partir du 23 août (I ind. à Aulnois-sous-Laon).

ROUGEQUEUE NOIR Phoenicurus ochruros

Iers : 4 le 12 avril à Aulnois-sous-Laon.

Nicheur à Boué.

Dernier : le 23 nov. à Boué.

ROUGEQUEUE A FRONT BLANC Phoenicurus phoenicurus

Nicheur à Boué.

ROUGEGORGE Erithacus rubecula

Nicheur commun, présent toute l'année.

ROSSIGNOL PHILOMELE Luscinia megarhynchos

Ier : le 21 avril entre Beaurieux et Maizy.

Nicheur à Boué.

GRIVE LITORNE Turdus pilaris

Ières : le 26 nov. en Thiérache.

Bien observée en hivernage.

MERLE A PLASTRON Turdus torquatus

I ind. le 14 mai au Nouvion-en-Thiérache, I début déc.

MERLE NOIR Turdus merula

Nicheur commun.

GRIVE MUSICIENNE Turdus philomelos

Nicheuse commune.

GRIVE MAUVIS Turdus iliacus

Ières : le 26 nov. en Thiérache.

Dernière : le 5 avril en forêt du Nouvion-en-Thiérache.

GRIVE DRAINE Turdus viscivorus

Nicheuse un peu moins commune que la Grive musicienne.

BOUSCARLE DE CETTI Cettia cetti

Nicheuse probable à Boué.

LOCUSTELLE LUSCINIOIDE Locustella luscinioides

Ières : le 21 avril entre Beaurieux et Maizy.

Signalée également à Boué : I ind. chanteur le 17 juin.

LOCUSTELLE TACHETEE Locustella naevia

Ière : I chanteur le 19 avril en forêt de Saint-Gobain, 6 le 29.

Signalée à Boué : I chanteur le 21 mai, I le 18 juin.

PHRAGMITE DES JONCS Acrocephalus schoenobaenus

Iers : 3 le 20 avril à Verneuil-sur-Serre.

Espèce peut-être nicheuse à Boué (P. Luce).

ROUSSEROLLE VERDEROLLE Acrocephalus palustris

I ind. le 21 mai à Aulnois-sous-Laon.

ROUSSEROLLE EFFARVATTE Acrocephalus scirpaceus

Aulnois-sous-Laon : I ad./I nid/2 oeufs le 6 août, nid abandonné
6 jours plus tard.

Boué : comportements territoriaux le 21 mai, I ad./4 juv. peu
volants le 30 juin, I juv. le 7 juillet, dernière le 25
septembre.

Bucy-le-Long : chanteurs le 2 juillet (bassin de décantation).

ROUSSEROLLE TURDOIDE Acrocephalus arundinaceus

Signalée près de Saint-Quentin au printemps (Etang de Ribécourt).

HYPOLAIS ICTERINE Hippolais icterina

Observée pendant la période de reproduction en forêt du Nouvion-
en-Thiérache.

HYPOLAIS POLYGLOTTE Hippolais polyglotta

I chanteur le 22 mai sur une plantation de peupliers en forêt du
Nouvion-en-Thiérache.

J. Mouton fixe la limite Nord de cette espèce quelques kilomètres
plus au Nord (J. Mouton, observation de l'Hypolaïs polyglotte dans
le Nord et Pas-de-Calais - "Le Héron" p. 70 à 74).

FAUVETTE DES JARDINS Sylvia borin

ière : le 29 avril en forêt de Saint-Gobain.

Nicheuse commune.

FAUVETTE A TETE NOIRE Sylvia atricapilla

ière : le 26 mars à Boué.

Nicheuse commune.

FAUVETTE BABILLARDE Sylvia curruca

ière : le 13 avril en forêt du Nouvion-en-Thiérache.

FAUVETTE GRISETTE Sylvia communis

ières : 8 le 29 avril en forêt de Saint-Gobain.

POUILLOT FITIS Phylloscopus trochilus

Iers : le 5 avril à Boué.

Dernier : I chanteur le 23 nov. (P. Luce).

POUILLOT VELOCE Phylloscopus collybita

Ier : le 9 mars à Aulnois-sous-Laon.

Signalé plus tard en Thiérache : Ier le 26 mars.

Boué : I le II nov. et I le 10 déc.

POUILLOT SIFFLEUR Phylloscopus sibilatrix

I chanteur le 14 mai en forêt du Nouvion-en-Thiérache.

ROITELET TRIPLE-BANDEAU Regulus ignicapillus

ROITELET HUPPE Regulus regulus

Hivernants très nombreux en nov. et en déc.

GOBEMOUCHE GRIS Muscicapa striata

Signalé au printemps en Thiérache.

MESANGE A LONGUE QUEUE Aegithalos caudatus

I avec la tête blanche le 30 avril à Boué.

I troupe de 20 ind. le 18 nov. au Nouvion-en-Thiérache.

MESANGE NOIRE Parus ater

I le 13 avril à Boué, I le 25 déc. en forêt du Nouvion-en-Thiérache.

I le 25 déc. en forêt du Nouvion-en-Thiérache.

MESANGE NONNETTE Parus palustris

Nicheuse commune.

MESANGE BOREALE Parus atricapillus

Nicheuse commune.

MESANGE HUPPE Parus cristatus

I chanteur le 5 avril en forêt du Nouvion-en-Thiérache.

Est avec la Mésange noire la moins commune des Mésanges.

MESANGE BLEUE Parus caeruleus

Nicheuse commune.

MESANGE CHARBONNIERE Parus major

Nicheuse commune.

SITTELLE TORCHEPOT Sitta europaea

Des chanteurs signalés en forêt du Nouvion-en-Thiérache et à Mondrepuis en bordure de la forêt d'Hirson.

GRIMPEREAU DES JARDINS Certhia brachydactyla

I le 3 avril à Chigny.

I le 14 mai en forêt du Nouvion-en-Thiérache.

BRUANT PROYE Emberiza calandra

Peu commun en Thiérache.

BRUANT JAUNE Emberiza citrinella

Commun en Thiérache.

BRUANT ZIZI Emberiza cirrus

I M. les 5 et 30 avril entre Le Nouvion-en-Thiérache et Boué (voir l'Avocette 1978/nos 2-3-4 p. 80-81).

Aucune donnée sur le sud de l'Aisne.

Le statut de cette espèce dans l'Aisne est malconnu, et plus particulièrement sa limite de répartition.

BRUANT DES ROSEAUX Emberiza schoeniclus

Bassins de décantation de sucrerie : 3 couples à Aulnois-sous-Laon,
10 couples à Marle.

Boué : commun en avril pourtant hivernant peu commun en ce lieu.

PINSON DES ARBRES Fringilla coelebs

Relativement peu abondant en forêt du Nouvion-en-Thiérache.

PINSON DU NORD Fringilla montifringilla

Aulnois-sous-Laon : dernier le 18 mars, 10 le 5 mars, 20 le 20,
25 le 28.

Forêt de Coucy-Basse : I M. le 6 juin

VERDIER Carduelis chloris

présent toute l'année.

CHARDONNERET Carduelis carduelis

Nicheur (Buironfosse...), importants passages en Thiérache en octobre-novembre.

LINOTTE MELODIEUSE Carduelis cannabina

présente toute l'année.

SERIN CINI Carduelis serinus

I le 26 juin au Nouvion-en-Thiérache.

BOUVREUIL PIVOINE Pyrrhula pyrrhula

Nombreux ind. le 25 nov.

GROS-BEC Coccothraustes coccothraustes

2 le 13 avril en forêt du Nouvion-en-Thiérache.

Gros hivernage en déc., I le 31 déc. sur le rebord d'une fenêtre de
H. L. M. au Nouvion-en-Thiérache (J. L. Wiart).

2 le 19 avril en forêt de Saint-Gobain.

MOINEAU DOMESTIQUE Passer domesticus
Nicheur très commun.

MOINEAU FRIQUET Passer montanus
Nicheur présent toute l'année en forêt du Nouvion-en-Thiérache,
(bétulaies principalement).

ETOURNEAU SANSONNET Sturnus vulgaris
Nicheur commun.

LORIOT D'EUROPE Oriolus oriolus
Iers : 2 le 1^{er} mai à Aulnois-sous-Laon, 1 ind. le 2 juillet à Guignicourt.
Dernier : le 28 août à Aulnois-sous-Laon.
Entendu en forêt du Nouvion-en-Thiérache au printemps et en été.

GEAI DES CHENES Garrulus glandarius
Une migration nette est notée en Thiérache le 14 octobre :
- nombreuses troupes en vol vers le sud à Boué : 10 ind. en 15 minutes.
- 30 ind. en vol vers le sud dans un bocage aux environs du Nouvion-en-Thiérache.

PIE BAVARDE Pica pica
Redevenue commune en Thiérache.

CHOUCAS DES TOURS Corvus monedula
Nicheur commun. En bande janvier, février, nov., déc.

CORBEAU FREUX Corvus frugilegus
Nombreuses colonies :
- 13 couples entre Barenton-sur-Serre et Mortiers.
- 16 couples entre Chalandry et Mortiers.
- 16 couples à Chigny.
- 24 couples entre Erlon et Marcy-sous-Marle.
- 45 couples près de Monceau-le-Neuf.
- 1 colonie à Mondrepuis.
- environ 20 couples à Saint-Quentin.

CORNEILLE NOIRE Corvus corone
Nicheuse commune.