



Le PIC MAR

Revue du Groupe d'Études ORnithologiques de l'Oise



SOMMAIRE

numéro 7

Synthèse 1998 des observations ornithologiques dans l'Oise

AVRIL 2000

- 5 • Du Plongeon catmarin à la Cigogne blanche
FRANCK SPINELLI

- 9 • Du Cygne tuberculé à la Bernache du Canada
WILLIAM MATHIOT

- 10 • Du Tadome casarca l'Eristature rousse
JÉRÔME VOTTE

- 15 • De la Bondrée apivore au Faucon pèlerin
HENRI DE LESTANVILLE

- 18 • De la Perdrix rouge à la Caille des blés
FRANCK SPINELLI

- 19 • Du Râle d'eau au Chevalier guignette
CÉDRIC LOUVET

- 24 • De la Mouette pygmée à la Guifette noire
WILLIAM MATHIOT

- 28 • Du Pigeon colombin à la Perruche ondulée
JEAN-PHILIPPE BONNEL

- 29 • De l'Effraie des clochers à la Chevêche d'Athéna
HENRI DE LESTANVILLE

- 29 • De l'Engoulevent d'Europe au Pic épeichette
JEAN-PHILIPPE BONNEL

- 32 • Passereaux.
MARC ET PIERRE SINGEZ



GEOR 60

Le Pic mar est édité par le Groupe d'Études Ornithologiques de l'Oise

Association loi 1901

2, rue de Pierrefonds - Pondron - 60127 MORIENVAL

Tél. 03 44 88 61 51 - E Mail geor60@WANADOO.fr

Directeur de la publication : Franck Spinelli

Comité de relecture : Yves Bas, Henri de Lestanville, Anne et Cédric Louvet, William Mathot, Marc et Pierre Sengez, Franck Spinelli.

Illustrations : voir annotations. Couverture : Cédric Louvet.

Conception et mise en page : Anne et Cédric Louvet

Tirage : 120 exemplaires - **prix d'un numéro :** 35 Francs

Dépot légal : Préfecture de l'Oise - FR ISSN 1269-1194

Pour les rédacteurs d'article, note ou récit pour le PIC MAR :

nous vous demandons de transmettre vos écrits sur support informatique sans mise en page sur disquette 3.5" en format *.doc (document WORD), accompagnée d'un tirage papier.

Appel aux dessinateurs : nous avons besoin de dessins pour illustrer les prochains numéros.

Merci de les envoyer sur papier à l'adresse suivante :

Anne et Cédric LOUVET

464B, rue du Docteur Chopinet

60320 BÉTHISY-SAINT-PIERRE

INTRODUCTION

Le fait marquant de cette année restera l'observation de limicoles rares et exceptionnels dans l'Oise. En tête viennent le Vanneau sociable et le Pluvier guignard de Vauciennes, suivis par le Bécasseau tacheté, le Gravelot à collier interrompu et le Bécasseau sanderling. Les plans d'eau régulièrement prospectés nous ont également offert leur lot d'anatides : Macreuse brune, Eider à duvet, Fuligules nyroca, milouin, à bec cerclé, hybride milouin x morillon, Erismature rousse.

Viennent s'ajouter à cette liste le Plongeon imbrin et des Laridés peu communs à rares (Sterne caspienne, Mouette tridactyle, Guifette moustac). Le nombre croissant d'observations de certains échassiers (Cigognes noires et blanches, Aigrette garzette, Grande aigrette) ne nous fera pas oublier le statut plus précaire d'autres espèces (Butor étoilé, Blongios nain, Râle des genêts).

Côté Passereaux, on retiendra cette année que la famille des Motacillidés a été bien représentée : Bergeronnettes *ssp thunbergi*, *yarrellii*, *flavissima* et Pipit à gorge rousse. De plus, on a observé le Merle à plastron en nombre. On notera aussi les données d'Hypolaïs icterine, Sizerin flammé et de Bec-croisé des sapins...

Liste des observateurs : Jérôme et Martial Votte (JMV), Pierre et Marc Sengez (PMS), Jean-Luc Barailler (JLB), Yves Bas (YB), Philippe Giovanni (GP), Jean-Philippe Bonnel (JPB), Claude Guyot (CG), Arnaud le Kervern (ALK), Alain Rouge (AR), Michel Richard (MR), Eric Cordier (EC), Franck Spinelli (FS), Pascal Malignat (PM), Rémi Baradez (RB), Didier Sénécal (DS), Daniel Mure (DM), Catherine Walbecque (CW), René Damery (RD), Alain Dacheux (AD), Yves Langlet (Yla), Henri de Lestanville (HdeL), Patricia Bourgoïn (PB), Stephan Carbonnaux (SC), Jean -Pierre Charlier (JPC), Rémi François (RF), Dominique Delville (DD), Jean-Paul Fagard (JPF), Jean-Marie Gerner (JMG), Marie-Christine Jukowski (MCJ), Cédric Louvet (CL), Pascal Maire (PM), Jean-Bernard Marque (JBM), William Mathot (WM), Marie-Odile Perret (MOP), Jean-Charles Becker (JCB), Denis Laurent (DL), Frédéric Bouchinet (FB) et tous ceux que nous aurions oubliés qu'ils veuillent bien nous en excuser.

* : Donnée non validée par le Comité d'Homologation Départemental faute de fiche.

Erratum : Dans le Pic mar n°6 page 23, il faut lire : "De plus, ce rapace a été observé...sauf en Juin en Baie de Somme (P. Carruette, com. pers). Par ailleurs, nous vous demandons de bien vouloir nous excuser pour les inversions de quelques nombres dans les tableaux de recensement WI.

Abréviations : cple : couple, chtr : chanteur, FDC : Forêt Domaniale de Compiègne.

RÉDACTEUR : FRANCK SPINELLI

PLONGEON CATMARIN. *Gavia stellata*.

Pas de donnée dans l'Oise en 1998. La dernière observation dans notre département remonte à 1995 sur le site de Moru (1 individu qui a hiverné du 09/11/1994 au 08/05/1995).

PLONGEON ARCTIQUE (CHD). *Gavia arctica*.


Totalité des observations de 1998 :

- Verneuil-en-Halatte : 1 juvénile le 10/01/98 (JPB, CG)* puis 2 juvéniles le 21/01/98 (YB).

PLONGEON IMBRIN (CHD). *Gavia immer*.

Après une série d'observations en 1997, c'est la deuxième fois qu'un Plongeon imbrin est observé dans le département de l'Oise. Cette fois, il s'agit d'un adulte qui a séjourné du 30/10/98 au 05/11/98 sur le site de Moru (YB, CL).

- Moru : 1 individu les 04 et 05/11/98 (JPF)*.



Plongeon morin. C'est le LOUVE.

GRÈBE HUPPÉ. *Podiceps cristatus*.

Cette espèce est commune sur la plupart des plans d'eau de notre département. En 1998 l'espèce a été observée sur les sites suivants : Angy, Attichy, Bailleul sur Thérain, Boran sur Oise, Chantilly, Chevières, Couloisy, étang de Touthoie, étangs de Commelles, étangs de Saint-Pierre, étangs du Carandeu, étangs du Buissonnet, gravières du Pont de Berne, Gouvieux, Longueil-Sainte-Marie, Mello, Morlincourt, Moru-Pontpoint, Pierrefonds, Pimprez, Royaumont, Sacy-le-grand, Saint-Leu d'Esserent, Trosly-Breuil, Verberie, Verneuil-en-Halatte. L'espèce est notée nicheuse dans de nombreuses localités. A noter la présence relativement tardive d'un juvénile non volant le 17/09/98 aux gravières de Verberie (FS). En hivernage, les effectifs les plus importants sont atteints sur les sites de :

- Moru-Pontpoint : 138 le 07/11/98 (AR), 96 le 03/11/98 (CL), 93 le 15/11/98 (CL)

- Verneuil-en-Halatte : 46 le 25/01/98 (YB), 35 les 04 et 14/02/98 (YB)

- Pimprez : 26 le 28/01/98 (MR)


GRÈBE JOUGRIS (CHD). *Podiceps grisegena*.

Comparées aux deux années précédentes, les observations ont été peu nombreuses en 1998. La totalité des données 1998 provient des sites suivants :

- Boran sur Oise : 1 adulte en plumage intermédiaire le 18/11/98 (YB)

- Moru-Pontpoint : 1 adulte le 02/09/98 (JMV)*

- Verneuil-en-Halatte : 1 adulte le 15/03/98 (HdeL)*



Grèbe jougris. William MATHOT.

GRÈBE CASTAGNEUX. *Tachybaptus ruficollis*.

Cette espèce commune dans notre département a été observée dans de nombreuses localités : Bailleul sur Thérain, Boran sur Oise, Breuil le Sec, Chantilly, Chevières, Couloisy, étangs de Saint-Pierre, étang de Sainte-Périne, étang de Fleury, étangs de Commelles, FDC (parcelle 531), Grandvilliers, Longueil-Sainte-Marie, Mello, Mont l'Evêque, Morlincourt, Moru-Pontpoint, Tutevoie, Vauciennes, Verberie, Verneuil-en-Halatte.

Bien que relativement discrète, l'espèce a été notée nicheuse sur de nombreux sites.

Les effectifs les plus importants ont été comptabilisés sur les sites de :

- Chevières : 30 le 10/09/98 (AR) puis 23 le 17/10/98 (AR).
- Verberie, "La Corroie" : 22 le 31/08/98 (JPF).

GRÈBE À COU NOIR. *Podiceps nigricollis*.

Cette espèce est observée de plus en plus régulièrement dans notre département, en hivernage comme en période de reproduction. De même que les années précédentes la nidification n'a été notée "certaine" que sur le site de Chevières avec au moins 4 couples nicheurs (10 juvéniles et 2 pulli ont été observés simultanément) (AR, PM, RB, DL).

Sur les autres sites :

- Deux juvéniles ont été observés à Houdancourt le 25/08/98 (PMS). La proximité avec le site de Chevières laisserait penser que ces deux individus en sont issus.
- Un juvénile a également stationné du 22/08/98 au 20/09/98 sur le site de Vauciennes, sans qu'une nidification n'ait pu être prouvée (HdL, PMS, CL)
- Quant au site de Moru-Pontpoint, aucune nidification n'a pu être prouvée malgré la présence d'individus en plumages nuptiaux dans le courant du mois d'avril 98 (AR, PM, RB, DS, YB, CW).

A noter également deux observations en début d'hivernage (03/10/98) aux bassins de décantation de Grandvilliers (GP). 1 le 16/10 à Houdancourt (WM).

GRÈBE ESCLAVON. *Podiceps auritus*.

Aucune observation de Grèbe esclavon dans l'Oise en 1998. Ces trois dernières années (1995 à 1997) l'espèce avait pourtant été notée à chaque fois dans notre département et plus particulièrement pendant l'hiver 96/97.

GRAND CORMORAN. *Phalacrocorax carbo*.

Cette espèce se rencontre désormais de plus en plus régulièrement en période d'hivernage. Les plus gros effectifs (supérieurs à 50) ont été notés sur les sites suivants :

- Moru-Pontpoint : 302 le 08/01/98 (PMS), 170 le 01/02/98 (JMV), 169 le 21/11/98 (YB), 152 le 07/01/98 (JPF), 140 le 13/11/98 (JPF)
- Verberie : 250 le 10/01/98 (JPB, CG)
- Sacy-le-grand : 190 le 20/03/98 (ALK)
- Chevières : 85 le 11/10/98 (AR), 81 le 20/03/98 (WM), 60 le 13/02/98 (WM)
- Longueil-Sainte-Marie : 80 le 15/03/98 (MOP)
- Trosly-Breuil : 70 le 03/02/98 (JMV)

- Houdancourt : 67 le 13/03/98 (PMS), 59 le 22/12/98 (YB), 50 le 10/01/98 (DL)
- Sacy le Petit : 57 le 17/03/98 (FS)
- Morienvil : 56 le 25/10/98 (JPB, CG)
- Beaurepaire : 54 le 25/01/98 (YB)
- Verneuil-en-Halatte : 51 le 15/03/98 (HdeL)

Malgré des observations répétées en période de reproduction dans notre département, la nidification n'a pu être prouvée que sur le site de Chevières : 7 adultes, 7 juvéniles et 2 pulli observés en juillet et août 1998 (PM).

BUTOR ÉTOILÉ. *Botaurus stellaris*.

Comme pour les années précédentes, la grande majorité des données provient du marais de Sacy-le-Grand. Les observations sont réalisées essentiellement en période de reproduction (ALK, PM, RB, YB, FS, JLB). A chaque fois, un seul individu a été entendu. A noter également une observation en période hivernale toujours à Sacy le Grand : 1 en vol le 14/01/98 (ALK). En 1998, l'espèce a été contactée en dehors du marais de Sacy : 1 le 21/11/98 à l'étang de Toutevoie (YB).

BLONGIOS NAIN. *Ixobrychus minutus*.

Comme pour le Butor étoilé, le marais de Sacy-le-Grand constitue certainement le dernier refuge du Blongios nain dans le département de l'Oise. En 1998, la totalité des données provient de ce site (ALK, PM, RB, JLB, FS). En dehors d'un comptage simultané sur l'ensemble du marais, il est difficile de pouvoir estimer la population de Blongios nain qui fréquente ce marais en période de reproduction. La plupart des observations ne concerne qu'un seul individu sauf le 23/06/98 (2 mâles - ALK) et le 20/06/98 (1 couple + 2 mâles - ALK).

BIHOREAU GRIS. *Nycticorax nycticorax*.

Une seule observation en 1998 dans un endroit pour le moins surprenant (1 en vol le 26/05/98 en FDC au carrefour de l'étoile de la Reine - JLB). Il s'agit de la septième donnée pour le département de l'Oise et de la troisième pour le mois de mai qui semble correspondre au point culminant de la migration prénuptiale dans notre département.

AIGRETTE GARZETTE. *Egretta garzetta*.

Une seule observation de cette espèce en 1998 qui est notée régulièrement dans l'Oise en période de migration postnuptiale (celle-ci se déroule essentiellement en août et septembre avec un pic relativement net fin août - début septembre). L'observation d'un individu le 08/09/98 à Moru-Pontpoint (YB) s'inscrit donc tout à fait dans cette période.

GRANDE AIGRETTE (CHD). *Ardea alba*.


Cette espèce n'est observée dans l'Oise que depuis 1995 (étangs du Grand Vivier). En 1997, deux individus ont stationné pendant une semaine à Verberie. En 1998, c'est donc sur un troisième site, celui du marais de Sacy-le-Grand, que l'espèce aura été observée à deux reprises :

- 1 immature le 07/06/98 (PM, RB)*.

- 1 immature (certainement toujours le même) le 15/08/98 (PM, RB)*.

HÉRON CENDRÉ. *Ardea cinerea*.

Cette espèce commune dans l'Oise a été observée dans de nombreuses localités en 1998 : Angy, Bailleul sur Thérain, Boran sur Oise, Breuil le Sec, Bucamps, Chantilly, Chevières, Cires lès Mello, Couloisy, Daméraucourt, étang du Grand Vivier, étangs de Commelles, étangs de Saint-Pierre, étang de Toutveuve,



FDC, Forêt d'Ermenonville, Fresnoy la Rivière, Gouvieux, Houdainville, Houdancourt, La Chapelle aux Pots, Lataule, Longueil-Sainte-Marie, marais du Lys, Margny sur Matz, Mont l'Evêque, Moru-Pontpoint, Offémont, Pimprez, Rivecourt, Sacy-le-Grand, Sénécourt, Vauciennes, Verberie, Verneuil-en-Halatte Les plus gros effectifs (supérieurs à 15) en dispersion postnuptiale ont été notés sur les sites suivants :

- Houdancourt : 37 le 21/09/98 (JBM, MCJ)
- Verberie : 20 le 27/08/98 (JPF)
- Chevières : 16 le 01/09/98 (WM)

En 1998, un couple nicheur certain au Château de Chantilly. De plus, une Héronnière comprenant une dizaine de nids a été observée à Rouvres à l'extrême Sud-Est du département. A noter également l'observation de 3 juvéniles le 26/06/98 aux gravières de Boran sur Oise (YB).

HÉRON POURPRÉ (CHD). *Ardea purpurea*.

Bien que cette espèce soit rare dans notre département, elle a été observée au moins une fois chaque année depuis 1994. En 1998, l'espèce a été notée sur deux sites :

- FDC (étang du Louveteau, parcelle 531) : 1 individu le 29/07/98 (DM)*.
- Marais de Sacy-le-Grand : Observations d'un, puis de deux individus, du 05/09/98 au 10/09/98 (PM, RB, ALK)*.

CIGOGNE NOIRE (CHD). *Ciconia nigra*.

La Cigogne noire n'est observée dans notre département qu'en période de migration. En 1998 nous n'avons qu'une seule observation : 1 posée le 13/05/98 à La Chapelle aux Pots, "Lhuyère" (HdeL)*. Il s'agit de la huitième donnée connue pour l'Oise.

Dans notre département les observations se répartissent donc comme suit :

- 3 données au passage prénuptial (mi-avril à mi-mai)
- 5 données au passage postnuptial (mi-août à fin septembre)

CIGOGNE BLANCHE. *Ciconia ciconia*.

La Cigogne blanche est potentiellement observable tous les mois de l'année dans notre département. En 1998, l'espèce a été contactée sur 6 localités :

- FDC (carrefour Valon, parcelle 7422) : 1 en vol le 15/02/98 (PMS)
- Candor, "Les Hauts Prés" : 1 en vol le 16/02/98 (MR)

- Varesnes, "La Fosse Cochue" : 1 adulte posé le 10/05/98 (FS, WM, AD)
- La Chapelle aux Pots, "Lhuyère" : 1 le 24/05/98 (HdeL, Info d'un agriculteur)
- Compiègne : 5 posées près de l'église Saint Jacques le 19/08/98 (Info du Parisien Libéré)
- Creil : 7 posées près de l'hôpital le 20/08/98 (PM).

Compte tenu de l'expansion de cette espèce, il n'est pas exclu qu'elle niche à nouveau dans notre département dans les années à venir (moyenne vallée de l'Oise en particulier).

RÉDACTEUR : WILLIAM MATHOT

CYGNE TUBERCULÉ. *Cygnus olor*.

Nicheur et migrateur, souvent sédentaire. Cette espèce commune est visible sur presque tous les plans d'eau du département, mais ce sont les gravières de Moru-Pontpoint qui accueillent les plus fortes concentrations avec des effectifs qui atteignent la quarantaine d'individus en juillet et en août :

- 44 le 04/07 (PM-RB)
- 43 le 14/07 (PM-RB)
- 49 le 01/08 (PM)
- 45 le 08/08 (PM-RB)

L'espèce a été notée nicheuse à : Boran, Chevrières Moru-Pontpoint, Troissereux et Verneuil-en-Halatte. A Chevrières : 2 couples couvent le 11/04 (PM-RB-AR), par la suite, plusieurs juvéniles sont notés avec un maximum de 5 le 01/06 (DL-PM-RB). A Moru-Pontpoint : 1 couve le 01/04 étang n° 14 (WM), 1 couve le 11/04 (PM-RDS) puis plusieurs juvéniles sont notés (PM-RB)

OIE DES MOISSONS. *Anser fabalis*.

Espèce peu courante dans l'Oise. Une seule observation pour 98 : un vol de 10 le 08/01 aux étangs de Commelle (RD). Le récapitulatif des années précédentes nous permet de constater qu'en effet l'espèce ne fréquente qu'occasionnellement le département :

- 9 le 05/07/89 à Longueil Ste Marie
- 20 le 10/08/89 à Chevrières
- 1 le 22/11/89 à Longueil Ste Marie
- 10 le 10/02/91 à Moru-Pontpoint. (JPB)
- 2 le 17/12/91 à Verneuil-en-Halatte (ES)
- 1 le 11/01/97 à Beautor (02) (PMS)

OIE CENDRÉE. *Anser anser*.

Espèce commune aux passages migratoires.

Une seule observation correspondant à la migration prénuptiale :

- 4 le 22/02 à Chantilly (JLB) puis tous les contacts sont réalisés lors de la migration postnuptiale, avec un gros passage en octobre et novembre.

Première : 1 le 02/08 à Grandvilliers (GP)

Maxi : 205 le 18/10 en Forêt Domaniale de Compiègne, au Mont St Marc. (PMS)

- 263 le 18/10 à Morienvall, Brassoir (JPB-CG)
- 260 le 18/10 à Trosly-Breuil (JMV)
- 200 le 04/11 à Béthisy St Martin (JPF)
- Dernières : 120 le 16/11 à Machemont (FS)

BERNACHE DU CANADA. *Branta canadensis*.

Visiteuse occasionnelle du département.

Une observation hivernale, les deux autres ont été faites en avril, lors du passage prénuptial :

- 1 le 25/01 à Verneuil-en-Halatte (DD)
- 1 le 09/04 à St Félix (YB)
- 1 le 22/04 à Chantilly (JMG)

REDACTEUR : JÉRÔME VOTTE

TADORNE CASARCA. *Tadorna ferruginea*.

Six observations de l'espèce en 1998 :

- 1 femelle volante le 11/04 aux bassins de décantation de Chevières (AR, YB)
- 1 le 21/04 à Sacy le Grand (ALK)
- 1 femelle le 23/04 à Moru-Pontpoint (M16) (PMS)
- 1 le 13/06 aux bassins de décantation de Chevières (PM, RB)
- 1 le 21/06 aux bassins de décantation de Vauciennes (HdeL)
- 7 en vol le 06/08 aux bassins de décantation de Chevières (AR)

TADORNE DE BELON. *Tadorna tadorna*.

En 1998, l'espèce a été observée sur les sites suivants : Moru-Pontpoint, Chevières, Couloisy, étang de Wallu, Houdancourt, Vauciennes (bassins de décantation), Sacy le Grand et Longueil Ste Marie.

La nidification a été prouvée sur deux sites :

Chevières :

- 11 le 01/06 dont 2 mâles, 2 femelles et 7 juvéniles (C1) (DL)
- 11 le 04/07 dont 1 couple et 9 juvéniles (bassins de décantation) (PM, RB)

Vauciennes (bassins de décantation) :

- 15 le 07/06 dont 1 couple + 5 juvéniles et 1 couple + 6 juvéniles (HdeL)
- 4 le 21/06 dont 1 femelle avec 1 juvénile (HdeL)
- 16 le 05/07 dont 4 adultes, puis 2 adultes avec 10 juvéniles (PMS)

CANARD MANDARIN. *Aix galericulata*.

Une seule observation dans l'Oise en 1998 :

- 1 le 10/01 à l'étang de Pierrefonds (FS, CL, WM)

CANARD SIFFLEUR. *Anas penelope*.

En 1998, observation de l'espèce sur les sites suivants : Moru-Pontpoint, étangs de Commelle, Chevières, Grandvilliers et Verneuil-en-Halatte. Records d'effectifs :

- 24 le 18/03 à Moru-Pontpoint (M5) dont 9 mâles et 15 femelles (WM, CL)
- 10 le 29/11 à Grandvilliers (bassins de décantation) (GP)

CANARD CHIPEAU. *Anas strepera*.

En 1998, observation de l'espèce sur les sites suivants : Moru-Pontpoint, Chevières, Houdancourt, Sacy le Grand et Verneuil-en-Halatte. Faibles effectifs sur l'ensemble des sites, les plus importants ayant été notés à Moru-Pontpoint et à Verneuil-en-Halatte :

- 15 le 03/10 à Moru-Pontpoint (M5) (JPF)
- 7 le 05/04 à Verneuil en Halatte (DD)
- 7 le 16/10 à Houdancourt (WM)

CANARD COLVERT. *Anas platyrhynchos*.

Espèce très commune sur l'ensemble des plans d'eau de l'Oise. A noter la nidification sur les sites suivants : Chevières, étangs de Commelle, Bailleul sur Thérain, Chantilly et Grandvilliers.

Records d'effectifs :

- 400 le 01/08 à Longueil Ste Marie (PM)
- 150 le 29/11 à Grandvilliers (bassins de décantation) (GP)

CANARD PILET. *Anas acuta*.

En 1998, observation de l'espèce sur les sites suivants : Moru-Pontpoint, Varesnes, Sacy le Grand, étang de Wallu, Chevières, Bailleul sur Thérain, Verneuil-en-Halatte et à Brassoire. Les plus gros effectifs, notés en périodes migratoires, sont les suivants :

- 23 le 30/10 en migration à Brassoire (JPB, CG)
- 12 le 16/03 en vol à Sacy le Grand (ALK)
- 11 le 27/03 à Moru-Pontpoint (M5) (WM)

CANARD SOUCHET. *Anas clypeata*.

En 1998, observation de l'espèce sur les sites suivants : Moru-Pontpoint, Verneuil en Halatte, Chevières, Longueil Ste Marie, Sacy le Grand, étang de Touthoie, Verberie, Vauciennes, Houdancourt et Grandvilliers.

Records d'effectifs :

- 40 le 15/08 à Chevières (bassins de décantation) (PM, RB)
- 39 le 03/10 à Moru-Pontpoint (M5) (JPF)
- 31 le 11/04 à Chevières (bassins de décantation) (YB)
- 20 le 28/03 à Vauciennes (bassins de décantation) (JPF)
- 20 le 05/09 à Chevières (bassins de décantation) (PM, RB)

SARCELLE D'HIVER. *Anas crecca*.

En 1998, observation de l'espèce sur les sites suivants : étangs de Comelles, étang de Fleury, étang de la Ramée, Longueil Ste Marie, Moru-Pontpoint, Sacy le Grand, Houdancourt, Grandvilliers, Verneuil en Halatte, Verberie, Chantilly, étang de Wallu et Chevières. Les plus gros effectifs ayant été notés sur ces deux derniers sites :

étang de Wallu :

- 40 le 01/01 (JMG)
- 40 le 03/01 (JMV)
- 28 le 12/03 (JPF)

Chevières (bassins de décantation) :

- 78 le 17/10 (AR)
- 70 le 11/10 (AR)
- 32 le 11/04 (PM,RB)
- 30 le 05/09 (PM,RB)

La nidification de l'espèce dans l'Oise n'a pas pu être prouvée malgré quelques stationnements tardifs.

SARCELLE D'ÉTÉ. *Anas querquedula*.

En 1998, observation de l'espèce sur les sites suivants : Chevières, Verberie, Vauciennes et Sacy le Grand. Les plus gros rassemblements ayant été notés à Chevières (bassins de décantation) :

- 8 le 14/07 (PM,RB)
- 7 le 11/04 (AR)
- 7 le 08/08 (PM, RB)
- 7 le 15/08 (PM, RB)

Aucune donnée concernant la nidification de l'espèce.

SARCELLE MOUCHETÉE. *Anas flavirostris*.

Une observation de l'espèce dans l'Oise en 1998 :

- 2 échappées de captivité le 28/08 et le 03/09 à Houdancourt (H1) (PMS)

NETTE ROUSSE. *Netta rufina*.

Une seule donnée dans l'Oise en 1998 :

- 1 femelle le 16/03 au marais de Sacy le Grand (ALK)

FULIGULE MILOUIN. *Aythya ferina*.

Espèce relativement commune en période d'hivernage sur les plans d'eau de l'Oise. Le site de Moru-Pontpoint restant le meilleur lieu d'accueil pour l'espèce :

Moru-Pontpoint (M5) : 950 le 25/01 (FB, YB), 800 le 14/01 (WM), 753 le 17/01 (AR)

Records d'effectifs par sites d'hivernage :



Fuligule milouin. Gérard LOUVET

Longueil Ste Marie : 450 le 15/03 (MOP)

Chevrières : 200 le 11/03 (JPF)

Verneuil en Halatte : 175 le 04/02 (YB)

Pimprez : 140 le 10/01 (PMS)

Houdancourt : 79 le 22/12 (H2) (YB)

Mello : 75 le 22/01 (JBM, MCJ)

Morlincourt : 68 le 14/01 (MR)

La nidification de l'espèce n'a pu être prouvée dans l'Oise en 1998, à noter tout de même :

- 1 couple le 22/05 et le 03/06 au marais de Sacy le Grand (ALK)

FULIGULE À BEC CERCLÉ (CHN). *Aythya collaris*.

Quatre observations de l'espèce dans l'Oise en 1998 :

- 1 le 10/01 et le 22/01 à Mello (JBM, MCJ) (non validé par le CHN).

- 1 mâle le 21/01 à Mello (YB)

- 1 le 25/01 à Mello (DD)*

- 1 mâle le 14/03 à Verneuil en Halatte (AR)

FULIGULE NYROCA (CHD). *Aythya nyroca*.

Une seule donnée dans l'Oise en 1998 :

- 1 le 26/10 à Moru-Pontpoint (M5) (YB)

FULIGULE MORILLON. *Aythya fuligula*.

En 1998, observation de l'espèce sur les sites suivants : Moru-Pontpoint, Verneuil en Halatte, Chevrières, Sacy le Grand, Mello, Vauciennes, Longueil Ste Marie et Pimprez.

Records d'effectifs :

Moru-Pontpoint (M5) : 230 le 14/01 (WM), 168 le 17/01 (AR), 150 le 18/01 (JPF)

Longueil Ste Marie : 200 le 15/03 (MOP), 111 le 10/01 (DL), 100 le 28/01 (PMS).

Concernant la nidification, à noter :

- 8 le 26/04 à Chevrières (C1) dont 1 couple (DL)

- 3 le 24/05 à Vauciennes (bassins de décantation) dont 1 couple (JPB, CG)

- 17 dont 1 femelle, 12 adultes et 4 juvéniles le 08/08 à Chevrières (bassins de décantation) (PM, RB)

- 1 femelle et 4 juvéniles le 15/08 à Chevrières (bassins de décantation) (PM, RB)

FULIGULE MILOUINAN (CHD). *Aythya marila*.

En 1998, deux observations de l'espèce dans l'Oise :

- 1 mâle et 1 femelle le 05/03 & 14/03 à Verneuil en Halatte (CW)*

- 1 femelle le 15/11 à Moru-Pontpoint (M16) (YB)

HYBRIDE MILOUIN X MORILLON. *Aythya ferina* x *Aythya fuligula*.

- 1 mâle le 11/04 à Chevières (bassins de décantation) (AR).

EIDER À DUVET. *Somateria mollissima*.

Trois observations de l'espèce dans l'Oise en 1998 :

- 1 mâle premier hiver le 22/12 à Moru-Pontpoint (FB)
- 1 mâle premier hiver le 24/12 et le 25/12 à Moru-Pontpoint (M5) (WM, PMS)

MACREUSE BRUNE. *Melanitta fusca*.

Une donnée pour cette espèce dans l'Oise en 1998 :

- 1 femelle le 22/11 à St Vaast-lès-Mello (gravières) (YB)

GARROT À ŒIL D'OR. *Bucephala clangula*.

46 observations de l'espèce dans l'Oise en 1998 sur les sites de : Moru-Pontpoint, Verneuil-en-Halatte et Pimprez. Les plus gros effectifs sont notés sur le site de Moru-Pontpoint :

- 5 le 07/01 (WM)
- 5 le 08/01 (PMS)
- 5 le 17/01 (AR)
- 5 le 27/02 (WM)
- 4 le 23/02, 1 mâle parade devant trois femelles (PMS).

HARLE PIETTE. *Mergellus albellus*.

Huit observations de l'espèce dans l'Oise en 1998 :

- 2 femelles le 10/01 à Mello (JBM, MCJ)
- 2 femelles le 14/01 à Moru-Pontpoint (M5) (WM)
- 3 femelles le 22/01 à Mello (JBM, MCJ)
- 3 femelles le 25/01 à Mello (DD)
- 1 mâle et 3 femelles le 04/02 à Verneuil en Halatte (YB)
- 1 mâle et 5 femelles le 08/02 à Verneuil en Halatte (DD)
- 1 femelle le 06/12 à Moru-Pontpoint (M5) (JMV)
- 2 femelles le 13/12 à Moru-Pontpoint (FB)

HARLE BIÈVRE. *Mergus merganser*.

Sept observations de l'espèce dans l'Oise en 1998 :

- 6 femelles le 10/01 à Pimprez (PMS)
- 6 le 18/01 à Pimprez (MR)
- 1 femelle le 01/02 à Verneuil en Halatte (PMS)
- 2 le 21/11 à Moru-Pontpoint (FB)
- 2 le 23/11 à Moru-Pontpoint (M5) (PMS)
- 1 mâle et 1 femelle le 27/11 à Moru-Pontpoint (M5) (JPF) (WM)

- 1 femelle le 31/12 aux étangs de St Pierre (FdC) (JMV)

ERISMATURE ROUSSE (CHN). *Oxyura jamaicensis*.

Deux données pour cette espèce en 1998 dans l'Oise :

- 1 femelle le 06/12 à Moru-Pontpoint (M5) (JMV)*
- 1 femelle le 22/12 à Moru-Pontpoint (FB)*

RÉDACTEUR : HENRI DE LESTANVILLE

BONDRÉE APIVORE. *Pernis apivorus*.

Bien notée aux deux passages. Les indices de nidification restent toujours difficiles à obtenir. Elle est pourtant présente dans tous les massifs du Sud Est de l'Oise.

Premières données :

- 4 le 11/05 à Houdancourt (PMS).
- 2 le 16/05 marais de Bourneville (JPB, CG).
- 1 le 16/05, Forêt Domaniale de Compiègne, parcelle 6082 , (PMS).

Dernières données :

- 1 le 05/09 Carrefour Saint Léonard en Forêt Domaniale de Chantilly (JLB).
- 1 le 07/09 à Belloy (FS).
- 1 le 20/09 à Cuvilly (FS).

MILAN NOIR. *Milvus migrans*.

Migrateur rare.

Observé cette année uniquement lors du passage prénuptial dans l'Est du département.

- 1 le 30/04 à Crépy en Valois (CL).
- 1 le 19/05 à Crépy en Valois (JPB, CG).
- 4 le 01/06 à Villeneuve-sur-Verberie (DL).

MILAN ROYAL. *Milvus milvus*.

Migrateur rare.

Deux données remarquables en décembre.

Passage prénuptial :

- 1 le 21/03 à Brassoir (JMV).
- 1 le 13/04 à Belloy (FS).

Passage postnuptial :

- 1 le 01/11 à Béthisy Saint Martin (JPF).
- 1 le 02/12 à Pont l'Evêque (MR).
- 1 le 09/12 à Houssoye le farci (YL).

BUSARD DES ROSEAUX. *Circus aeruginosus*.

Migrateur et nicheur rare.

Premières données :

- 1 le 28/03 en FDC, parcelle 8371 (PMS).
- 1 le 26/04 bassin C1 à Chevières (DL).
- 1 le 17/05 à Attichy (MR).

Nidification :

Noté à Sacy du 21/04 au 15/08

- 1 cpl nicheur certain le 22/05 (ALK).

BUSARD SAINT MARTIN. *Circus cyaneus*.

Migrateur et hivernant .

Présent toute l'année. Un nombre de 125 données pour 1998. Le suivi Opération Busards a localisé 5 cpl dans notre département.

Bilan : 1 cpl avec 3 jeunes à l'envol, 3 cpl avec 2 jeunes chacun, 1 cpl non déterminé. Il est noté nicheur probable à Hétoimesnil, et autour de Grandvilliers où les observations sont nombreuses de mars à juillet (GP).

Un dortoir en FDC a été contrôlé avec 2 mâles + 1 femelle le 02/01 (JPB,CG) et 3 mâles le 09/01 (PMS).

Nicheur probable à Grandvilliers avec de nombreuses observations de mars à juillet (GP). A noter 1 mâle + 1 femelle le 22/06 à Hétoimesnil (GP);

BUSARD CENDRÉ. *Circus pygargus*.

Migrateur et nicheur rare.

Cette année 4 cpl ont pu être localisés dans l'Oise (opération Busards Picardie Nature et FS). Deux cpl ont été observés avec 3 jeunes à l'envol chacun, le troisième a échoué. On ne connaît pas le résultat pour le quatrième.

Premières données :

- 1 le 17/05 à Prémont (MR).
- 1 mâle le 04/06 à Grez (GP).
- 1 mâle le 16/06 à Cernus (GP).
- 1 mâle le 17/06 à Grandvilliers (GP).

En période de nidification il a aussi été observé aux endroits suivants : Lieu dit Hayon (Feuquières), lieu dit Les Alleux (Grandvilliers), Mortemer (1 cpl).

Dernières données :

- 1 mâle le 12/08 à Grandvilliers (GP).
- 1 mâle le 28/08 à Cernus (GP).
- 1 mâle le 02/09 à Grandvilliers (GP).

AUTOUR DES PALOMBES. *Accipiter gentilis*.

Sédentaire, migrateur rare.

Une donnée cette année en automne.

- 1 juv chasse une bande de vanneaux le 01/11 à Godenvillers (HdeL)*.

EPERVIER D'EUROPE. *Accipiter nisus*.



Sédentaire et migrateur

- 1 parade le 29/03 au Mont St Marc, FDC (AR).

- 1 alarme en vol, parcelle 1141, FDC le 10/05 (JLB).

- 1 femelle ainsi que des pelotes, des plumées et un nid occupé parc. 313 Forêt de Chantilly le 01/06 (JMG).

Epervier d'Europe. Willem MATHOT

BUSE VARIABLE. *Buteo buteo*.

Sédentaire.

Des oiseaux nordiques viennent renforcer les effectifs pendant l'hiver. Il serait intéressant de bien vérifier les sujets clairs qui peuvent ressembler à des Buses pattues.

Maxima :

- 7 le 23/02 au Bois du Lieutenant (JMG).

- 7 le 13/03 en Forêt Domaniale de Chantilly, parc 34 (JLB).

- 7 le 28/03 parc 8371 FDC (PMS).

- 9 le 14/03 à Varesnes (FS, PMS, WM).

Formes claires :

- 1 le 20/09 en halte migratoire à Brassoir (JPB, CG).

- 2 le 22/11 à Bailleul sur Thérain (YB).

- 1 le 22/11 parc 933 FDC (JLB).

- 1 toute blanche le 01/12 à Berneuil en Bray (YL).

BALBUZARD PÊCHEUR. *Pandion haliaetus*.

Migrateur rare mais régulier.

Une seule donnée tardive au printemps : 1 le 20/06 à Wallu (PMS).

Le passage postnuptial s'étale de fin août à la deuxième décade de septembre; L'espèce est observée à Sacy le Grand entre le 31/08 et le 18/09 (ALK, FS, WM, PM, RB). 2 individus sont présents le 05 et le 10/09.

Observé à Chevières le 4 et le 11/09. 1 femelle + 1 juv le 05/09. (PM, RB).

- 1 le 05/09 à Longueil Ste Marie (PMS).

- 1 le 07/09 à Cuvilly (FS).

- 1 le 18/09 à Moru-Pontpoint (PMS).

- 1 juv le 3/09, 1 les 09 et 11/09 à Houdancourt (WM).

FAUCON CRÉCERELLE. *Falco tinnunculus*.

Commun, sédentaire. Pas d'indice certain de nidification pour ce faucon le plus commun de notre région. Noté nicheur possible à Varesnes, Sommereux, et St Germain la Poterie.

FAUCON ÉMERILLON. *Falco columbarius*.

Migrateur, hivernant.

15 données cette année pour ce rapace hivernant dans les plaines de début Octobre à Février. Noté à : Moru-Pontpoint, Montépilloy, Morienvall, Montagny Ste Félicité, Villers St Genest, Vauciennes, Brassoir, Orrouy, Beaupuits, Rouvillers, Bailleul sur Thérain, Berneuil sur Aisne, Tracy le Mont.

FAUCON HOBEREAU. *Falco subbuteo*.

Migrateur, nicheur peu commun.

En dehors de Sacy le Grand où il est régulièrement observé, il a été observé en période de nidification dans les communes suivantes : Béthisy Saint Martin, Grandvilliers, Marseille en Beauvaisis, Saint Germain la Poterie, les Alleux, la Neuville sur Ressons, Vauciennes, Fresnoy-la-rivière, Rainvillers, Belloy, Sommereux, Houdancourt et Tausacq.

En Forêt :

- 1 le 04/07 parc 120 FD de Retz (PMS).
- 1 le 31/08 parc 162 FD d'Ermenonville (YB).

FAUCON PÈLERIN (CHD). *Falco peregrinus*.

Hivernant, migrateur rare.

Un nombre important d'observations (10 données) cette année probablement dû à l'essor des populations normandes (cf article Pic Mar n°7). Noté jusqu'au 15/02 puis à partir du 11/09 sur les sites de : Trumilly, Montépilloy, Fontaine-Chaalis, Fay, La Rue St Pierre, Rémérangles, Moyenneville.

NDLR : 1 seule observation a fait l'objet de fiche d'homologation.

RÉDACTEUR : FRANCK SPINELLI

PERDRIX ROUGE. *Alectoris rufa*.

Aucune remarque particulière pour cette espèce qui est observée au hasard des lâchers cynégétiques. En 1998, quelques données proviennent des localités suivantes : Boran sur Oise, Chevreières, Marais du Lys, Morienvall (Brassoir), Rocquemont.

PERDRIX GRISE. *Perdix perdix*.

Pas de commentaire spécifique. Cette espèce commune est observée sur l'ensemble des milieux cultivés de notre département.

FAISAN VÉNÉRÉ. *Symaticus reevesii*.

Une seule observation en 1998 pour cette espèce introduite :

- 3 individus le 15/03/98 à Longueil-Sainte-Marie, "Bois Collard" (MOP).

FAISAN DE COLCHIDE. *Phasianus colchicus*.

Pas de commentaire spécifique pour cette espèce lâchée à des fins cynégétiques.

CAILLE DES BLÉS. *Coturnix coturnix*.

Cette espèce relativement commune dans notre département fréquente essentiellement les milieux cultivés. En 1998, les données proviennent des localités suivantes : Bourmont (Pré Barbet), Cempuis, Cires les Mello (Tillet), Courcelles-Epayelles, Cuvilly (le Trou à Cran, les Prés Falempoix), FDC (Mont Saint Marc), Grandvilliers, Hétomesnil (la Haute Borne), Hodenc en Bray, Lataule (Les Brelans), Mortemer (Champ des Morts, la Pondoire), Nanteuil le Haudouin, Saint Maur (Ferme de la Garenne), Sarinois, Varesnes (la Fosse Cochue). Localement les populations de cette espèce peuvent être relativement importantes.

A noter pour 1998, une donnée relativement tardive : 1 en vol le 29/08/98 à Grandvilliers (GP)

RÉDACTEUR : CÉDRIC LOUVET

RÂLE D'EAU. *Rallus aquaticus*.

Quelques données hivernales aux étangs de Commelles et dans le marais de Sacy. Nicheur possible dans le marais de Sacy : 1 chtr le 26/05.

MAROUETTE PONCTUÉE. *Porzana porzana*.

Deux données relatives à la migration postnuptiale :

- 1 ad le 04/08 dans les bassins de décantation de Vauciennes (PMS).
- 1 ad le 13/08 dans les bassins de décantation de Vauciennes (PMS).

RÂLE DES GENÊTS. *Crex crex*.

Nicheur possible à Varesnes :

- 1 chtr le 14/05 (WM, FS).
- 1 chtr le 28/06 (PMS).

GALLINULE POULE D'EAU. *Gallinula chloropus*.

Peu de commentaires. Une donnée de 86 individus le 11/01/98 à Chantilly (JMG).

FOULQUE MACROULE. *Fulica atra*.

Quelques stationnements importants, notamment sur le site de Verneuil-en-Halatte :

- 1000 le 25/10 (JBM, MCJ).
- 700 le 26/10 (YB).
- 750 le 01/11 (YB).

- 1000 le 15/11 (YB).

- 600 le 21/11 (YB).

GRUE CENDRÉE. *Grus grus*.

Une seule donnée :

- un vol entendu le 02/03 à Orrouy (PMS).

AVOCETTE ÉLÉGANTE. *Recurvirostra avosetta*.

- 1 oiseau le 27/08 à Moru-Pontpoint (M15) (JPF).

OEDICNÈME CRIARD. *Burhinus oedicnemus*.

Une seule donnée :

- 1 le 25/09 à Grandvilliers, lieu-dit le Tambour, chtr à 20h30 (GP).

PETIT GRAVELOT. *Charadrius dubius*.

1^{ère} donnée : 1 oiseau le 14/03 aux Remises d'Herneuse à Verberie (JPB, CG).

Dernière donnée : 1 le 06/09 à Vauciennes (PMS).

L'espèce est notée de façon régulière entre ces deux dates.

Le Petit Gravelot est "nicheur certain" dans les sites suivants :

- 2 cples à Boran/Oise (YB).

- 1 cple à Moru-Pontpoint (PM, RB).

- Observation de juvéniles à Chevières (WM).

- 1 cple à Cuise la Motte, usine Clariant (JMV).

"nicheur possible" dans les sites suivants :

- Longueil Ste Marie le 27/05 (AR).

- 1 cple à Houdancourt H1 (PMS).

Plusieurs cples à Moru-Pontpoint, parades et accouplements le 13/04 (JPF).

GRAND GRAVELOT. *Charadrius hiaticula*.

1^{ère} donnée : 1 le 27/03 aux Remises d'Herneuse (WM).

dernière donnée : 1 le 06/09, bassins de décantation de Vauciennes (PMS).

Le passage prénuptial est bien marqué (effectif cumulé n = 32) de fin mars jusqu'à la fin du mois de juin.

Le passage postnuptial s'étale de la deuxième décade de juillet à fin septembre.

On notera les observations régulières de cette espèce sur les bassins de décantation de Grandvilliers du 21/07 au 14/08 (GP).

GRAVELOT À COLLIER INTERROMPU (CHD). *Charadrius alexandrinus*.

Observation exceptionnelle de cet oiseau très rare à l'intérieur des terres :

- 1 le 27/03 aux remises d'Herneuses (WM, CL).

PLUVIER DORÉ. *Pluvialis apricaria*.

Nombreuses observations en plaine, surtout lors de la migration postnuptiale et des stationnements hivernaux. Mouvements et stationnements postnuptiaux débutent autour du 10/10. Les données les plus remarquables concernent les mois de novembre et décembre :

- 120 le 01/11, Le Mesnil Conteville (GP).
- 236 le 08/11, Le Mesnil Conteville (HdL).
- 620 le 08/11, Ourcel Maison (HdL).
- 150 le 09/11, Rocquemont (PMS).
- 240 le 13/11, Trumilly (JPF).
- 150 le 15/11, Grandvilliers (GP).
- 100 le 20/11, Tracy le Mont (JMV).
- 225 le 29/11, Fouilloy (HdL).
- 247 le 29/11, Romescamps (HdL).
- 240 le 12/12, Grandvilliers (GP).
- 590 le 20/12, Hardivillers (HdL).
- 540 le 20/12, Sommereux (HdL).

PLUVIER GUIGNARD (CHD). *Charadrius morinellus*.

Il s'agit de la première observation départementale pour cette espèce : 1 femelle adulte a stationné du 30/05 au 01/06 près des bassins de décantation de Vauciennes (Guy Flohart, PMS et al.). On pourra se reporter à l'article de Pierre Sengez : Première observation d'un Pluvier guignard dans l'Oise, LE PIC MAR, (4) : 40-41.

VANNEAU SOCIABLE (CHN). *Vanellus gregarius*.

Observation exceptionnelle de cet oiseau accidentel en Europe :

1 oiseau adulte en plumage nuptial découvert le 23/05 sur les bassins de décantation de Vauciennes (JPB, CG) et observé jusqu'au 06/06 (PM, PMS et al.). On pourra, là aussi, se reporter à l'article d'Alain Rouge et Marc Sengez : Première observation d'un Vanneau sociable dans l'Oise, LE PIC MAR, (4) : 36-39.

VANNEAU HUPPÉ. *Vanellus vanellus*.

De nombreuses observations surtout lors de la migration postnuptiale et des stationnements hivernaux.

Stationnements hivernaux remarquables :

- 361 le 10/01 à Gouvieux (YB).
- 174 le 14/02 à Gouvieux (YB).
- 200 le 17/02 à Feigneux (EC).
- 100 le 14/03 à Verneuil-en-Halatte (AR). Cette dernière observation peut correspondre au début de la migration prénuptiale.

Nidification :

- Un cplé "nicheur certain" à Chevrrières le 07/05 (WM).
- Un cplé "nicheur probable" aux Remises d'Herneuse à Verberie le 08/05 (PMS).
- Un cplé "nicheur probable" à Varesnes "La Fosse Cochue" le 10/05 (FS, WM, AD).

- Un cpl parade à Boran/Oise le 17/05 (YB).
- Un cpl alarme le 24/05 en contrebas des bassins de décantation de Vauciennes (JPB, CG).
- Un cpl alarme violemment aux gravières de Longueil Ste Marie près de l'A1 le 27/05 (AR).
- 2 nids + 4 pullis le 26/06 à Chevières (WM).
- 1 adulte + 2 pullis aux bassins de décantation de Chevières (PM, RB).

Migration postnuptiale :

Elle débute le 28/06 avec 300 oiseaux à St Thibault puis se poursuit jusqu'à fin novembre avec un pic en octobre :

- 2700 le 18/10, Beauvais, le Tillé (HdeL).
- 800 le 23/10, Vérines (HdeL).
- 3200 le 31/10, Fosses St Martin (HdeL).
- 1430 le 01/11, Godenvillers (HdeL).

BÉCASSEAU SANDERLING. *Calidris alba*.

2 observations pour cette espèce peu fréquente à l'intérieur des terres :

- Effectif remarquable de 8 oiseaux le 03/05 à Longueil Ste Marie (AR).
- 1 oiseau le 16/09 à Chevières (WM).

BÉCASSEAU MINUTE. *Calidris minuta*.

Pas d'observation lors du passage pré-nuptial.

Passage postnuptial noté du 02/09 au 11/10.

Hormis la donnée d'octobre, toutes les observations se rapportent au mois de septembre (effectif cumulé n=157 oiseaux).

- Un maximum de 22 le 10/09 à Chevières (AR).

BÉCASSEAU TACHETÉ (CHN). *Calidris melanotos*

5ème donnée de cette espèce accidentelle en Europe :

- 1 oiseau le 11/10 en plumage d'hiver sur les bassins de décantation de Chevières (AR).

Précédentes données communiquées par F. Spinelli :

- 1 le 17/09/88 à Chevières.
- 1 les 06 et 08/05/94 à Asnières sur Oise.
- 1 juv le 11/09/94 à Vauciennes.
- 1 femelle adulte le 19/10/96 à Chevières.

BÉCASSEAU COCORLL. *Calidris ferruginea*.

En 1998, cette espèce est uniquement notée lors du passage postnuptial :

- 1 le 01/08 à Chevières (PM).
- 4 le 05/09 à Sacy le Grand (PM, RB, ALK).
- 1 le 06/09 à Sacy le Grand (ALK).
- 1 le 06/09 à Vauciennes (PMS).

- 9 le 12/09 à Vauciennes (PMS, AR).

- 1 le 18/09 à Chevrières (WM).

BÉCASSEAU VARIABLE. *Calidris alpina*.

Noté seul ou en petit groupe toute l'année.

1^{ère} donnée : 2 le 24/02 à Grandvilliers (GP).

Dernière donnée : 2 le 15/11 à Grandvilliers (GP).



COMBATTANT VARIÉ. *Philomachus pugnax*.

1^{ère} donnée : 1 le 11/03 à Houdancourt (PMS).

Dernière donnée : 6 le 11/10 à Chevrières (AR).

Nombre maximum d'oiseaux observés :

- 15 les 17/09 et 20/09 à Vauciennes (PMS, CL).

BÉCASSINE DES MARAIS. *Gallinago gallinago*.

Cette espèce est bizarrement peu notée cette année 98 et les observations concernent peu d'individus.

Nombre maximum d'oiseaux observés : 36 le 24/08 à Vauciennes (PMS).

BÉCASSE DES BOIS. *Scolopax rusticola*.

Peu de données collectées cette année (5 mentions). L'espèce est nicheuse probable en Forêt d'Ermenonville : 1 individu croule le 20/06 (JLB).

BARGE À QUEUE NOIRE. *Limosa limosa*.

2 données :

- 1 le 03/03 à Moru-Pontpoint, M15 (PMS).

- 1 le 01/09 à Chevrières (WM).

COURLIS CENDRÉ. *Numenius arquata*.

Une donnée hivernale :

- 1 le 28/01 à Moru-Pontpoint (PMS).

puis :

- 5 le 21/05 à Vauciennes (JPF).

- 1 le 19/08 à Houdancourt, H1 (PMS).

- 20 le 13/12 à Brégy (HdeL).

CHEVALIER ARLEQUIN. *Tringa erythropus*.

Noté cette année uniquement lors du passage postnuptial.

- 3 le 29/08 à Vauciennes (PMS).

- 3 le 30/08 à Vauciennes (AR).

- 1 le 02/09 à Vauciennes (PMS).

- 3 le 06/09 à Vauciennes (PMS).
- 3 le 17/09 à Vauciennes (PMS).
- 2 le 27/09 à Vauciennes (PMS).

CHEVALIER GAMBETTE. *Tringa totanus*.

1^{ère} donnée : 21 le 28/02 en vol Nord à Brassoir (PMS).

Dernière donnée : 1 le 11/10 à Chevrières, bassins de décantation (AR). Peu de mentions cette année.



CHEVALIER ABOYEUR. *Tringa nebularia*.

1^{ère} donnée : 3 le 15/03 à Verneuil-en-Halatte (HdeL).

Dernière donnée : 2 le 12/10 à Houdancourt (WM).

La première observation est particulièrement précoce.

CHEVALIER CULBLANC. *Tringa ochropus*.

Des mentions toute l'année sauf en novembre et décembre.

CHEVALIER SYLVAIN. *Tringa glareola*.

Passage prénuptial : du 08/05 au 23/05.

Passage postnuptial : du 05/07 à la dernière décade d'octobre.

CHEVALIER GUIGNETTE. *Actitis hypoleucos*.

Passage prénuptial : de fin avril à la 3^{ème} décade de mai.

Passage postnuptial : de fin juin à la deuxième décade d'octobre.

Peu de données hivernales cette année :

- 1 le 08/01 à Moru-Pontpoint (PMS).
- 3 le 11/03 à Moru-Pontpoint (JPF).
- 1 le 14/03 à Chevrières (JPF).

RÉDACTEUR : WILLIAM MATHOT

MOUETTE PYGMÉE. *Larus minutus*.

Espèce hivernale, peu commune dans l'Oise.

Visible, cette année, seulement en période migratoire avec des effectifs plus importants lors de la migration prénuptiale. Le mois de mai est le plus propice pour l'observation de la Mouette pygmée. Moru et Chevrières sont les principaux sites qui accueillent cette espèce.

- 3 le 05/04 à Verneuil-en-Halatte (DD-sortie GEOR)
- 1 le 25/04 à Moru-Pontpoint (PM-RB-DS)
- 1 imm. le 02/05 à Moru-Pontpoint (PM-RB-DS)
- 5 le 03/05 à Longueil Ste Marie (AR)

- 3 ad + 1 E1 le 05/05 à Vauciennes (AR)
- 2 le 09/05 à Sacy le Grand (ALK)
- 1 le 11/10 à Chevières (AR)
- 1 le 12/10 à Moru-Pontpoint et Chevières (CL-WM)
- 1 le 17/10 à Chevières (AR)

MOUETTE RIEUSE. *Larus ridibundus*.

Nicheuse, hivernante et migratrice.

Les dortoirs hivernaux occasionnent de belles concentrations d'oiseaux.

Maxi observés sur les gravières de Moru-Pontpoint:

- 2500 le 07/01 étang M5 (WM)
- 1500 le 23/02 M2 (PMS)
- 2000 le 14/03 M5 (AR)
- 1800 le 01/12 M5 (WM)
- 2100 le 03/12 M5 (AR)

Norée nicheuse certaine dès la mi-mai sur les sites de :

Sacy le Grand : 23 nids le 10/05 (YB).

-10 cples nicheurs le 19/05 (FS)

-12 cples nicheurs le 20/05 (FS) dans un autre endroit.

Houdancourt plus de 10 nicheurs le 19/05 (WM)

Chevières : - 100 nids le 01/06 (DL)

-50 pullis le 20/06 (PM-RB)

Vauciennes : 1 nid le 24/05 (JPB-CG)

-16 cples nicheurs avec des jeunes non volants le 24/05 (FS)

GOÉLAND CENDRÉ. *Larus canus*.

Migrateur et hivernant régulier en petit nombre.

Observés pendant la période hivernale, 80 % des Goélands cendrés visibles dans l'Oise cette année, ont été vus sur le site de Moru-Pontpoint, avec des effectifs faibles :

maxi :

- 3 le 05/01 (AR)
- 3 le 21/01 (YB)
- 6 le 28/01 (YB)
- 3 H1 le 21/11 (AR)

A noter aussi les 2 ad + 1 imm le 25/01 à Verneuil-en-Halatte (DD)

GOÉLAND BRUN. *Larus fuscus*.

Migrateur et hivernant régulier en petite quantité.

Visible tout au long de l'année. Moru-Pontpoint est le principal site d'observation du Goéland brun avec 54 % des données de l'Oise.

Maxi par mois :

- 2 le 21/01 Moru-Pontpoint (YB)
- 1 le 11/03 Moru-Pontpoint (JPF)
- 1 le 11/04 Chevières (PM-RB)
- 3 le 02/05 Houdancourt (PMS)
- 4 le 30/08 Vauciennes (AR)
- 6 le 12/10 Moru-Pontpoint (CL-WM)
- 7 le 10/11 Houdancourt (WM)
- 3 le 03/12 Moru-Pontpoint (AR)

GOÉLAND ARGENTÉ. *Larus argentatus*.

Migrateur et hivernant régulier en petit nombre dans l'Oise.

Encore une fois, Moru-Pontpoint est le centre d'attraction : 42 % des observations de Goéland argenté dans l'Oise avec un nombre maximum de 8 individus le 03/12 (AR).

Maxi :

- 40 individus en vol, notés le 04/01 à Gouvieux (YB).

Des Goélands argentés ont également été vus à :

Verneuil-en-Halatte, Grandvilliers, la Chaussée, Vauciennes, Les Alleux, Verberie, Boran sur Oise, Halloy, Néry et Tutevoie.

GOÉLAND LEUCOPHÉE. *Larus cachinnans*.

Hivernant occasionnel, visible tout au long de l'année.

Maxi :

- 17 le 26/05 à Boran sur Oise (YB)
- 26 en vol le 27/05 à Longueil Ste Marie (AR)
- 21 (4 imm + 17 juv) le 13/08 à Boran sur Oise (YB)
- 9 (2 ad + 7 juv) le 25/08 à Boran sur Oise (YB)

MOUETTE TRIDACTYLE (CHD). *Rissa tridactyla*.

Hivernante rare dans l'Oise.

Seulement trois observations pour cette année pour le département :

- 2 (1 ad + 1 H1) le 05/01 à Moru-Pontpoint (AR)
- 2 (1 ad + 1 H1) le 08/01 à Moru-Pontpoint (PMS)
- 1 le 10/01 à Pimprez (PMS)

STERNE CASPIENNE (CHR). *Sterna caspia*.

Espèce occasionnelle.

Une seule observation :

- 1 le 05/09 à Sacy le Grand (ALK)

STERNE PIERREGARIN. *Sterna hirundo*.

Migrateur et nicheur.

Premières :


- 2 le 11/04 à Chevières (PM-RB).
- 3 le 11/04 à Moru-Pontpoint (PM-RB-DS)
- 2 le 11/04 à Verneuil-en-Halatte (PMS)

Notées sur les sites de :

Boran sur Oise, Chevières, Creil, Houdancourt, Longueil Ste Marie, Morlincourt, Verberie (Remises d'Herneuse), Verneuil-en-Halatte, Sacy le Grand.

Nidification ;

Moru et Chevières sont les deux seuls endroits où la Sterne pierregarin est notée nicheuse. Moru-Pontpoint est le principal site de nidification de l'espèce. Les couvaisons, les naissances et les premiers envols ont été bien suivis.



Les premiers jeunes ont été vu le 07/06 :

- 5 ad couvent avec 2 pullis sur le M11 (PMS).

maxi :

- 21 dont 14 juvéniles volants le 15/07 sur le M11 (WM)

Dernières :

- 2 le 24/08 à Boran sur Oise (JBM-MCJ)
- 4 le 25/08 à Chevières (WM)
- 3 le 11/09 à Houdancourt (PMS)

GUIFETTE MOUSTAC. *Chlidonias hybridus*.

Migrateur rare dans l'oise.

L'espèce n'est nicheuse ni dans le département, ni en Picardie, cependant un accouplement a été noté le 09/05 à Sacy le Grand (ALK) mais par la suite les guifettes n'ont plus été revues.

GUIFETTE NOIRE. *Chlidonias niger*.

Migrateur régulier en petit nombre.

Visible surtout lors des migrations.

Migration prénuptiale :

- 2 le 09/05 Moru-Pontpoint (PMS)
- 1 le 17/05 Moru-Pontpoint (PMS)
- 1 le 13/06 Chevières (PM-RB)
- 1 juv le 05/07 Vauciennes (PMS)

Migration postnuptiale :

- 2 le 15/09 à Grandvilliers (GP)
- 1 juv volant le 17/09 à Verberie, Remises d'Herneuse (FS)

RÉDACTEUR : JEAN-PHILIPPE BONNEL

PIGEON COLOMBIN. *Columba oenas*.

Nicheur et migrateur, peu noté en hiver.

Pas de groupe important noté cette année.

Maxi :

- 8 à Chevières le 16/08 (AR).

24 sites en période de nidification en FDC.

Premier chtr le 21/02 en FDC (PMS).

Noté en Forêt d'Ermenonville, forêt de Chantilly, forêt de Retz, forêt de Laigue, aux marais du Lys et de Sacy.

Régulier sur les bassins de Chevières. (noté du 11/04 au 17/10).

Peu noté en hiver : 5 observations d'oiseaux isolés en janvier et février, aucune en novembre et décembre.

PIGEON RAMIER. *Columba palumbus*.

Hivernant, nicheur et migrateur.

Maxi :

- 1000+ le 28/12 à Chevières dans des chaumes de maïs (AR).

- 1000 le 06/12 en forêt de Chantilly (JLB).

- 450 le 13/12 à Boullare (HdeL).

- 450 le 29/11 en FdC (FB).

- 400 le 16/12 au bois des Côtes (FB).

Hivernant très abondant dans les forêts de l'Est du département, son statut d'hivernant dans le Nord-Ouest du département, beaucoup moins forestier, est à préciser. Une étude des dortoirs nous donnerait une estimation des effectifs.

TOURTERELLE TURQUE. *Streptotelia decaocto*.

Nicheur et hivernant dans toutes les zones habitées de l'Oise.

TOURTERELLE DES BOIS. *Streptotelia turtur*.

Nicheur et migrateur qui semble en régression.

Première notée le 18/04 à Saint Maur (FS).

Dernière en migration active le 20/09 à Morienvil (JPB, CG).

Quelques beaux rassemblements en été :

- 90 le 05/09 à Chevières (PM, RB).

- 40 le 16/07 à Rethondes (JV).

- 20 le 30/07 à Berneuil sur Aisne (JV).

PERRUCHE ONDULÉE. *Melopsittacus undulatus*.

1 échappée de captivité le 29/06 à Gouvieux (YB).

REDACTEUR : HENRI DE LESTANVILLE

EFFRAIE DES CLOCHERS. *Tyto alba*.

Sédentaire.

Nicheur à Houdainville et à Braisnes où Jean Becker nous indique 3 jeunes à l'envol début juillet.

Contacté à St Martin le Nœud, Peroy les Gombries, Chevières, Daméraucourt, Grandvilliers (individu écrasé), Gretz, Sommereux, Brios, Brombos.

CHOUETTE HULOTTE. *Strix aluco*.

Sédentaire.

Présente un peu partout en forêt, dans le bocage ainsi que dans les parcs. Effectif remarquable de 10 individus le 14/08 à Dameraucourt (GP).

HIBOU MOYEN-DUC. *Asio otus*.

Sédentaire.

Cette espèce semble apprécier les bords de route, parfois à ses dépens.

- 1 le 08/01 à Houssoy le Farci (YL).
- 1 le 31/01 posé en bord de route à Feigneux (JPB, CG).
- 1 écrasé le 28/02 N324 à Beaurain (HdeL).
- 1 le 07/11 à Vauciennes (PMS).

Nicheur certain à Cires lès Mello avec un cpl et 2 jeunes le 07/06 (JLB).



CHEVÊCHE D'ATHENA. *Athene noctua*.

Sédentaire, en régression.

L'espèce semble encore bien présente dans les endroits où les vergers traditionnels subsistent.

Notée à : Bourmont, Espeaubourg, Grandvilliers, Dameraucourt, Sommereux, Briot, Brombos.

REDACTEUR : JEAN-PHILIPPE BONNEL

ENGOULEVENT D'EUROPE. *Caprimulgus europaeus*.

Nicheur très localisé.

Nicheur très localisé dans les forêts claires installées sur les sables de Beauchamps. Ces sables décalcifiés sont souvent recouverts d'une formation de lande à callune favorable à l'engoulevent. Ce dernier est observé régulièrement en forêt d'Ermenonville (minimum de 14 chtrs entendus entre le 16 mai et le 16 août dans les parcelles 58, 77, 131, 132, 140, 141, 142, 162, 169. Il est à rechercher sur les autres landes à callunes de l'Oise, en particulier dans le bois du Roi et en forêt de Retz. On a très rarement l'occasion d'établir une telle relation entre une formation géologique (les sables décalcifiés de Beauchamps), une formation végétale (la lande à callune), et une espèce animale (l'Engoulevent d'Europe).

MARTINET NOIR. *Apus apus*.

Nicheur et migrateur.

Première observation le 21 avril au marais de Sacy (ALK). Observé entre le 22 et le 29 avril dans tout le département. Quelques concentrations importantes au dessus des plans d'eau en début de période,

- 50 le 29/04 à Moru,

- 200 le 03/05 au même endroit (WM, AR).

Les sites de nidification ne sont guère notés par les ornithologues : noté nicheur aux collèges de Ribécourt et de Noyon par (MR).

Dernière observation le 13/09 à Moru (FB).

MARTIN-PÊCHEUR D'EUROPE. *Alcedo atthis*.

Nicheur assez commun, sédentaire.

Cet oiseau bien noté par les observateurs est vu toute l'année: il est nicheur et hivernant régulier. Il est observé le long de l'Oise, de l'Aisne, du Thérain, de la Thève, de la Nonette, de la Brèche, de l'Automne, autour des étangs forestiers des forêts de Compiègne (Saint Pierre et le Louveteau, Pierrefonds) et Chantilly (Commelles) et près de nombreuses gravières (Moru, Verneuil, Pimprez, Toutevioie, Saint Félix, Houdainville, Longueil, Couloisy, Boran, Chevières, Verberie, Morlincourt et Houdancourt). Noté à Saint Léger en Bray et Lavillette. Enfin il est vu régulièrement au marais de Sacy.

- 86 observations du 01/01 au 13/12 sur 32 sites.

Maxi:

- 5 à Moru le 23/11 (PMS).

HUPPE FASCIÉE. *Upupa epops*.

Migrateur très rare.

Un oiseau est observé en migration pré-nuptiale le 07/05 en FDC parcelle 2212, une autre observation le 10/05 parcelle 1412 (DM). Les deux parcelles étant distantes d'un kilomètre environ, il peut s'agir du même oiseau. Le statut de l'espèce en Europe du Nord est très précaire et le nombre d'oiseaux transitant par notre département doit être extrêmement réduit. Il pourrait exister une certaine fidélité aux haltes migratoires, ce qui expliquerait les observations assez régulières faites en FDC, en avril et en mai.



Huppe fasciée. Jérôme VOTTE

TORCOL FOURMILIER. *Jynx torquilla*.

Nicheur très localisé et migrateur.

Premiers chtrs le 19/04 en FDC (P 625)

2 observations insolites de migrateurs : 1 le 21/04 à Orrouy, sur la pelouse d'un jardin (PMS), et un chtr entendu pendant deux semaines en mai à Pondron, dans un biotope composé de vastes pelouses peu entretenues dans lesquelles le Torcol pouvait se nourrir et quelques vieux arbres dans lesquels l'oiseau aurait pu nicher; l'oiseau n'a plus été revu ni entendu par la suite (JPB).

C'est dans la FDC que le Torcol est le plus observé : 23 observations sur 9 secteurs de la forêt (1401, 1492, 2191, 3092, 3231, 4221, 4202, 7422, 6171, 6182, 6202, 6211, 6242, 6251, 6253, 8260, 9342).

Il s'agit soit de secteurs en régénération (vieux arbres isolés sur des zones dégagées), soit de vieilles futaies en bordure de chablis. Egalement noté en forêt de Laigue (128), en forêt de Hez (Magasin) et en forêt d'Ermenonville (163).

Un oiseau a été vu avec la becquée le 14/06 parcelle 7422, FDC(PMS).

Dernière observation le 16/08 en forêt d'Ermenonville (JLB).

PIC CENDRÉ. *Picus canus*.

Ce pic a été très rarement observé dans l'Oise; aucune observation en 1998.

PIC VERT. *Picus viridis*.

Nicheur sédentaire commun.

Rarement noté par les observateurs, cet oiseau est observé tout au long de l'année dans des milieux très variés : forêts, villages, gravières. 8 Pics verts observés à Longueil dans le bois de la Mineuse le 15/03 (MOP).

PIC NOIR. *Dryocopus martius*.

Nicheur sédentaire présent dans tous les milieux favorables (vieilles futaies dans les massifs forestiers d'une certaine étendue).

138 oiseaux observés tout au long de l'année : on peut penser que certains ont été observés et notés plusieurs fois !

57 observations en FDC, 19 en forêt de Chantilly, 35 en forêt d'Ermenonville, une observation au bois du Lieutenant, une en forêt d'Halatte, une en forêt de Pontarmé, 4 en forêt de Retz, une en forêt de Hez, une dans le bois des Cotes .

Rarement observé en dehors des grands massifs forestiers : 3, à Marais, bois Belloy (YL), 1 dans le marais de Sacy (ALK), 1 à Cires les Mello, Tillet (JLB), 1 dans les bassins de Chevrières (PM,RB).

Premiers tambours

- le 11/02 en FDC (DM), une loge dans un hêtre avec nourrissage de jeunes le 16/05 en FDC (6072) (PMS). Une famille avec juvéniles volants le 20/06 en forêt de Retz (bois de Tillet) (PMS).

PIC ÉPÉICHE. *Dendrocopos major*.

Nicheur sédentaire présent dans tous les milieux favorables : forêts, bois, peupleraies, alignement d'arbres, vieux arbres isolés dans les villages, etc

Un tambourinage en milieu de journée à Orrouy dès le 09/01 par beau temps et température douce.

PIC MAR. *Dendrocopos medius*.

Nicheur sédentaire assez commun dans les vieilles futaies de chêne (*Quercus* sp.)

82 observations dans les principaux massifs forestiers du département : en FDC (31 parcelles), en forêt de Chantilly (11 parcelles), en forêt d'Ermenonville (5 parcelles), en forêt d'Halatte (4 parcelles), en forêt de Laigue (3 parcelles), en forêt de Hez (1 parcelle), en forêt de Retz (3 parcelles), en forêt d'Ourscamps (1

parcelle), enfin dans le bois de Basse Pommerai (1 parcelle). Rarement observé en dehors des grands massifs forestiers : 2 chtrs dans les bois communaux d'Orrouy le 03/02 (PMS). Chanteurs du 01/02 au 14/08 (JLB).

PIC ÉPEICHETTE. *Dendrocopos minor*.

Nicheur sédentaire assez commun.

Noté en FDC (1540, 1550, 1610, 2343), de Chantilly (220, 244, canaux), en vallée de l'Automne (Orrouy et Wallu), en vallée de l'Oise (Toutevoie, Boran, Moru), à Trosly-Breuil, Saint Germain la Poterie et au marais de Sacy.

Tambourinages en février et mars.

REDACTEUR : PIERRE ET MARC SENGEZ

COCHEVIS HUPPÉ. *Galerida cristata*.

Localisé aux milieux urbains.

Compiègne, Moru-Pontpoint, Grandvilliers, Nogent sur Oise, Croissy, Le Mesnil en Thelle et Neuilly en Thelle sont les localités où il a pu être observé. Nidification possible à Grandvilliers.

ALOUETTE LULU. *Lullula arborea*.

Migrateur

Une fin d'hivernage possible en FDC au Mont Berny avec 2 individus le 01/03 (JMV).


L'espèce a ensuite été observée en migration postnuptiale, d'octobre à novembre :

Morienvall, Brassoir :

- 1 le 19/10, 1 le 20/10 (PMS)

- FDC : Mont St Marc : 4 le 19/10 (PMS)

- Cires les Mello : 1 le 11/11 (JLB).



Alouette Lulu. Willem MATHOT

ALOUETTE DES CHAMPS. *Alauda arvensis*.

Sédentaire et migrateur.

En migration postnuptiale, l'effectif maximum observé est de 1588 individus en 3h le matin du 08/11 à Morienvall, Brassoir (JPB, CG).

HIRONDELLE DE RIVAGE. *Riparia riparia*.

Migrateur et nicheur.

Premières observations tardives : le 11/04 avec 50 individus à Moru-Pontpoint (PM, RB, DS) et 80 à Verneuil-en-Halatte (YB).

Reproduction :

Des colonies ont été signalées à : Aumont, Boran sur Oise, Chevières, Grimancourt, Longueil Ste Marie , Moru-Pontpoint.

HIRONDELLE RUSTIQUE. *Hirundo rustica*.

Migrateur et nicheur.

Premières : 2 le 21/03 à Sommereux (GP).

Migration postnuptiale :

A Morienvall, Brassoir, 100 oiseaux ont été notés le 10/10 en 1/2 heure (PMS), 97 le 11/10 (JPB, CG).

La dernière migratrice a été notée le 26/10 à Moru-Pontpoint (YB).

HIRONDELLE DE FENÊTRE. *Delichon urbica*.

Migrateur et nicheur.

Premières : 4 le 29/03 à Boran sur Oise (YB).

Nidification :

Peu notée, nourrissage le 09/08 à Grandvilliers (GP).

Derniers individus observés : un passage important le 10/10 en plaine entre Crépy en Valois et Senlis (PMS).

PIPIT ROUSSELINE (CHD). *Anthus campestris*.

Migrateur.

Noté cette année uniquement en migration prénuptiale avec 2 individus les 12 et 13/04 à Morienvall, Brassoir (PMS)

PIPIT DES ARBRES. *Anthus trivialis*.

Migrateur et nicheur

Premiers : 1 chtr le 14/03 à Moru-Pontpoint (PMS), 1 chtr le même jour à Varesnes (FS).

Nidification commune non notée par les observateurs

PIPIT FARLOUSE. *Anthus pratensis*.

Migrateur et nicheur.

Noté en stationnement hivernal en janvier, février à Boran sur Oise, FDC, Moru-Pontpoint, Orry.

En période de nidification, des chtrs sont signalés à Boran sur Oise, Moru-Pontpoint, Orsimont. La migration postnuptiale est observée à Morienvall, Brassoir du 20/09 au 11/11 avec des effectifs maximaux de 713 le 19/10 en 1h25, et 513 le 24/10 en 2h35; et 142 le 19/10 au Mont St Marc.

En décembre, un effectif de 10 individus est noté le 13 à Cires les Mello (JLB), et de 30 le 24 aux gravières de Boran sur Oise (YB).

PIPIT À GORGE ROUSSE. *Anthus cervinus*.

Migrateur rare.

Contacté uniquement en migration postnuptiale : 1 individu le 20/10 à Morienvall, Brassoir (PMS).

PIPIT SPIONCELLE. *Anthus spinoletta*.

Migrateur et hivernant.

Noté près de plans d'eau de janvier à avril, puis d'octobre à décembre (de 1 à 5 individus) à : Gouvieux, Boran sur Oise, Moru-Pontpoint, Vic sur Aisne, Verneuil-en-Halatte, Chevrières, Houdancourt, Vauciennes, Sacy le Grand.

- 9 migrants le 25/10 à Morienvall, Brassoir (JPB,CG).

BERGERONNETTE PRINTANIÈRE. *Motacilla flava*.

Migrateur et nicheur.

Migrateurs notés de fin mars à début mai, puis d'août à septembre, maxi de 100 le 27/09 à Vauciennes (PMS).

BERGERONNETTE FLAVÉOLE (CHD). *Motacilla flava flavissima*.

Migrateur

En migration prénuptiale, plusieurs observations aux abords de plans d'eau :

1 le 08/04 à Chevrières (WM), 1 le 11/04 et le 15/04 à Moru-Pontpoint (YB, WM), 1 le 24/04 à Grandvilliers (GP), 1 le 05/05 à Vauciennes (AR).

Nidification soupçonnée à Hayon où un cple est observé le 28/06 (GP).

Une seule observation à l'automne : 1 le 12/09 à Vauciennes (AR).

BERGERONNETTE À TÊTE GRISE (CHD). *Motacilla flava thunbergi*.

Migrateur.

Une seule mention printanière de cette sous-espèce nordique : 1 le 09/05 à Moru-Pontpoint (PMS).

NDLR : homologation en suspens.

BERGERONNETTE DES RUISSEAUX. *Motacilla cinerea*.

Nicheur et hivernant.

Notée tous les mois de l'année sur de nombreux sites :

FDC, Etang de Toutedoie, Orry la Ville, canaux de Chantilly, Chaumont, Gouvieux, Saint Félix, forêt de Laigue, forêt d'Ermenonville, Grandvilliers, Chevrières, Cires les Mello, Morienvall (en migration).

BERGERONNETTE GRISE. *Motacilla alba alba*.

Nicheur et hivernant.

En janvier, l'espèce est mentionnée à Moru-Pontpoint, Etgs de Commelle, Orry la Ville, Noyon avec des effectifs de 1 à 15 individus. La migration prénuptiale est sensible en mars : 105 le 11/03 à Houdancourt (PMS), 40 le 14/03 à Moru-Pontpoint (AR), puis décroît en avril : 9 le 12/04, 5 le 18/04 à Grandvilliers (GP). La nidification est notée : le 17/05 à Houdancourt avec un adulte nourrissant (PMS), à l'Etg de Toutedoie avec 3 juvéniles le 23/06 (YB).

Notée ensuite en dispersion puis en migration postnuptiale à partir d'août avec un maximum en octobre : à Morienvall, Brassoir : 240 en 3h40 le 18/10, 327 en 1h25 le 19/10, 196 en 2h40 le 20/10 (PMS,JPB,CG) et 76

en 1h30 le 19/10 au Mont St Marc (PMS). En décembre, 2 individus sont contactés : 1 le 03/12 à Moru-Pontpoint (AR) et 1 le 24/12 aux gravières de Boran (YB).

BERGERONNETTE DE YARRELL. *Motacilla alba yarrellii*.

Migrateur.

Un mâle hivernant est observé les 14/01 et 31/01 à Gouvieux (YB).

En mars : un adulte le 08/03 aux gravières de Boran (YB), 3 le 11/03 à Houdancourt (PMS), 1 le 14/03 à Moru-Pontpoint (PMS-AR), 2 cadavres sont trouvés le 21/03 à Boran sur Oise (JBM, MCJ).

Un oiseau est encore observé le 02/05 à Houdancourt (PMS).

En migration postnuptiale, une seule mention : 1 le 30/08 à Houdancourt (YB).

TROGLODYTE MIGNON. *Troglodytes troglodytes*.

Nicheur commun sédentaire.

Pas de donnée significative.

ACCENTEUR MOUCHET. *Prunella modularis*.

Nicheur commun sédentaire.

Pas de donnée significative.

ROUGEGORGE FAMILIER. *Erythacus rubecula*.

Nicheur commun sédentaire.

Pas de donnée significative.

ROSSIGNOL PHILOMÈLE. *Luscinia megarhynchos*.

Migrateur et nicheur.

Premier chtr le 28/03 à Compiègne (EC), puis 2 chtrs en FDC le 06/04 (AR).

L'espèce est ensuite notée en avril à Chevières, Ressons sur Matz, FDC, Cuvilly, marais de Sacy le Grand, Chantilly, Tantevoile.

En mai et juin, des nicheurs potentiels sont notés :

- au marais de Sacy le Grand : 10 le 01/05 (ALK)
- à Baboeuf, les Hauts Prés : 5 chtrs cantonnés le 13/05 (MR)
- aux gravières de Morlincourt : 8 chtrs cantonnés le 21/05 (MR)
- à Morlincourt, Prés Barbançons : 9 chtrs cantonnés le 03/06 (MR).

Les derniers contacts ont lieu en août aux bassins de décantation de Chevières avec 1 individu le 06/08 (AR) et 1 le 05/08 (PM,RB).

GORGEBLEUE À MIROIR. *Luscinia svecica*.

Migrateur et nicheur.

La nidification est notée probable sur 2 sites :

Chevières : 1 à 2 individus du 11/04 au 18/07, 2 mâles le 15/08 (PM, RB, DL, AR).

Marais de Sacy le Grand : 1 à 3 chtrs du 04/04 au 18/06 (DD, YB, ALK, PMS, PM-RB, JLB); 1 le 20/06 à Ladrancourt (FS, WM), 1 le 05/09 (PM-RB, ALK).

Ailleurs : 1 le 10/05 à Varesnes (FS, WM, AD), 2 chtrs le 18/05 à Manicamp (02) (AR), 1 le 12/09 à Vauciennes (PMS).

ROUGEQUEUE NOIR. *Phoenicurus ochruros*.

Migrateur et nicheur.

1 mâle hivernant est noté entre le 23/01 et le 01/02 à Orrouy (PMS). Puis les migrateurs arrivent à partir de la mi-mars : 1 le 14/03 en plaine à Gouvieux (YB), 1 le 15/03 à Verneuil-en-Halatte (HdeL), 6 le 25/03 à Cuvilly (FS) ...

La migration postnuptiale est notée en octobre : 10 le 18/10 à Morienvall, Brassoir (PMS), 2 le 24/10 à Noyon, collège (MR), 2 le 26/10 à Orrouy, Champlieu (PMS). Les derniers individus sont vus en novembre : 1 le 21/11 à Sempigny, ferme de Parvillers (PMS), 1 le 23/11 à Noyon, collège (MR), 1 le 25/11 à Vauciennes, Wallu (JPB-CG).

ROUGEQUEUE À FRONT BLANC *Phoenicurus phoenicurus*

Migrateur et nicheur.

Premier : 1 mâle le 01/04 en FDC (HdeL)

L'espèce est ensuite notée d'avril à juin :

FDC : parc. 148, 8341, 5232, 140, 3320, 338, 3103, 3231, 8560, 0031, 149, 2191, 9342, 8161, 9371, 413, 8152, 9102, 9103, 6081, 341, 1132, 1131, 3381, 3461, 843, 855, 9, 910, 804, 6160, 6174, 805, 833, (PMS, AR, DM, JLB, JPB-CG)

Belloy, le Bout du Bois : 1 mâle les 13/04 et 18/04 (FS)

Forêt de Laigue : le 01/05 parc. 128 (DM), 2 le 31/05 parc. 75-79 (JLB)

Marolles : 1 chtr le 16/05 (JPB-CG)

Aumont : 2 chtrs le 24/05 (YB)

Forêt de Chantilly : 3 chtrs le 24/05 parc. 223-243, parc de Sylvie (YB, JLB), 1 le 14/08 parc. 240 (JLB)

Forêt d'Halatte : 1 chtr le 24/05 parc. 238 (YB)

Forêt d'Ermenonville : 1 chtr le 16/05 parc. 92, 3 chtrs le 07/06 parc. 30-93-131, 2 chtrs le 20/06 parc. 94-138 (JLB)

Forêt de Pontarmé : 1 chtr le 10/06 parc. 247 (YB)

Forêt du Lys : 17 mâles chtrs le 11/06 (YB)

Forêt de Retz, Bois du Tillet : 2 chtrs le 20/06 (PMS)

Les derniers oiseaux sont vus en septembre en FDC : 2 le 19/09 (PMS).

TARIER DES PRÉS. *Saxicola rubetra*.

Migrateur et nicheur.

Les premiers contacts lors de la migration prénuptiale ont lieu en FDC, au Mont Saint Marc : 2 oiseaux le 28/04 (PMS).

Puis l'espèce est notée le 10/05 en Basse Pommeraie parc. 45 (JMV), 1 mâle le 22/05 à Morienvall, Brassoir

(PMS), 1 le 22/06 à Boran, marais du Lys (YB)

La nidification est probable dans la moyenne vallée de l'Oise à Varesnes : 5 chtrs le 10/05 (FS,WM), à Baboeuf : 7 chtrs le 13/05 (MR), à Quierzy : 7 chtrs le 27/05 (MR).

En septembre, de 1 à 3 individus sont observés en migration postnuptiale à Morienvall, Sacy le Grand, forêt de Hez, forêt d'Ermenonville, FDC, Briot, Grandvilliers, Moru-Pontpoint, Raray. Le dernier oiseau est vu le 10/10 en FDC, Mont Saint Marc (JMV).

TARIER PÂTRE. *Saxicola torquata*.

Migrateur, nicheur, hivernant.

Un mâle est noté le 11/01 en hivernage à Mortefontaine (CW), puis les migrants arrivent à partir du 21/02 en FDC, forêt d'Ermenonville, Longueil Sainte Marie, Gouvieux, Varesnes, Lamécourt, Verneuil-en-Halatte, Saint Martin le Noëud.

De mai à août, les observations concernant les reproducteurs sont effectuées dans tous les grands massifs forestiers ainsi qu'au marais du Lys, Vertefontaine, Orsimont, Foulangues, Hodenc en Bray. Le dernier oiseau est noté le 25/10 aux gravières de Saint Leu d'Esserent (JBM-MCJ).



TRAQUET MOTTEUX. *Oenanthe oenanthe*.

Migrateur.

En migration prénuptiale : de 1 à 3 individus du 08/04 au 24/05 à : Morienvall, Brassoir, Halloy, Cuvilly, Saint Maur, Sarnois, FDC, Moru-Pontpoint, Cires les Mello, Broquiers, Houdancourt, Margny les Compiègne. L'effectif maximum est relevé le 19/04 avec 6 oiseaux à Morienvall, Brassoir (PMS). L'observation d'un immature volant le 12/08 à Saint Maur, ferme de la Garenne pourrait révéler une nidification locale. La migration postnuptiale se déroule du 28/08 au 25/10 à Halloy, Grandvilliers, Foulangues, Cuvilly, Dargies, Vauciennes, Morienvall, Boran sur Oise avec des effectifs de 1 à 3 individus sauf le 19/09 à Dargies avec 8 oiseaux (GP).

MERLE À PLASTRON. *Turdus torquatus*.

Migrateur.

Noté uniquement au printemps. La première observation concerne 4 oiseaux le 08/04 à Morienvall, Brassoir (PMS). Suivent ensuite dans la 2^{ème} quinzaine d'avril une série d'observations inhabituelle :

1 le 19/04 à Cuvilly : (FS)

à Morienvall, Brassoir : 2 le 19/04, 5 le 21/04 (PMS)

en FDC, parc. 7462 : 3 le 15/04, 5 le 18/04, 4 le 19/04, 10 le 20/04, 1 le 27/04 (PMS)

en FDC, Mont Saint Marc, parc. 4202-4152 : 12 le 20/04, 9 le 22/04, 17 le 25/04, 14 le 26/04, 11 le 28/04 (PMS).

MERLE NOIR. *Turdus merula*.

Sédentaire commun.

Pas de donnée significative.

GRIVE LITORNE. *Turdus pilaris*.

Migrateur, hivernant.

Hivernage et migration prénuptiale : 150 le 10/01 à Manicamp, 180 le 10/01 à Pimprez, 40 le 03/02 à Cuvilly, 120 le 23/02 à Moru-Pontpoint, 25 le 01/03 à Aubvillers, 58 du 02/03 au 08/03 à Morienvall, Brassoir, 40 le 13/03 à Houdancourt, 100 le 14/03 à Sempigny (PMS, MR, FS, YB), encore 7 le 11/04 à Chevières (PM-RB). Deux individus alarment le 01/05 en FDC, parc. 7480 (PMS).

Migration postnuptiale sensible à partir du 18/10 en FDC et Morienvall, Brassoir le 19/10 (PMS). En novembre : 304 le 21/11 à Sommereux (GP), notée également à Grandvilliers, Halloy, Damereaucourt, forêt de Retz, Foulloy, Ménantissard, Sully ; puis en décembre à Libermont, Grandvilliers, Cires lès Mello, Fresnoy la Rivière, Sommereux et Bourmont.

GRIVE MUSICIENNE. *Turdus philomelos*.

Sédentaire commun.

Les seules données significatives concernent la migration postnuptiale au Mont St Marc en FDC : 56 le 16/10 et 47 le 19/10 (PMS).

GRIVE MAUVIS. *Turdus iliacus*.

Migrateur, hivernant.

Observée de janvier à mars en FDC, forêt de Chantilly, étangs de Commelles, Orrouy, Houdancourt, Longueil Ste-Marie avec un effectif maximum de 200 le 24/02 en forêt de Chantilly (JLB).

Les premiers migrateurs de l'automne sont notés à Morienvall, Brassoir : 8 le 25/09 (PMS), puis 109 le 16/10 au Mont St Marc, FDC (PMS).

Du 16/10 au 24/12, l'espèce est observée en FDC, forêt de Chantilly, forêt d'Ermenonville, Noyon, Lhuyère, Morlincourt, Sacy, Bizancourt, Davenescourt, Hétomesnil, Senlis, étang de Touthoie, Cuvilly, Cires les Mello avec des effectifs maximum de 100 (dortoir de 100 individus le 06/12 en forêt de Chantilly (JLB)).

GRIVE DRAINE. *Turdus viscivorus*.

Sédentaire.

Peu de données significatives, les premiers chtrs sont notés dès janvier aux étangs de Commelles (RD), à Mortefontaine (CW), puis en février à Orrouy (PMS), Morlincourt (MR).

BOUSCARLE DE CETTI. *Cettia cetti*.

Sédentaire localisé.

Noté aux marais de Sacy le Grand où 1 à 2 chtr sont entendus de janvier à juillet, et 1 chtr le 05/04 à Verneuil-en-Halatte (DD, sortie Geor 60).

LOCUSTELLE TACHETÉE. *Locustella naevia*.

Migrateur et nicheur.

Les premières sont entendues le 31/03 en FDC (AR, HdeL).

Les chtrs sont contactés ensuite d'avril à juin en FDC, forêt de Laigue, forêt d'Ermenonville, forêt d'Halatte, forêt de Hez, forêt de Retz, marais de Sacy, Verneuil-en-Halatte, Varesnes, Baboeuf, Héricourt, La Chapelle aux Pots, Rocquemont.

LOCUSTELLE LUSCINOÏDE. *Locustella luscinioides*.

Migrateur et nicheur localisé.

L'espèce est observée uniquement dans les marais de Sacy :

4 chtrs le 10/04 (ALK), puis de 1 à 3 chtrs du 20/04 au 27/07.

PHRAGMITE DES JONCS. *Acrocephalus schoenobaenus*.

Migrateur et nicheur.

L'espèce est notée du 05/04 au 16/08 à Verneuil-en-Halatte, Moru-Pontpoint, Sacy le Grand, étangs de Commelles, Quierzy, marais du Lys et Chevières.

ROUSSEROLLE VERDEROLLE. *Acrocephalus palustris*.

Migrateur et nicheur.

Des chtrs sont contactés du 08/05 au 20/06 à Chevières, FDC-étang du Louveteau, Baboeuf, Varesnes, canaux de Chantilly, Morlincourt, marais de Sacy, Vauciennes, Pimprez, Quierzy, forêt de Laigue-parcelle 162, Rocquemont.

Un juvénile est observé le 29/06 au marais Dozet, Précy sur Oise (YB).

Un individu est encore noté le 06/08 à Chevières (AR).

ROUSSEROLLE EFFARVATTE. *Acrocephalus scirpaceus* .

Migrateur et nicheur.

Les chtrs sont contactés à partir du 25/04 à : Chevières, Vauciennes, étangs de Commelles, Verneuil-en-Halatte, FDC-étangs de St-Pierre, Moru-Pontpoint, barrage d'Hérant sur l'Aisne, Sacy, FDC-étang du Louveteau, Houdancourt, Boran sur Oise, Morlincourt, La Chapelle aux Pots, Précy sur Oise.

Un maximum de 50 individus est relevé le 06/08 à Chevières (AR).

Les dernières observations sont effectuées à Chevières le 05/09 (PM,RB).

ROUSSEROLLE TURDOÏDE. *Acrocephalus arundinaceus*.

Migrateur et nicheur localisé.

Un chtr le 10/05 à Varesnes, La Fosse Cochue (FS, WM, AD).

3 chtrs minimum le 18/05 aux marais de Sacy (FS).

FDC-étang du Louveteau : chtrs notés le 11/05, 3 individus le 27/05 (DM).

HYPOLAÏS ICTÉRINE (CHD). *Hippolais icterina*.

Migrateur rare.

Un chtr le 21/05 à Cuvilly, Les Prés Falempois (FS).

HYPOLAÏS POLYGLOTTE. *Hippolais polyglotta*.

Migrateur et nicheur.

Le premier individu est noté le 22/04 en FDC, Mont St-Marc (PMS), le dernier l'est le 30/08 à Vauciennes (AR).

FAUVETTE BABILLARDE. *Sylvia curruca*.

Migrateur et nicheur.

Premier chtr le 23/04 à Moru-Pontpoint (PMS).

Des chtrs sont ensuite notés en mai et juin à : Chevrières, Cires les Mello, Verneuil-en-Halatte, étang de Toutevoie, Creil, Briot.

FAUVETTE GRISETTE. *Sylvia communis*.

Migrateur et nicheur commun.

Le premier chtr est entendu le 08/04 à Chevrières (AR).

FAUVETTE DES JARDINS. *Sylvia borin*.

Migrateur et nicheur commun.

Le premier chtr est entendu le 22/04 en FDC (PMS).

FAUVETTE À TÊTE NOIRE. *Sylvia atricapilla*.

Migrateur et nicheur commun.

Le premier chtr est noté le 18/02 à l'étang de Toutevoie (YB).

Le dernier individu est observé le 08/11 à Morienvall, Brassoir (JPB, CG).



Fauvette à tête noire. Gedric LOUVET

POUILLOT DE BONELLI. *Phylloscopus bonelli*.

Migrateur et nicheur localisé.

En FDC : 3 chtrs sont contactés le 10/05, parc.1152 puis 1 chtr le 21/05 parc.1151 (PMS).

En forêt d'Ermenonville : 2 individus le 23/05 et 1 le 07/06 parc.169 (JLB).

En forêt d'Halatte : 1 individu le 14/06 au Mont Pagnotte (CW).

POUILLOT SIFFLEUR. *Phylloscopus sibilatrix*.

Migrateur et nicheur.

Le premier chtr est noté le 13/04 à Gouvieux, Bois des Bouleaux (YB). Des chtrs sont ensuite contactés d'avril à juin en forêt de Laigue, FDC, forêt d'Halatte.

POUILLOT VÉLOCE. *Phylloscopus collybita*.

Migrateur et nicheur.

Un hivernant est signalé du 09/01 au 01/02 à Moru-Pontpoint (PMS).

3 sont notés le 10/01 aux gravières de Boran (YB).

Un individu est contacté plusieurs fois en janvier à Pondron (JPB, CG).

Les premiers migrants sont notés à partir du 08/02.

En décembre, 1 le 23/12 à l'étang de Toutedoie, 2 le 24/12 aux gravières de Boran (YB).

POUILLOT FITIS. *Phylloscopus trochilus*.

Migrateur et nicheur.

Les premiers chtr sont notés le 29/03 : 5 aux gravières de Boran (YB).

ROITELET HUPPÉ. *Regulus regulus*.

Sédentaire.

Pas de donnée significative.

ROITELET TRIPLE-BANDEAU. *Regulus ignicapillus*.

Sédentaire.

L'espèce est notée de mars à mai : canaux de Chantilly, Pierrefonds, Chantilly, Bourmont, FDC, forêt d'Halatte, forêt d'Ermenonville, forêt du Lys, forêt de Laigue, forêt de Chantilly.

GOBEMOUCHE GRIS. *Muscicapa striata*.

Migrateur et nicheur.

Le premier chtr est noté le 08/05 en FDC (PMS). L'espèce est ensuite notée de mai à septembre : FDC, Quierzy, Boran sur Oise, Cuvilly, forêt de Chantilly, Grandvilliers, Gouvieux.

GOBEMOUCHE NOIR. *Ficedula hypoleuca*.

Migrateur et nicheur.

Le premier chtr est entendu le 19/04 en FDC, parc.328 (AR).

Des chtrs sont ensuite notés d'avril à juin :

- forêt de Laigue : parc. 80-128 (PMS, DM)

- forêt du Lys (YB)

- FDC : parc.8560-0073-0212-0223-0222-1432-8162-326-329-1141-1142-8152-8192-8051-203-1292-6081-6021-9222-1132-1131-936-404-120-7181-10 (PMS, DM, AR, WM, JLB,DD).

MÉSANGE À LONGUE QUEUE. *Aegithalos caudatus*.

Sédentaire commun.

Pas de donnée significative.

MÉSANGE NONNETTE. *Parus palustris*.

Sédentaire commun.

Pas de donnée significative.

MÉSANGE BORÉALE. *Parus montanus*.

Sédentaire.

Notée de janvier à novembre à : Pimprez, Longueil Ste-Marie, forêt d'Halatte, FDC, Sacy, Chevières, Moru-Pontpoint, forêt d'Ermenonville.

MÉSANGE HUPPÉE. *Parus cristatus*.

Sédentaire commun.

Pas de donnée significative.

MÉSANGE NOIRE. *Parus ater*.

Sédentaire, nicheuse assez rare.

Notée de janvier à décembre à : Gouvieux, Vineuil St-Firmin, forêt d'Ermenonville, FDC, Chevières, Trosly-Breuil.

MÉSANGE BLEUE. *Parus caeruleus*.

Sédentaire commun.

Pas de donnée significative.

MÉSANGE CHARBONNIÈRE. *Parus major*.

Sédentaire commun.

Pas de donnée significative.

SITTELE TORCHEPOT. *Sitta europaea*.

Sédentaire commun.

Pas de donnée significative.

GRIMPEREAU DES BOIS. *Certhia familiaris*.

Nicheur localisé.

L'espèce est notée uniquement en FDC : de mars à mai dans les parcelles 8011-2302-6072-8560-2491-8152-62-2312-1132-1131-3381-Beaux-Monts-Marais de Champlieu (DM, AR, PMS). Un chtr le 17/10 parcelle 329 (AR).



Mésange bleue Philipe SOVANNI

GRIMPEREAU DES JARDINS. *Certhia brachydactyla*.

Sédentaire commun.

Pas de donnée significative.

LORIOT D'EUROPE. *Oriolus oriolus*.

Migrateur et nicheur.

Le premier chtr est entendu le 30/04 à Chevières (WM).

Des chtrs sont ensuite notés de mai à août : FDC, Moru-Pontpoint, forêt de Chantilly, Gouvieux, Sacy, Varesnes, Morlincourt, forêt de Hez, Vauciennes, forêt de Laigue, forêt d'Ermenonville, forêt de Retz, Cires les Mello, Chevières.

PIE-GRÎCHE ÉCORCHEUR. *Lanius collurio*.

Migrateur et nicheur.

Les nicherues sont localisés en moyenne vallée de l'Oise et en FDC :

Moyenne vallée de l'Oise : Varesnes : 6 le 10/05 (FS, WM, AD), 7 le 26/05 (PMS), Morlincourt : 1 alarme le 21/05 (MR).

FDC : 2 mâles le 17/05 parc. 245-246 (DD), 1 mâle le 27/05 parc.2100 (DM), 1 cple le 05/07 parc. 210 (AR), 1 cple le 05/07 parc. 2432 (JMV).

Ailleurs : 1 mâle le 12/05 à Couarcy (FS), 1 mâle le 10/06 à Pondron (PMS), 1 cple avec 5 pullis le 29/05 à St-Léger en Bray (Yla).

PIE-GRÎCHE GRISE. *Lanius excubitor*.

Migrateur, nicheur et hivernant.

Dans les marais de Sacy, 1 individu est noté les 14/01, 08/02, 16/03, 20/03 (ALK).

En FDC, 1 du 19/02 au 22/03 parc. 7432-7422 (PMS,YB), 1 le 17/10 parc. 8260, 1 le 11/11 Carrefour des Biches (PMS).

Ailleurs, des migrateurs sont notés : 1 le 03/10 à Morte-fontaine (CW), 1 le 20/10 à Morierval, Brassoir (PMS).

GEAI DES CHÊNES. *Garrulus glandarius*.

Sédentaire.

Pas de données significatives, une troupe de 20 le 21/04 en vol nord en FDC parc. 7431 (PMS).

PIE BAVARDE. *Pica pica*.

Sédentaire.

Pas de donnée significative.

CHOUCAS DES TOURS. *Corvus monedula*.

Migrateur, nicheur et hivernant.

Les troupes les plus importantes sont notées le 04/01 : 250 à St-Maximin (YB), le 21/01 : 300 à Moru-Pontpoint (YB).

En migration postnuptiale : 46 le 19/10 au Mont St Marc, FDC (PMS)

CORBEAU FREUX. *Corvus frugilegus*.

Sédentaire.

En migration postnuptiale : 522 le 08/11 à Morienvall, Brassoir (JPB, CG).

- 900 individus le 20/12 à Rémérangles (HdeL).

CORNEILLE NOIRE. *Corvus corone corone*.

Sédentaire.

- 300 individus sont notés le 01/11 en forêt d'Halatte, parc.90, près d'une décharge (JLB).

ETOURNEAU SANSONNET. *Sturnus vulgaris*.

Sédentaire.

En migration postnuptiale : 1152 le 08/11 à Morienvall, Brassoir (JPB, CG).

- 700 le 13/12 à Bouillancy (HdeL).

MOINEAU DOMESTIQUE. *Passer domesticus*.

Sédentaire.

Pas de donnée significative.

MOINEAU FRIQUET. *Passer montanus*.

Sédentaire.

- 300 le 01/09 à Chevières (WM).

- 25 migrants le 18/10 à Morienvall, Brassoir (JPB, CG).

PINSON DES ARBRES. *Fringilla coelebs*.

Sédentaire.

La migration est observée en octobre :

200 le 11/10 à Chevières (AR), 193 le 16/10 et 474 le 19/10 en FDC, Mont St-Marc (PMS),

272 le 20/10 et 239 le 24/10 à Morienvall, Brassoir (PMS).

PINSON DU NORD. *Fringilla montifringilla*.

Migrateur et hivernant.

Cette espèce est observée de janvier à mars : FDC, forêt d'Ermenonville, forêt de Chantilly, Boran sur Oise, Ivors, Lataule.

Les dernières observations du printemps ont lieu en FDC : 2 le 18/04 parc. 7462 (PMS). A l'automne, le premier individu est noté en migration le 10/10 à Morienvall, Brassoir (PMS).

SERIN CINI. *Serinus serinus*.

Sédentaire.

Un chr est entendu le 14/01 à Gouvieux (YB).

A l'automne, quelques troupes sont observées : 50 le 30/08 et 30 le 12/09 à Vauciennes (AR).

VERDIER D'EUROPE. *Carduelis chloris*.

Sédentaire.

Pas de donnée significative.

CHARDONNET ÉLÉGANT. *Carduelis carduelis*.

Sédentaire.

Quelques troupes sont notées en février et mars : 50 le 08/02 à Rouvillers, Clos d'Elogette (DD, sortie GEOR), 50 le 15/02, 60 le 21/03 en forêt d'Ermenonville (YB), puis à l'automne : 100 les 30/08 et 12/09 à Vauciennes (AR), 100 le 17/09 à Dargies (GP).

TARIN DES AULNES. *Carduelis spinus*.

Migrateur et hivernant.

L'espèce est notée de janvier à avril : Gouvieux, Pierrefonds, Boran sur Oise, Trosly-Breuil, Chantilly, étangs de Commelles, FDC, forêt d'Ermenonville, étang de Touthoie, Sacy, Moru-Pontpoint, Pimprez, Chevières, St-Leu, Mont l'Evêque, forêt de Laigue. Les derniers oiseaux du printemps sont notés en forêt d'Ermenonville : 9 le 19/04 (JLB). A l'automne, les premiers migrants sont entendus le 19/10 en FDC, Mont St-Marc (PMS).

LINOTTE MÉLODIEUSE. *Carduelis cannabina*.

Migrateur, nicheur et hivernant.

En dehors de la période de nidification, des troupes assez importantes sont relevées à l'automne : 170 le 30/08 à Grandvilliers, 200 à 400 le 23/09 à Cempuis (GP), 145 le 25/09, 225 le 11/10, 106 le 20/10 à Morienvall, Brassoir (JPB, CG, PMS).

SIZERIN FLAMMÉ. *Carduelis flammea*.

Migrateur.

2 le 10/01 à Verneuil-en-Halatte (JPB, CG), 1 femelle le 10/03 en FDC, parc.7431 (PMS), 13 le 15/03 aux canaux de Chantilly (YB), 2 le 24/03 et 1 le 01/04 à Gouvieux dans un jardin (JBM, MCJ), 15 le 01/05 en forêt de Laigue, parc.128 (DM).

BEC-CROISÉ DES SAPINS. *Loxia curvirostra*.

Migrateur irrégulier.

Forêt d'Ermenonville : 10 dont 8 mâles le 14/03, parc.55, 2 le 03/05 parc.47 (JLB).

FDC : 1 troupe en vol le 10/01, carrefour de Flore (AR), 5 le 15/03 parc.7011 (PMS), 2 le 22/03 parc.812 (AR), 2 alement le 20/04 parc.3320, 11 le 26/04 parc.3320, 5 le 16/05 parc.7011, 9 dont

2 juvéniles le 22/05 parc.5101 (PMS), quelques individus entendus le 30/09 à Compiègne, Lycée Mireille Grenet en lisière de la FDC (PMS).

BOUVREUIL PIVOINE. *Pyrrhula pyrrhula*.

Sédentaire.

Quelques rassemblements hivernaux sont notés : 11 le 14/01 à Morlincourt, 12 le 28/01 à Pimprez (MR), 20 le 15/11 à Senlis (YB).

GROSBEC CASSE-NOYAUX. *Coccothraustes coccothraustes*.

Sédentaire.

L'espèce est observée sur les sites suivants : forêt de Retz, Trosly-Breuil, étang de Toutevoie, Orrouy, FDC, forêt d'Ermenonville, forêt de Laigue, Sacy, Senlis toute l'année.

A noter : 39 le 03/02 à Orrouy (PMS), 10 le 17/10 en FDC (AR), 8 le 18/10 et 6 le 25/10 en migration à Morienvall, Brassoir (JPB,CG).

BRUANT JAUNE. *Emberiza citrinella*.

Sédentaire.

80 individus sont observés sur une jachère le 14/01 à Palesnes (PMS), 31 migrateurs le 24/10 à Morienvall, Brassoir (PMS), 16 le 24/12 à Cires les Mello (JLB).

BRUANT ZIZI. *Emberiza cirlus*.

Sédentaire localisé.

1 chtr est noté le 06/04 à Creil, près du dépôt France Telecom (PM)*.

BRUANT DES ROSEAUX. *Emberiza schoeniclus*.

Sédentaire.

30 le 17/01 sur une jachère à Morienvall (PMS), 30 le 14/03 à Moru-Pontpoint (AR), 28 migrateurs le 18/10 à Morienvall, Brassoir (JPB,CG), 150 le 06/12 sur une jachère à Russy-Bemont (JPB, CG).

BRUANT PROYER. *Miliaria calandra*.

Sédentaire.

10 le 17/01 sur une jachère à Morienvall (PMS), 10 chtrs le 22/04 à Lataule (FS), 17 ensemble le 17/05 à Lataule (FS), 15 le 24/12 à Cires les Mello (JLB).

Observation de la migration post-nuptiale 1998 à Morienvall (60)

Date	05/09	12/09	20/9	25/09	11/10	18/10	19/10	20/10	24/10	25/10	30/10	08/11	11/11	Total
Horaires	18h35- 20h00	8h50- 9h50	8h20- 10h40	7h30- 9h15	8h20- 11h00	8h10- 11h50	8h15- 9h40	8h00- 10h40	8h45- 11h20	7h45- 10h15	10h30- 11h00	8h30- 11h30	10h25- 12h05	
Durée	1h25	1h	2h20	1h45	2h40	3h40	1h25	2h40	2h35	2h30	0h30	3h00	1h40	27h10
Observateurs	PMS	JPB-CG	JPB-CG	PMS	JPB-CG	JPB-CG	PMS	PMS	PMS	JPB-CG	JPB-CG	JPB-CG	JPB-CG	
Grand cormoran					1			16		56				73
Héron cendré			2											2
Oie cendrée						263		65					146	474
Canard pilet											23			23
Busard des roseaux		1	1		2									4
Busard St Martin		1												1
Buse variable								1						1
Faucon crécerelle			1											1
Faucon émeraillon					1				1					2
Faucon hobereau				1										1
Epervier d'Europe								1						1
Pluvier doré												23		23
Vanneau huppé							25	70				14	205	314
Mouette rieuse							10	8						18
Goéland argenté						30				1			5	36
Pigeon colombin					6					2				8
Pigeon ramier					7	44	17	13	32	2	20	232		367
Alouette lulu							1	1						2
Alouette des champs					491	69	77	355	354	178	73	1588	89	3274
Hirondelle rustique	59	2			97	3				1				162
Hirondelle de fenêtre	1													1
Pipit des arbres				1	18									17
Pipit farlouse			1	154	33	42	713	363	513	38	1	18	1	1877
Pipit à gorge rousse								1						1
Pipit spioncelle						1				9		1	1	12
Bergeronnette printanière	1	5		18										24
Bergeronnette grise				1	23	6	240	327	196	77	6	20	6	902
Bergeronnette des ruisseaux												2		2
Pie-grièche grise								1						1
Rougequeue noir												3		3
Taïer pâle			1											1
Grive litorale							2	6	2					10
Grive musicienne				6	3	18	18	5	1					51
Grive mauvis								16						16
Grive draine					2	7		32						41
Choucas des tours								17				18		35
Corbeau freux			3			108	82	154	109	92	1	522	62	1133
Cornette noire								5						5
Etouneau sansonnet	21			6	35	158	128	174	205	38	4	1152	74	1995
Pinson des arbres	4			140	47	199	262	272	239	24		12		1199
Pinson du Nord							5	2	2					9
Verdier d'Europe				41	6	3	13	9	1					73
Chardonneret élégant					4									4
Linotte mélodieuse			19	145	225	91	14	106	89	31		8	2	730
Serín cili							1							1
Moineau friquet						25		2	3					30
Grosbec casse-noyaux						8		2		6				16
Bruant jaune						2	6	19	31	26	8	5	1	98
Bruant proyer							1							1
Bruant des roseaux						28		3	2			5	9	47
Total	86	9	30	534	982	1339	1702	1910	1666	510	130	3623	601	13122
Moyenne horaire	61	9	13	305	368	365	1201	716	645	204	260	1208	361	483

Observateurs : J P BONNEL, C GUYOT, M et P SENGEZ

**Observation de la migration post-nuptiale 1998 au Mont St-Marc
(Forêt de Compiègne, 60)**

Date	20/08	16/10	19/10	Total
Horaire	8h00-9h45	9h00-10h15	10h00-11h30	
Durée	1h45	1h15	1h30	4h30
Observateurs	PMS	MS	MS	
Grand cormoran			3	3
Vanneau huppé			11	11
Pigeon ramier			70	70
Alouette lulu			4	4
Alouette des champs			138	138
Pipit des arbres	6			6
Pipit farlouse		53	142	195
Bergeronnette grise	3	17	76	96
Bergeronnette printanière	3			3
Bergeronnette des ruisseaux			1	1
Grive litorne			1	1
Grive musicienne		56	47	103
Grive mauvis		109		109
Grive draine			3	3
Choucas des tours			46	46
Corbeau freux			32	32
Etourneau sansonnet			26	26
Pinson des arbres		193	474	667
Pinson du Nord		8	3	11
Chardonneret élégant		12		12
Linotte mélodieuse			11	11
Bouvreuil			2	2
Grosbec casse-noyaux			1	1
Bruant jaune			2	2
Bruant des roseaux		1		1
Total	12	449	1093	1554
Moyenne horaire	7	359	729	345

18/10 : Oies cendrées : 85 + 120

Observateurs: M et P SENGEZ

